This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

LANE

MEDICAL LIBRARY

SAN JOSE THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
1885

Gift
Dr. Judell

JOSEF ŠAFÁŘ

Medicinische Buchhandlung

WIEN

VIII., Schlösselgasse 22

nächst dem k. k. allgemeinen Krankenhause.

GROSSES LAGER

neuer und älterer Erscheinungen

aus allen Gebieten der

medicinischen Literatur.

Abonnements auf alle Fachzeitschriften.

Schnellste Lieferung ausländ. Werke.

EXPORT

deutscher Werke nach dem Auslande.

Antiquarisches Bücherlager.

Ankauf und Umtausch einzelner brauchbarer Werke sowie ganzer Bibliotheken.

Kataloge gratis und franco.

LEIHBIBLIOTHEK.

Reichste Auswahl der belletristischen Literatur in **deutscher, französ.** und **englischer Sprache.**

Circulating Library. *Cabinet de lecture.*

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch einzelner Abtheilungen dieses wird gerichtlich verfolgt.

Druck von Gottlieb Gistel & Comp. in Wien.

Vi 65
1965
1401

Vorwort zur einundzwanzigsten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, deren sich das von uns edirte Recept-Taschenbuch in ärztlichen Kreisen erfreute, liefert den vollgiltigen Beweis, dass dessen Zusammenstellung den Bedürfnissen des praktischen Arztes insoferne entsprach, als es in wenigen Blättern eine rasche Orientirung im therapeutischen Fache ermöglicht.

Anlässlich der Nothwendigkeit einer neuen Auflage hielten wir es daher für unsere Pflicht, nicht nur für die Beseitigung einiger Mängel durch die ergänzende Einschaltung sowohl mehrerer Krankheitsformen, als auch vieler werthvoller Receptformeln u. dergl. Sorge zu tragen, sondern auch den seither in die ärztliche Praxis neu eingeführten und bewährten Medicamenten, die mit Rücksicht auf ihre Dosirung und Anwendung noch weniger bekannt sind, den entsprechenden Platz anzuweisen.

Neben der wesentlichen Vermehrung der Receptformeln glauben wir den Werth des vollständig umgearbeiteten Taschenbuches dadurch gesteigert zu haben, dass einige Capitel, deren Unentbehrlichkeit für den praktischen Arzt einleuchtend ist, neu hinzugefügt wurden.

Die Rücksichtnahme auf die österreichische und deutsche Pharmakopöe, sowohl in der Dosirung als auch in der Taxirung, sowie die gleichmässig durchgeführte typographische Umgestaltung werden die Verwendbarkeit des Büchleins für weitere Kreise gestatten.

WIEN und BERLIN, August 1900.

Die Verlagshandlung.

105884

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Register zu den Receptformeln	V
1. Receptformeln nebst therapeutischen Winken	1
2. Anhang:	
a) Zu subcutanen Injectionen gebräuchliche Medicamente und ihre Dosirung	146
b) Zu Inhalationen gebräuchliche Medicamente und ihre Dosirung	148
c) Tropfen-Tabelle	149
3. Receptformeln für die Cassen- und Armen-Praxis	150
4. Kurze Symptomatologie und Therapie der wichtigsten acuten Intoxicationen	154
5. Cosmetica (Schönheitsmittel)	170
6. Vergleichung der gebräuchlichen Thermometerscalen	176
7. Uebersicht der officinellen, sowie der wichtigeren nicht officinellen Arzneimittel, ihrer Dosirung und Anwendung, sowie ihrer Preise	176
8. Explosive und detonationsfähige Arzneimischungen	255
9. Approximative Berechnung des Inhaltes der üblichen Löffel	256
10. Die wichtigsten Nährpräparate	256
11. Sterblichkeit und mittlere Lebensdauer	259
12. Maximaldosen für Erwachsene, welche nach der neuen österreichischen Pharmacopöe (1890), auf Grund der Zusätze zur 7. Ausgabe der ö. Ph., sowie nach der neuen deutschen Pharmacopöe (1890) zum innerlichen Gebrauch nicht überschritten werden dürfen, ohne dass der Arzt ein (!) hinzufügt	259
13. Maximaldosen für Erwachsene und Unerwachsene nach der neuen österr. Pharmacopöe (Ed. VII, 1890) und der III. Ausgabe des Arzneibuches f. d. Deutsche Reich (Ph. G. Ed. III ex 1890) berechnet	262
14. Vergleichende Gewichtstabellen	266
15. Längenwachsthum und Gewichtszunahme des gesunden Kindes	268
16. Körperlänge und Körpergewicht	269
17. Die normale Dentition	270
18. Incubationsdauer infectiöser Krankheiten	271
19. Anleitung zur Untersuchung von Se- und Excreten	271
20. Die Bade- und Curorte nach ihrer Charakteristik	275
21. Künstliche Bäder	278
22. Schwangerschafts-Kalender	280
23. Sehproben	281

Register zu den Receptformeln.

NB. Die Ziffern beziehen sich auf die den Recepten vorgesetzten Nummern.

Absynth. Tinct. 277. 775.
Accolin. hydrobrom. 785.
Acet. aromat. 1338.
— *pyrolignos.* 721. 753.
Aceton 1365. 1366.
Acid. acet. 1748.
— *agaric.* 1613.
— *arsenicos.* 51. 1377. 1379. 1593. 1688. 1756.
— *benzoic.* 521. 1184. 1195. 1308.
— *borac.* 138. 174. 310. 391. 399. 460. 479. 534. 614. 747. 1213. 1214. 1223. 1230. 1491. 1704. 1731. 1732. 1816.
— *carbol.* 6. 12. 62. 159. 171. 212. 218. 459. 478. 497. 638 653. 654. 718. 724. 725. 731. 740. 755. 853. 1038. 1053. 1129. 1199. 1283. 1335. 1338. 1340. 1350. 1352. 1464. 1468. 1483. 1500. 1723. 1727. 1755. 1782. 1789. 1801. 1818.
— *chrom.* 882.
— *cinnamylic.* 1049. 1596.
— *citr.* 510. 954.
— *gallic.* 74.
— *hydrobrom.* 958.
— *lactic.* 1047. 1652.
— *muriat.* 275. 279. 282. 286. 309. 321. 331. 546. 576. 1028. 1130. 1131. 1416.
— *nitr.* 1650. 1754.
— *picronitric.* 397.
— *phosphor.* 43. 44. 1306. 1323.
— *pyrogallicum* 657. 658. 741. 1048. 1364. 1469.
— *pyrolign.* 1696.
— *salicylicum* 19. 45. 49. 125. 348. 460. 504. 532. 542. 556. 615. 636. 637. 645. 684. 739. 740. 744. 757. 854. 881. 969. 973. 990. 1200. 1223. 1291. 1336. 1430. 1466. 1543. 1612. 1652. 1718. 1732. 1752. 1790. 1792. 1804.
Acid. sclerotin. 811.
— *sulfanil.* 1243.
— *sulf.* 601. 776. 1105. 1106. 1136. 1320. 1446.
— *sulph. aromat.* 795.
— *tannic.* 66. 139. 270. 336. 498. 715. 918. 1328.
— *tartar.* 504. 505. 533. 910. 952. 1471. 1656. 1785.
— *thymic.* 1184.
— *thymol.* 1245. 1511.
— *trichloracet.* 65. 407. 1251.
Aconiti Tinct. 47.
Acori rad. 179. 297. 299. 314. *Extr.* 316. 709. 889. 919. 1256.
Actol 1714.
Aether 570. 1514.
— *acet.* 115. 1078.
— *amyl.* 108.
— *sulfur.* 11. 76. 103. 122. 342. 343. 350. 386. 726. 1062. 1180. 1341. 1345. 1360. 1369. 1502. 1520.
Agaricin 1617.
Airol 143. 392. 1686. 1795. 1796.
Aloë 1161.
Aloïn 1146. *Extr.* 52. 338. 909. 1067. 1145. 1155. 1158. *Pil.* 53. 1160.
Alphol 475.
Althaea 183. 184. 186. 379. 964. 1018. 1304. 1329. *Syr.* 921. 1157.
Alumen. 15. 28. 61. 159. 166. 171. 266. 415. 478. 488. 644. 712. 713. 732. 752. 770. 795. 812. 843. 968. 1013. 1019. 1079. 1239. 1290. 1331. 1674. 1680. 1698. 1812. 1819.
Alumnol. 145. 626. 889.
Ammon. bromat. 236. 700. 892.
— *caust.* 1337.
— *chlorat.* 183. 186. 1531.

Ammon. pur. liquid. 1309.
— *sulfoichthyol.* 726.
Amylenhydrat 592. 708. 900. 938. 989. 1417.
Amylnitrit 108. 592. 840. 1499.
Amyl. 14. 15. 24. 126. 175. 632. 633. 637. 646. 728. 733. 842.
Anthrarobin 858. 1374.
Antinervin 835. 1123. 1402.
Antinosin 269. 481.
Antipyrin 363. 568. 829. 921. 1325. 1383. 1413. 1638. 1661.
Antispasmin 8. 110. 1645.
Anusol 818.
Apiol 959.
Apolysin 283.
Apomorphin. m. 209. 549. 665. 711. 1015. 1028. 1193. 1194. 1311. 1603.
Aqua amygdal. amar. 110. 383. 384. 558. 1005. 1055.
— *antihyster. foetida* 890.
— *calcis* 24. 389. 390. 466. 648. 1793.
— *carvi* 294.
— *chlori* 1733. 1788. 1817.
— *chloroformi* 1628.
— *cinnamom.* 253. 350. 561.
— *foeniculi* 94. [1552. 1657.
— *Goulardi* 408. 1197.
— *Laurocerasi* 103. 201. 204. 232. 276. 281. 296. 313. 339. 378. 465. 562. 588. 593. 1009. 1012. 1017. 1024. 1088. 1189. 1208. 1211. 1274. 1276. 1305. 1472. 1501. 1503. 1739. 1777
— *laxat. Viennens.* 1139. 1167. 1562. 1655.
— *melissae* 374.
— *Menthae* 61. 113. 349. 545. 554. 1144. 1376. 1505. 1566.
— *phagedaen. nigra* 1492.
— *picis* 1623. 1633.
— *plumb.* 28. 1263. 1811.
— *rosar.* 24. 413. 668. 690.
— *Valerian.* 585.
Argentamin 130. 147. 422.
Argent. chlorat. 1551.
— *colloidale* 1395.
— *nitr.* 83. 87. 69. 75. 160. 165. 169. 170. 172. 271. 297. 347. 418. 419. 420. 421. 4[illegible] 442. 444. 482. 560. 709. 7[illegible] 748. 762. 763. 1023. 10[illegible] 1042. 1220. 1281. 1351. 1513 1550 1709. 1743. 1815.
Argent. nitr. crystallisat. 128 129. 1247. 1701.
— *phosphor.* 1549.
Argonin 196.
Aristol 401. 886. 1216. 1249
Arsenic. alb. 56. 1181. [1520
Asa foet. 1029. 1033.
Asaprol. 1410.
Aspidium spinul. Extr. 1560
Aspirin 224. 1397.
Atropin. sulf. 132. 133. 178. 215 455. 601. 704. 705. 810. 975 981. 982. 994. 1261. 1614 1615. 1735.
Axung. 24. 662.
Balsam. copaivae 153. 154. 155 197. 477. 1388.
— *peruv.* 45. 69. 169. 180. 502 638. 743. 818. 1269. 1382 1468. 1470. 1606.
— *tolut.* 1584.
Baptistae, Pulv. lap. 26.
Belladonna fol. 1474. *Rad.* 1630. *Extr.* 102. 103. 192. 225. 228. 327. 355. 379. 382. 383. 384. 425. 438. 454. 528. 557. 579. 663. 679. 693. 706. 749. 816. 819. 849. 895. 979. 996. 998. 1019. 1025. 1054. 1342. 1474. 1537. 1632. 1738. *Tinct.* 567. 1055. 1631.
Benzoës flor. 613. 1774. *Tinct.* 45. 49. 636. 686. 1291. 1467.
Bismuth. carbon. 579.
— *loretin.* 638. 1626. 1691. 1720.
— *salicyl.* 249. 252. 1399. 1669.
— *subnitr.* 21. 162. 227. 249. 285. 288. 333. 391. 461. 484 625. 651. 685. 689. 916. 1622. 1695. 1707. 1737. 1738.
— *subsalicyl.* 1667. 1708.
Bitum. fagi 36. 220. 416.
Bolus 393.
Borax 414. 609. 645. 650. 6[illegible] 1242. 1490.

Borax ven. 60. 267.
Brayera 1573.
Bromalin 701. 702. 1126.
Bromidia 1124.
Bromoform 1640. 1806.
Cajeput. Ol. 1177.
Calabar. Tinct. 699.
Calam. 327. 1186. *Tinct.* 278.
Calcar. carbon. 417. 486. 1289.
— *chlorata* 1729. [1205.
Calc. carb. 1182. 1190. 1191.
— *chlor.* 494. 1127. 1692. 1787.
— *sulf.* 36. 220. 416. 496. 1694.
— *vic.* 1044. 1431.
Calomel 83 90. 92. 405. 447. 452. 598. 749. 868. 987. 1000. 1057. 1133. 1172. 1530. 1532. 1544. 1545. 1670.
Campech. Extr. 374.
— *Lign.* 239. 332.
Camphor. 24. 39. 76. 123. 341. 342. 352. 386 388. 461. 472. 570. 690. 948. 1061. 1062. 1175. 1177. 1202. 1226. 1288. 1308. 1318. 1327. 1493. 1494. 1674. 1676.
— *monobrom.* 1495.
Cannab. ind. Extr. 473. 564. 883. 1124. 1202. 1419.
Cantharid. Tinct. 503.
Captol 504. 505. 1471.
Carb. pulv. 485.
— *Tiliae* 1188.
Caryophyllor. Ol. 1177. 1178. 1183. 1188. 1226.
Cascar. Extr. fluid. 29. 377. 573. 823. 1066. 1150.
— *Tinct.* 292.
— *Vin.* 1150.
Cascarillae Tinct. 240. 574. Inf. 261. *Pulv.* 1190.
Castorei Tinct. 566. 891.
Catechu 1188. *Tinct.* 716.
Cera 155. 169. 399.
Ceresin 626.
Chamomill. Syr. 261. *flor.* 349. 475. 1029.
Chinae Tinct. 278. 301. 1427. 1451. *cort.* 319. 1188. 1190. *Dct.* 953. 1106. 1131. *Extr.* 1313. 1554.
Chinin. bimuriat. 957. 1636.
— *bisulf.* 964.
— *ferrocitr.* 360. 889. 1107.
— *hydrobrom.* 954.
— *mur.* 550. 928. 951. 1036. 1089. 1292. 1635. 1658.
— *salicyl.* 571.
— *sulf.* 456. 671. 774. 776. 825. 845. 950. 1116. 1303. 1314. 1324. 1382. 1412. 1443. 1600. 1774. 1775.
— *tannic.* 48. 963. 1102. 1444. 1634.
Chinoidin 952.
Chloralamid 899. 1416. 1609.
Chloralbacid 306. 307.
Chloralhydrat 104. 117. 235. 367. 395. 398. 591. 596. 597. 804. 894. 934. 948. 1031. 1060. 1103. 1124. 1175. 1415. 1471. 1575. 1641.
Chloralose 945.
Chloroform 380. 458. 499. 538. 570. 590. 602. 742. 873. 946. 993. 1177. 1296. 1421. 1428. 1569.
Chrysarobin 656. 744. 816. 819. 857. 1040. 1367. 1369. 1370. 1526.
Cina 86.
Cinnamom. 929. 1188. *Ol.* 1190. *Tinct.* 1077. 1082.
Citrophen 833. 926. 1663.
Cocain. muriat. 107. 177. 226. 230. 354. 395. 432. 453. 461. 471. 583. 747. 820. 877. 981. 997. 1011. 1014. 1049. 1091. 1121. 1212. 1218. 1277. 1330. 1343. 1353. 1620. 1621. 1622. 1741. 1750.
— *olein.* 974.
Cochlear. Spir. 268. 1178.
Codein 100. 193. 234. 568. 933. 1027. 1204. 1740.
— *phosph.* 1086. 1500.
Coffein. citr. 93. 211. 827. 1767.
— *hydrobrom.* 836.
— *natrobenz.* 1316. 1767. 176
Colchici, Tinct. 522. *Vinum* 5
Collod. pur. 728. 744. 1284.
Collyr. adstringens lut. 4

Colocynth. Extr. 1067. 1158. 1161.
Colombo 243. 263. 332. 335. 1624. *Decoct.* 262. 1625.
Conch. praep. 1190.
Condurango 221. 222. 302. *Vin.* 223. 303.
Convallaria majalis Inf. 1769. *Tinct.* 1770.
Corall. rubr. praec. 1186.
Cornutin 1076. 1498.
Cosaprin 1414.
Coto 254. 264.
Cremor tart. 1147.
Creolin 6. 140. 400. 756. 1113. 1347. 1786. 1802.
Creosot 412. 775. 1181. 1246. 1475. 1583. 1584. 1585. 1586.
— *valerian.* 1588. [1703.
Creosotal 1587.
Cresol 6.
Cret. alb. praep. 662. 1189. 1432. 1433. 1436.
Cubeb. pulv. 155.
Cumarin 945.
Cupr. sulf. 161. 429. 430. 761. 1248. 1254. 1255. 1477. 1479. 1710. 1721. 1725.
Cutol 627. 1286.
Damian. Extr. fluid. 920.
Dermatol 392. 449. 622. 623. 624. 1001. 1627. 1685.
Dextrin 22. 620.
Digitalin 1765.
Digitalis 89. 90. 673. 1761. *Dialysat.* 1772. *Inf.* 41. 588. 672. 1294. 1307. 1315. 1426. 1760. 1773. *Tinct.* 60. 585. 674. 1301. 1762. 1777.
Digitoxin 1764.
Dionin 196. 1007.
Diuretin 91. 1097. 1779.
Dormiol 941.
Duboisin. sulfur. 896. 976.
Elect. lenitiv. 1140.
Elix. Acid. Halleri 1073. 1104. 1447. 1757.
Empl. adhaes. 68. 413.
— *cerussae* 492.
— *Diachyl. simpl.* 312. 605.
— *hydrargyr.* 787. 1486. 1651.
Empl. Lithargyr. 848.
— *oxycroc.* 787.
— *saponat.* 491. 1054. 1266. 1486. 1651.
Emulsio amygdalina 686.
Epicarin 607. 608. 649. 862. 1434.
Ergotin Bombelon 490. 794. 797. 801. 814. 1322.
— *Bonjean* 1497.
Erythroltetranitrat 1507.
Eserin. sulf. 783. 786. 984. 1114. 1736.
Eucain A 821. 1348.
— *B* 1344.
Eucalyptol 213. 255.
Eucalypt. Decoct. 960. *Ol.* 777. *Tinct.* 1184.
Euchinin 955. 965. 1637.
Eudermol 1440.
Eugallol 1365.
Eunatrol 328.
Euphorin 1403.
Europhen 394. 1684. 1719.
Exalgin 366. 508. 927. 1118.
Ferratin 323.
Ferripyrin 324. 714.
Ferrum albumin. Drees. 320.
— *carbon. sacchar.* 359. 456. 839. 873. 1457. 1532.
— *citr. ammon.* 317.
— *et Natr. pyrophosph.* 1394.
— *hydrogen. reduct.* 671. 1313.
— *jodat. sacchar.* 318. 464.
— *lact.* 315. 1458. 1554.
— *oxydat. dialys.* 314.
— *pom.* 313. 365. 1051.
— *red.* 319. 1314.
— *sulf.* 316. 774.
Filix mas Extr. 58. 1557. 1558. 1561. 1563. 1566. 1567. 1568. 1569. 1571. 1574.
— *Pulv.* 1568.
Flores Tiliae 375.
Formaldehyd 759.
Formalin 759.
Gallanol 643. 1371.
Gallar. Tinct. 406. 695. 716. [1422.
Gallicin 450.
Gelatina 615. 616. 809. 815. 1368.

Gelsemii Tinct. 1122.
Gentian. Rad. 89. 178. 280. 300. 327. 776. 1204. 1314. 1583. *Extr.* 1314.
Glycirrhiza Extr. 1124.
Glycerin 9. 20. 22. 29. 39. 65. 66. 74. 149. 165. 167. 272. 328. 403. 407. 430. 431. 534. 537. 616. 620. 624. 637. 638. 639. 640. 645. 648. 658. 659. 661. 722. 724. 739. 740. 765. 767. 768. 769. 794. 817. 1808.
Goldcream 1543. 1544.
Guaethol 1590.
Guajacetin 1589.
Guajaci Resina 1758.
Guajacol 1300. 1578. 1579.
— *carb.* 1580.
Gummi arab. 144. 544. 554. 558. *Mucilag.* 24.
Gummi Gutti 1161.
Gyps. p. 1488. 1730.
Haemol 322.
Haemol bromat. 893.
Haemogallol 322.
Hamamel. Extr. 800.
Herniar. herb. 151. 468. 1386.
Heroin 101. 195. 357. 1006.
Hetokresol 1595.
Hetol 1595.
Homatropin. hydrobrom. 977.
Hordei Decoct. 1305.
Hydrarg. ammoniat. 861.
— *bichlorat. corros.* 5. 18. 533. 682. 683. 686. 746. 760. 1038. 1478. 1482. 1534. 1541. 1783. 1784. 1785. 1805.
— *bijodat.* 1547.
— *chlor.* 57. 344. 552.
— *praec. alb.* 16. 21. 173. 411. 438. 440. 454. 501. 685. 689. 917. 972. 996. 1039. 1110. 1280. 1361. 1522. 1535. 1647. 1648.
— *praec. flav.* 451. 866. 1002.
— *praec. rubr. 164. 867.* 1231. *1487. 1523. 1536. 1683.* 1726.
— *protojod. 1531. 1539.*
— *salicyl. 1546.*
— *sulf. rubr. 27.*
— *tann. oxydul. 1538.*
Hydrast. canad. Extr. 198. 799. 805. 824. 1081.
Hydrogen. superoxydat. 67.
Hydromel. infant. 1163.
Hyoscyamin 1260.
Hyoscyami Extr. 191. 473. 664. 911. 940. 1010. 1087. 1601. 1763. *Fol.* 940.
— *Ol.* 946. 1210. 1225. 1296. 1421.
— *Tinct.* 567.
Hyoscin 369.
— *hydrobrom.* 1262.
— *hydrojod.* 983. 1616.
Hypnal. 943.
Ichthalbin 822. 1349.
Ichthyol 21. 22. 141. 529. 619. 620. 722. 728. 739. 789. 887. 1071. 1072. 1271. 1272. 1356. 1423. 1543. 1690.
Ipecac. Inf. 119. 182. 206. 1016. 1085. 1192. 1312. *Pulv.* 102. 189. 663. 1026. *Tinct.* 1503. *Rad.* 553. *Syr.* 1017. *Extr.* 1148.
Irid. flor. 15. 843. 968. 1182. 1185. 1186. 1189. 1191.
Itrol 148.
Jaborand. Fol. 97. 372. 670.
Jalapa 283. 1057. 1145. 1172. 1561. *Resina* 1142. 1161.
Jambul. 509.
Jequirity Semen 433.
Jod. pur. 13. 29. 65. 272. 406. 407. 463. 525. 538. 696. 764. 768. 790. 817. 869. 1068. 1070. 1219. 1226. 1264. 1279. 1284. 1300. 1381. 1516. 1519. 1697. 1706. 1715. 1722. *Tinct.* 406. 695. 717. 720. 724. 764. 788. 870. 988. 1092. 1179. 1380. 1422. 1517. 1518. 1715.
Jodipin 114.
Jodoform 9. 10. 11. 32. 38. 392. 448. 493. 540. 694. 767. 772. 816. 819. 872. 1001. 1069. 1267. 1269. 1270. 1485. 1514. 1515. 1716. 1728. 1734. 179[illegible] 1797. 1798. 1799. 1800. 18[illegible]
— *bibumin.* 1717.
Jodoformvasogen 31.

Jodol 727. 1712. 1713.
Jodopyrin 925. 1120. 1400.
Jodquecksilberhämol 1540.
Jodvasogen 80.
Juniper. Inf. 86. 89. 1095.
— *Fruct.* 1299.
— *Lign.* 1299.
— *Roob.* 1096. 1778.
Kal. acet. 85. 94. 97. 1094. 1095. 1096. 1294. 1449. 1778.
— *arsen.* 668. 1259.
— *brom.* 358. 364. 568. 599. 600. 698. 699. 700. 828. 892. 942. 1032. 1124. 1125. 1203. 1321. 1548. 1639.
— *carbonic.* 20. 688. 1438. 1442.
— *caust.* 631. 1043. 1044. 1045. 1052. 1682. 1724. 1791.
— *chlor.* 61. 71. 124. 265. 543. 751. 781. 846. 1128. 1480. 1508. 1809.
Kal. hydrojod. 463. 817. 989. 1297. 1697.
Kal. hypermang. 85. 63. 72. 131. 137. 217. 417. 424. 480. 495. 758. 1287. 1452. 1489. 1509. 1512. 1693. 1810.
Kal. jodat. 29. 60. 65. 79. 81. 117. 216. 272. 311. 329. 407. 457. 523. 525. 674. 696. 768. 790. 869. 874. 986. 1004. 1035. 1058. 1068. 1070. 1093. 1219. 1226. 1264. 1278. 1279. 1298. 1381. 1425. 1516. 1537. 1547. 1604. 1706. 1722.
— *natr. tart.* 1169.
— *nitr.* 420. 421.
— *picro-nitr.* 1577.
— *sulf.* 289.
Kamala 1563. 1565.
Kino 1183.
Kusso 1564.
Lactophenin 831. 1599. 1662.
Lanolin 16. 23. 166. 312. 355. 391. 394. 401. 440. 493. 526. 651. 655. 685. 689. 747. 748. 789. 818. 820. 821. 865.
Largin 150. 428.
Lenigallol 630.
Loristici rad. 88.
Lueral 50. 1529.
Linctus gum. 123.
Lini Semen 152. 465.
Lipanin 1393.
Liqu. ammon. anis. 120. 184. 208. 228. 351. 1085. 1810. 1508. 1605. 1677.
— *ammon. caust.* 459. 499.
— *Burowi* 692 1198. 1288.
Liquirit. rad. 56. 86. 105. 186. 193. 215. 665. 666. 705. 774. 1260. 1577. *Succus* 81. 587. 1260.
— *pulv. comp.* 1153. 1154.
Liq. ferr. album. Drees 55.
— *Kal. arsen.* 362.
Lithargyr. 163. 619.
Lith. carb. 513. 524. 1232.
— *citric.* 514.
— *salicyl.* 1398.
Lobeliae Tinct. 115. 585. 1776. 17 7.
Losophan 618. 859. 1528.
Lupuli Extr. 357. 1494.
— *gland.* 1494.
Lupulin 357. 469. 678. 1887.
Lycetol 517. [1498.
Lysidin 516.
Lysol 6. 756.
Magnes. carb. 477. 1185. 1187.
— *citr.* 1143.
— *salicyl.* 1666.
— *sulf.* 915. 1132. 1203.
— *ust.* 158. 256. 274. 290. 293. 381. 579. 969.
Maid. Stigmata 524.
Manna 1144.
Mannit 1164.
Melissae Spir. 1178.
Mel. ros. 64.
Menthol 7. 214. 254. 326. 458. 583. 779. 821. 837. 878. 912. 948. 1344. 1348. 1592. 1629.
— *valer.* 836. [1745.
Menthol-Jodol 1250.
Menth. Ol. 843. 1178. 1183. 1185. 1267. 1475.
Methylenblau 961.
Methylium salicyl. 1411.
Migränin 882.
Mixt. oleos. 204. 352. 1017. 1448 1475.

Mixt. gummos. 118. 288. 350. 467. 582. 1030.
Morph. acet. 1209.
Morph. mur. 188. 189. 242. 276. 288. 339. 340. 356. 378. 469. 470. 582. 582. 593. 670. 773. 791. 794. 807. 810. 876. 894. 930. 931. 932. 938. 949. 1009. 1012. 1013. 1014. 1020. 1024. 1026. 1059. 1088. 1100. 1181. 1207. 1211. 1218. 1273. 1276. 1303. 1472. 1501. 1603. 1700. 1704. 1739. 1775.
Moschus 40. 77. 343. 603. 1030. 1319. 1678.
Myrrha 52. 197. 1161. 1182. 1188. 1190. *Tinct.* 268. 570.
Myrtilli Extr. 629.
Myrtol 181. 780.
Naftalan 642.
Nanning, Extr. Chinae 578.
Naphthalin 555. 559. 1237. 1238. 1646. 1668.
Naphthol, α- 617. 661. 691. 855. 863. 884. 885. 1111. 1334. 1357. 1362. 1363. 1433. 1485. 1527. 1669.
Napthol, β- 23. 24. 404. 1222. 1241.
Natr. acet. 511.
— *arsen.* 1378. 1586.
— *benz.* 524.
— *biborac.* 688.
— *bicarb.* 189. 190. 224. 227. 252. 273. 274. 281. 284. 287. 288. 289. 290. 291. 293. 316. 462. 506. 572. 580. 664. 907. 1008. 1149. 1154. 1162. 1232. 1240. 1243. 1382. 1820.
— *brom.* 236. 697. 700. 892. 1125. 1224.
— *cacodyl.* 1597.
— *carb.* 111. 337. 510. 903. 1186. 1253.
— *caust.* 535.
— *chlor.* 111. 149. 211. 289. 336. 353. 462. 512. 809. 956. 1162. 1240.
— *cinnamyl.* 1594.
— *jodat.* 112.
— *nitros.* 1506.
Natr. phosph. 521. 1171. 1233. 1746.
— *salicyl.* 99. 330. 373. 462. 474. 507. 527. 547. 580. 980. 991. 1240. 1293. 1302. 1395. 1396. 1445. 1659. 1749. 1759.
— *sozojodol.* 541.
— *subsulf.* 1551.
— *sulfoichthyol.* 526.
— *sulf.* 289. 1149. 1162. 1168.
Nicotian. Inf. 1576.
Nirvanin 1176.
Nitroglycerin 105. 106. 841. 1504. 1505.
Nosophen 393. 621. 622. 1214. 1719.
Nux vomica Tinct. 277. 295. 296. *Extr.* 298. 908. 919. 1256. 1554.
Ol. amygdal. 38. 46. 499. 554. 558. 1283. 1391. 1579. 1798.
— *Bergamott.* 25. 605. 1668. 1797.
— *cadini* 46. 640. 738. 1358. 1359. 1432.
— *camphor.* 387.
— *carvi* 376.
— *caryophyll.* 1442.
— *Crotonis* 554. 1157.
— *fagi* 662. 1346. 1373.
— *foeniculi* 108. 1499.
— *jecor. Aselli* 1206. 1390. 1392. 1578. 1585. 1611.
— *lavandul.* 777. 1283. 1360. 1442.
— *lini* 389. 390. 1435.
— *Mac.* 500. 1183.
— *Menth. pip.* 767. 1174.
— *Neroli* 649.
— *olivae.* 10. 326. 391. 393. 394. 500. 559.
— *Papaver.* 1236.
— *ped. tauri* 49.
— *petrae* 1139.
— *pini* 208. 777.
— *ricini* 85. 502. 501. 551. 1134. 1135. 1285. 1470. 1566. 1570.
— *ros.* 26. 48.
— *rusci* 639. 1333. 1346. 1
— *rutae* 1360.
— *lign. Santali* 156. 158

Ol. tereb. 179. 180. 199. 477. 531. 544. 724. 778. 856. 992. 1420. 1570. 1606.
Onon. spin. 87. 88. 1094. 1299. 1778.
Opium 167. 237. 241. 333. 385. 487. 488. 506, 567. 594. 749. 797. 802. 1396. 1624. 1653. 1674. 1675. 1737. 1744. *Tinct.* 64. 136. 182. 202. 238. 239. 240. 251. 260. 334. 336. 338. 339. 374. 482. 465. 586. 595. 782. 806. 964. 1003. 1174. 1225. 1252. 1275. 1328. 1329. 1605. 1654. 1656. 1671. 1673. *Extr.* 197. 335. 379. 813. 898. 914. 947. 999. 1085. 1202. 1210. 1273. 1539. 1672. 1743
Orexin. basic. 305. 880.
— *tannic.* 305. 581.
Orphol s. Bismuth. β-naphthol.
Orthoform 231. 1688. 1742.
Oss. sepiae 1182.
Oxycampher Sol. 587.
Papain 650.
Papayotin 536.
Paraffin. liq. 17. 399.
Paraldehyd 897. 937. 1056.
Pelletierin sulf. 1559. [1607.
Pepsin. 308. 542. 575.
Peronin 194. 1602.
Pertussin 1644.
Petrol. 743. 1112.
Petroselini Fruct. 1299.
Phenacetin 827. 830. 924. 1599. 1660.
Phenocoll. mur. 520. 1404.
Phenol. monochlor. 1702
Phosphor. 1206. 1391. 1392. 1393.
Physostigmin 368.
Pichi Extr. 157.
Picrotoxin 703.
Pilocarpin. mur. 98. 370. 542. 543. 669. 784. 985. 1115.
Piperazin 515.
Piper nigr. 54. 56. 1379.
Pix liquid. 496. 641.
Plumb. acet. bas. sol. 393. 409. 415. 442. 446. 498. 644. 723. 730. 750. 791. 802. 803. 1100. 1196. 1215. 1290. 1675. 1679. 1680. 1812. 1813.
Plumb. carbon. 428. 610. 1463.
Podophyllin 327. 911. 1159. 1160. 1166.
Protargol 149. 437. 445. 793.
Ptesin 1414.
Pulv. Dower. 190. 210. 243. 263. 1008. 1021. 1084. 1617.
Pun. granat. 1556. 1557. 1558. 1561, 1572.
Pyoctanin 481.
Pyramidon 1665.
Pyridin 109.
Quebracho Extr. 116. *Tinct.* 116. 584.
Quercus Decoct. 1331.
Quillaja Tinct. 1241.
Ratanh. Decoct. rad. 268. *Tinct.* 260. 574. 1178.
Resorbin 1286.
Resorcin 17. 18. 142. 223. 253. 275. 295. 345. 346. 349. 483. 502. 504. 537. 577. 648. 729. 745. 860. 879. 905. 1275. 1470. 1525. 1705. 1711.
Rhamni frangul. Extr. (Rhamnin) 1152.
Rheum Extr. 909. 1067. 1160. *Inf.* 291. 1170. *Rad.* 256. 290. 314. 464. 553. 573. 908. 1154. 1155. 1156. 1158. 1161. 1458. *Tinct.* 214. 222. 304. 913. 1141. 1165.
Rhus aromat. Tinct. 677.
Rotterin 1803.
Saccharin 511.
Sal amar. 78. 1136. 1137.
Salacetol 1408.
Salep Decoct. 237. 251. 260. 334. 347. 1328. 1671. 1673.
Salicin 250. 1407.
Saligallol 1366.
Saligenin 1406.
Salipyrin 922. 1401.
Salocoll 1409.
Salol 114. 158. 252. 460 [illegible] 1389. 1399. 1708.
Salophen 834. 923. 1405.
Salviae fol. 1455. 1618. Ti[illegible] 1619.

Sandaraca 1180.
Sanguinoform 325.
Sanoform 1687.
Santonin 57. 83. 84. 85. 1236. *Trochisci* 82.
Santal. lign. 476. 1186.
Sapo kal. 19. 1361. 1437. 1520.
— *med.* 1145. 1159. 1234. 1333. 1439.
— *unguin.* 1046.
— *virid.* 23. 50. 404. 641. 662. 684. 736. 738. 851. 862. 863. 1354. 1359. 1373. 1432. 1433. 1465.
Scilla 89. 1763. *Extr.* 1096.
— *Oxymel.* 85. 121. 1095. 1294. 1301. 1773. *Tinct.* 1301.
Scopolamin. hydrobrom. 978. 995.
Secale cornut. Extr. 2. 4. 489. 569. 792. 796. 798. 807. 808. 815. 1075. 1080. 1101. 1107. 1108. *Pulv.* 1063. 1074. 1555. *Inf.* 1. 806. 1064. 1078. 1320.
Seignetti, Sal 589.
Seneg. Inf. 184. 208. 1317. *Pulv.* 1147. *Syr.* 1312.
Senna Inf. 78. 1132.
Simulo Tinct. 710.
Sinapis, Ol. 1420.
Sirolin 1582.
Solanin 571.
Sol. arsen. Fowleri 55. 114. 229. 320. 361. 953. 962. 1034. 1050. 1051. 1117. 1375. 1376. 1552.
Somnal 901. 944.
Spartein. sulf. 1771.
Spec. laxant. St. Germ. 1138.
— *pectorales* 185.
Spermacet. 734. 1461.
Spir. aeth. 351. 1174.
— *cochlear.* 1450.
— *colon.* 687. 688.
— *lavand.* 403. 853. 854. 863. 1465.
— *Rosmarin* 503.
— *sap. kal.* 402. 617. 639. 659. 691. 852. 1355.
— *vin.* 12. 13. 18. 43. 200. 397. 459. 499. 502. 504. 531. 532. 538. 587. 618. 654. 658. 659. 660. 661. 703. 704. 717. 718. 724. 775. 859. 1005. 1068. 1346. 1359. 1360. 1371. 1465. 1470. 1471. 1541.
Spir. vin. gall. 20. 45. 47. 66. 270. 443. 853. 854. 855. 1340. 1467. 1468. 1747.
— — *Cognac* 8.
Staphisagriae, Tinct. 920.
Stib. sulf. aurant. 186. 187. 192. 664. 1195. 1774.
Stramm. Extr. 585.
Stront. brom. 707.
— *lact.* 96.
Stroph. Tinct. 588. 675. 1295. 1427. 1766.
Strychn., Extr. 44. 379. 561. 579.
— *nitr.* 42. 43. 51. 80. 127. 371. 667. 680. 735. 1173. 1257. 1258. 1553. *Tinct.* 240.
Stypticin. 3. 1082.
Styrax Ung. 24.
— *liqu.* 1436. 1437. 1441.
Sudol-Crême 888.
Sulfonal 898. 936. 1418. 1608.
Sulfosotsyrup 1598.
Sulfur. citr. 1373. 1431.
— *Flor.* 541. 649. 662. 1432. 1436. 1438. 1758.
— *Lac.* 19. 24. 403. 617. 659. 1442.
— *praec.* 19. 23. 404. 690. 861.
— *subl.* 24. 27.
Syrup. ferr. jodat. 681. 1037. 1459. 1610.
— *mannat.* 589. 1135. 1143. 1165. 1235.
— *senegae* 183. 207.
Talc. ven. 25. 125. 647. 969.
Tamarind. Decoct. 910. *Pulpa* 1143.
Tanacet. Inf. 1235.
Tannalbin 245. 258.
Tannigen 244. 257.
Tannin 126. 187. 188. 241. 242 243. 460. 472. 487. 765. 7 801. 812. 1020. 1099. 1 1559. 1624. 1699. 1744.
Tannoform 246. 259. 970

Tannon (= Tannopin) 247.
Tanocol 248.
Taraxaci Extr. 102. 671. 1155.
Tart. stib. 41. 68. 118. 1192. 1758.
Terpin 200.
Terpinhydrat. 1642.
Terra silicica 328.
Thallin. sulf. 1664.
Theobromin. 1098. 1780.
Thilanin 606.
Thiocol 1581. 1591.
Thioform 439.
Thiol 850.
Thymol 59. 390. 530. 742. 861. 1178. 1221. 1484. 1803.
Tinctura amar. 277. 296. 301. 346. 1460.
— *capsici* 1505.
— *ferr. acet.* 1078. 1762.
— *ferr. chlor. aeth.* 595.
— *Gallar.* 73. 720. 764. 782. 788. 1454. 1510. 1517.
— *mal. ferr.* 1460.
— *nuc. vom.* 232. 566.
— *Ratanhiae* 73. 782. 847. 1454. 1510.
Toncae Faba 1794.
Traumaticin 643. 656. 1040.
Trifolii Extr. 299.
— *fibr. herb.* 909. 1156.
Trikresol 6.
Trional 902. 935.
Tuberculin 1046.
Tumenol 625. 1345.
Tussol 1613.
— *Belladonnae* 1119.
Ung. cerussae 612.
— *cinereum* 979.
— *Crédé* 1384.
— *Diachylon* 176. 604. 883. 1228. 1521. 1649.
— *emolliens* 48. 844. 1201. 1207. 1230. 1264. 1330. 1362. 1423. 1523. 1533. 1536. 1646.
— *glycerin.* 54. 1268.
Ung. hydr. ciner. 425. 998. 999. 1109. 1119. 1265. 1424. 1533. 1542.
— *Plumb.* 844. 1283.
— *Plumb. acet.* 219. 611.
— *Sambuci* 749.
— *simpl.* 438.
— *Zinc. oxyd.* 649. 887.
Urea pur. 95.
Uricedin 518
Uropherin 1781.
Urotropin 519.
Uvae urs. fol. 151. 468. 1386.
Valerian. Extr. 706. *Inf.* 892. 1061. 1677. *Radix* 77. 706. *Tinct.* 376. 567. 890. 891. 1473. 1757. 1762.
Vanillin 1781.
Vaselin 16. 21. 27. 133. 164. 173. 174. 175. 177. 313. 355. 391. 394. 410. 411. 429. 440. 493. 501. 505. 605. 609. 621. 622. 623. 636. 655. 683. 684. 689. 741. 745. 748. 789. 818. 816. 820.
Viburn. prunif. Extr. 7. 8. 568.
Vinum malac. 775. 799.
— *stibiat.* 121. 548. 1312.
— *Xerense* 1547.
Xeroform 441. 635.
Xylol. 1753.
Zinc. chlor. 34.
— *flor.* 173. 625. 1229.
— *mur.* 1481.
— *oxyd.* 14. 17. 24. 175. 359. 410. 613. 616. 622. 623. 624. 634. 647. 706. 733. 818. 842. 862. 864. 895. 967. 971. 973. 1201. 1462. 1524. 1632. 1648. 1681. 1689. 1807. 1814.
— *phosph.* 919.
— *sozojodol.* 186. 1022. 1244.
— *sulfocarb.* 135.
— *sulfur.* 134. 159. 163. 171. 436. 478. 713. 754. 771. 1217.
— *valerian.* 1033.

1. Receptformeln

nebst

therapeutischen Winken.

und Astasie vide: asthenie.

inaltyphus vide: Typh.

s.

ylactisch: Körperliche tige Ruhe, ev. Bettruhe; sche Behandl. d. Schwan- i Verdacht auf Syphilis. rhafter Erkrankung der eren energ. Antipyrese. ngen, welche den A. be- lassen, sind, solange keine lenen Wehen auftreten, Bettruhe zu behandeln. ler Abortus nicht mehr ten, enthalte man sich t allzu heftiger Blutung griffs. Bei schleppendem d. bei stärkerer Blutung:

. cornut. 5·0,
nd. c. aq. fero. q. s.
colat. 100·0.
/4ständl. 1 Esslöffel.

Secal. corn. 1·0
cerin.,
dest. aa. 5·0.
Zu subcutaner Injection.

ticin. 1·0,
cinnamom. 20·0.
—5mal tägl. 20 gtt. in wasser.
ett. Stypticin. (à 0·05)
Nr. XX.
-6mal tägl. 1 Stück.

4. Extr. Secal. corn. 2·0,
Aq. dest. 120·0,
Spirit. vini Cognac. 20·0,
Syr. simpl. 10·0.
S. 1—2stündlich 1 Esslöffel.

Bei intensiv. Blutung Eisbeutel auf die Bauchdecken, Kühlapparat, Scheidentamponade mit Jodoformgaze. Nach 4—6 Stunden Entfernung d. Tampons, hierauf Desinfection der Scheide.

5. Mercur. subl. corr.
Natr. chlorat. aa. 0·25,
Aq. dest. 500·0.
S. 1/2%0 Sublimatlösung zur Desinfection.

6. Acid. carbol.
od. Creolin. (Pearson)
od. Lysol.
od. Cresol. pur liquefact.,
od. Trikresol. 20·0,
Aq. dest. 1000·0.
S. Zur Desinfection.

Bei unvollkommenem Abgang des Eies oder bei Jauchung Entfernung d. Eireste mit d. Curette.

Als Palliativmittel:

7. Extr. viburn. prunifol. fluid.
Menthol 0·2. [50·0.
S. 3—4mal tägl. 1 Esslöffel.

8. Extr. viburn. prunifol. fluid.
Antispasmin 1·0. [20·0
Spirit. vin. Cognac. 20·0
Syrup. Coffeae 20·0,
Aq. dest. 60·0.
S. 1—2stündlich 1 Es

Abscessus frigidus, kalter Abscess.

Allgemeinbehandlung. Roborirendes Regime. Entleerung des Eiters mittelst Punction od. Aspiration. Sorgfältige Vermeidung des Lufteintrittes in die Abscesshöhle. Unmittelbar nach der Entleerung des Eiters Injection von annähernd derselben Menge einer Jodoformemuls., hierauf Druckverband.

9. *Jodoform 10·0,*
   Glycerin. 100·0.
   S. Jodoformemulsion.
10. *Jodoform 10·0,*
    Ol. olivar. recent. 90·0.
    S. Zur Injection.
11. *Jodoform 5·0,*
    Aether. sulfur. 50·0.
    S. Jodoformäther.

Accumulatio ceruminis

vide: Cerumenanhäufung.

Acne rosacea.

Causale Behandlung (weibliche Sexualleiden, Gastritiden, Alkoholismus etc.). Die locale Behandlung entspricht in leichteren Fällen der der Acne vulgaris (s. d.). Bei höheren Graden ist Scarification der Knoten geboten, wobei die erweiterten Gefässe der Länge nach aufgeschlitzt werden. Der Blutung wegen ist hier das Glüheisen (Paquelin) dem Messer vorzuziehen. Nach dem Eingriffe Einpinselung des Theiles mit

12. *Acid. carbol. c. p. 10·0,*
    Alcohol. 40·0.
    S. Einpinselung.
13. *Jod. pur. 0·20,*
    Spirit. vin.,
    Glycerin. aa. 10·0.
    S. Zum Einpinseln.

Acne vulgaris, Finnen.

Aetiolog. zu beachten: Chlo-
se, Frauenkrankheiten, Dys-
pepsie, Jod, Brom etc. We
steigerte Darmfäulniss n
weisen, Menthol (0·6–1·0 pr
Gelatinekapseln). — Ausdr
der Sebumpfröpfe. Eröffnu
Abscesschen mittelst S
stouri oder Stichel, Absc
der Haut mit dem scharfen
Abreibung mit Spir.
kalin., Glycerinseife oder
Crême mittelst Flanells. Zu
genügt d. Application des
mercuriale über Nacht od
Auflegen einer mit Schmi
bestrichenen Gesichtslarve,
gens Bestreuung mit einem
pulver.

14. *Oxyd. Zinc. 5·0,*
    Amyl. pur. 30·0.
    S. Streupulver.
15. *Amyl. pur. 50·0,*
    Alum. plumos. pulv.
    Pulv. rad. Ir. flor. 2
    S. Streupulver.
16. *Merc. praecip. alb.*
    Lanolin 40·0,
    Vaselini 10·0.
    S. Salbe.
17. *Resorcin 10·0,*
    Zinci oxyd.
    Amyli aa. 25·0,
    Paraffin. liquid. ad
    S. Salbe.
18. *Resorcin. 2·0,*
    Hydrarg. bichlorat.
    Spirit. q. s. ad 100·0
    S. Zum Abreiben der
    (Unna.)
19. *Acid. salicyl. 2·0,*
    Sulfur. praecip.
    Sapon. kalini aa. 5
    S. Salbe (d. 8 Tage
    aufzulegen).
20. *Lactis sulfur. 5·0,*
    Kali carbon. 2·0,
    Glycerini pur. 10·0
    Spir. vin. Gallici
    M. f. pasta mollis.
    S. Pasta. (3 Abde.
    Morgens wegwaschen
    eine d. obig. Salben e

21. *Bismuth. subnitr.,*
Hydrarg. praec. alb.
Ichthyol. aa. 2·0.
Vaselin. 20·0.
S. Vor dem Schlafengehen dick auftragen. (Schälpaste bei voluminöser Acne.)

22. *Ichthyol. 3·0.*
Aq. dest.,
Glycerini.
Dextrini aa. 10·0.
S. Pasta.

23. *Naphthol-β 10·0*
Sulf. praecip. 50·0,
Lanolini puriss.,
Sapon. viridi. aa. 25·0.
M. f. pasta mollis.
S. Pasta. (Messerrückendick 15—30 Minuten auflegen, darauf abwischen und bepudern.)

24. *Sulfur. sublimat. 7·0,*
Unguent. styrac. 2·0,
β Naphthol. 2·0,
Axung. 50·0.
S. Salbe (an 6 Abenden kräftig einreiben).

25. *Lact. sulfur 6·0.*
Camphor. ras. 0·5.
Mucilag. gumm. arab. 3·5.
Subige et admisce:
Aq. calc.,
Aq. rosar. aa. 50·0.
S. Gut umgeschüttelt aufzutragen. Am nächsten Morgen abwaschen und die Haut mit dünner Fettschichte einreiben. Poudre darüber streuen und leicht abwischen.

Als Poudre:

26. *Pulv. lapid. Baptistae,*
Talc venet.,
Amyl. oryzae aa. 30·0,
Zinc. oxydat. 10·0,
Ol. Rosar. guttas 4.
S. Poudre.

Bei Acne necrotica:

27. *Hydrarg. sulf. rubr. 0·5,*
Sulf. subl. 12·0,
Ol. Bergamott. gtt. XV.
Vaselin. flac. ad 50·0.
S. Salbe. (Lassar.)

Actinomykose, Strahlenpilzkrankheit.

Frühzeitige Eröffnung der Abscesse, Spaltung der Fisteln, Evidement mit dem scharfen Löffel, strenge antiseptische Behandlung. Eisumschläge und Bepinselung der Haut mit Jodtinctur. Innerlich und local hat sich Jodkali (1—2 Grm. pro die) vielfach bewährt.

Adenitis inguinalis (Bubo).

Anfangs Ruhe, kalte Umschläge oder feuchtwarmen Compressionsverband. Bei intacter Haut Jodeinpinselungen. Bei Entzündung der Haut Umschläge mit Aqua Goulardi u. dgl.

28. *Alumin. crud. 5·0,*
Aq. plumbi 25·0,
Aq. dest. 500·0.
(Essigs. Thonerde.)
S. Zu Umschlägen.

29. *Kal. jodat. 1·0,*
Jodi puri 0·10,
Glycerin. 20·0.
S. Aeusserlich.

30. *Jodovasogen. 6%ig.*
S. Aeusserlich.

31. *Jodoformovasogen. 1½%ig.*
S. Zu Injectionen in die afficirten Partien.

Bei constatirter Fluctuation Eröffnung der Abscesse mittelst Spitzbistouri, eventuell Evidement mit dem scharfen Löffel, Eingiessen von Jodoformemulsion (vide Nr. 9), antiseptischer Verband. Jodoform in Pulver- od. Gazeform, 5% Carbol- oder 1‰ Sublimatlösung.

32. *Jodoform. pur. 10·0.*
S. Aeusserlich. (Mit einem Haarpinsel in die Wundhöhle zu streuen.)

Lang's Verfahren besteht Entleerung des Eiters durch minimale Incisionswunde.

Injection von $^1/_2$—1%iger Lapislösung, hierauf Druckverband durch 48 Stunden und neuerliche Injection; Heilung in 8 Wochen.

33. Argent. nitr. 0·25—0·50,
Aq. dest. 50·0,
ad vitr. nigr.
S. Zu Handen d. Arztes.

Bei diphtheritisch belegten Adenitiswunden:

34. Zinci chlor. 5·0,
Aq. dest. 30·0.
S. Zum Bepinseln.
35. Kali hypermang. 1·0,
Aq. dest. 500·0
S. Zur Wundirrigation.

Bei progressiver Gangränescenz Bestreuung der Wundflächen mit Gypstheer:

36. Bituminis fagi 20·0,
Calcariae sulfur. 80·0.
S. Aeusserlich.

Zum Cauterisiren d. Wundränder, der Granulationen od. zu Stichelungen etc.:

37. Argenti nitr. fusi 10·0.
S. Zu Handen des Arztes.
(Lapis, Lapisstift, Lapis en crayon.)

Bei Fistelgängen Durchspülung derselben mit antisept. Flüssigkeiten, Einführung von Jodoformstaben, eventuell Spaltung und Auskratzung der Fisteln:

38. Jodoform. 10·0,
Butyr. Cacao 20·0,
Ol. Amygdal. rec. q. s. ut
f. bacilli Nr. X.
S. Jodoformstäbchen.

Agrypnie, Schlaflosigkeit,

vide: Insomnia.

Alkoholismus.

Bei massigen Graden von *acutem Alkoholism.* überlasse *man d. Berauschten* dem Schlafe *bei geöffneten* Kleidern in frischer *Luft und mit* erhöhtem Kopfe.

Entleerung des eventuell noch gefüllten Magens mittelst Magenpumpe oder durch Brechmittel. Darreichung v. schwarzem Kaffee und Thee etc.

Bei drohendem Collaps:

39. Camphor. 0·5,
Glycerin.,
Aq. dest. aa. 5·0.
S. Injection.
40. Moschi 0·50.
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p dio. in dos. = 5.
S. $^1/_2$stündlich 1 Pulver.

Delirium tremens schwindet häufig ohne medicamentöse Behandlung. Man halte den Kranken durch einige Tage in einem theilweise verdunkelten Zimmer bei Fieberdiät und gestatte kleine Dosen Alkohol. Bei längerer Dauer des Leidens sind Hypnotica in grösseren Dosen angezeigt (s. Insomnia) u. Herzmittel:

41. Inf. fol. Digital. e 2·0 ad 180·0,
Tart. stibiat. 0·1,
Syr. simpl. 30·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei den schweren Formen des chronischen Alkoholismus ist die Grundbedingung der Heilung: die Entwöhnung vom Alkohol, nur in seltenen Fällen erreichbar. Stete Ueberwachung des Kranken, am besten in einem Sanatorium, ist zu diesem Zwecke zu empfehlen. — Verbesserung der Constitution durch Behandl. des chronischen Magencatarrhs.

42. Strychnin. nitr. 0·04,
Aq. dest. 10·0.
S. Tgl. 1—2 Inject.
43. Strychnin. nitr. 0·05—0·1
Ac. phosphor. dil. 15·0,
S. 3mal tägl. 10 Tropfe
44. Extr. nuc. vom. 0·5,
Spir. vin. 5·0,
Ac. phosphor. dil. 10·(
S. 3mal tägl. 10 Tro

Alopecia. Haarschwund.

Berücksichtigung d. Gesammtzustandes. Tonisirende Behandl. und Diät. Zunächst Beseitigung der Seborrhoe (s. d.), sodann Bepinselung der Kopfhaut mit alkoholischen Mitteln.

45. Tinct. Benzoës 2·0,
Acid. salicyl. 1·0,
Spir. vin. Gallic. 200·0.
S. Aeusserlich.

46. Olei Cadini
Ol. amygdal. dulc. aa. 25·0.
S. Morg u. Abds. mit einem Borstenpinsel einzureiben.

47. Tinct. aconiti 1·0,
Bals. peruvian. 4·0,
Spirit. vin. gallic. 200·0.
S. Mit einem Pinsel aufzutragen.

Gleichzeitig Gebrauch von Pomaden:

48. Chinin. tannic. 2·0,
Ung. emoll. 100·0,
Ol. Rosar. gtts. 5.
S. Pomade.

49. Acid. salicyl. 2·0,
Tinct. benz. 3·0,
Ol. ped. tauri 100·0

reichlich in die Kopfhaut einzureiben.

50. Liantral. 5·0—10·0,
Sapon. virid. 5·0,
Adipis 45·0.

Ehrmann empfiehlt Faradisation der Kopfhaut, — Hallopeau die Behandlung mit Wintergreenöl und Aether zu gleichen Theilen. Reinigung der kahlen Stellen mit Benzin, hierauf Einreibung derselben mit 50%iger Trikresol-Lösung. Das zweitemal weniger stark einreiben. — Vgl. auch Defluvium capillorum.

Amaurose und Amblyopie.

Ermittelung der ursächlichen Momente, bei Malaria Chinin, in jedem Falle

51 Strychnin. nitr. 0·01,
Aq. destill. 10·0.
S. ¼—½ Spritze subcutan zu injiciren.

Amenorrhoe, Fehlen der Menstruation.

Ermittelung d. Ursache (Chlorose, Scrophulose, Tuberculose, Anämie) und eventuell Behandlung derselben; Regelung der Diät und des Stuhlganges; in einzeln. Fällen Luftveränderung. Moorbäd. (Mattoni's Moor-Extr.) Darkauer Jodsalz. Elektricität. Massage. Allenfalls Untersuchung wegen Gravidität und Retentio mensium (Haematometra) etc.

52. Extr. Aloës 1·0,
Pulv. Myrrhae q. s. u. f. pill. Nr. 50.
S. 3mal tägl. 2—3 Stück.

53. Pil. aloëtic-ferrat. Nr. XXV.
S. 2—4mal tägl. 2 Pillen.

54. Acid. arsenicos. 0·04,
Piper nigr.
Ungt. glycerini q. s.
ut f. pil. Nr. XL Consp.
S. 3mal tägl. 1 Pille nach den Mahlzeiten.

Amygdalitis vide: Angina.

Anaemia cerebri, Gehirnanämie.

Vornehmlich die ursächlichen Momente zu berücksichtig. (langdauernde Blutungen, allzulanges Stillen, habituelle Diarrhoen etc.). Im acuten Anfall (Ohnmacht) horizontale Lagerung, Lüftung der Kleidungsstücke, Bespritzen mit kaltem Wasser, Riechmittel (Liquor ammon. caust.), Vermeidung jener Verhältnisse, die Ohnmacht hervorrufen etc. Passende Ernährung, besonders bei Kinder nach Durchfällen, Erwärmu In sehr schweren Fällen Ae subcutan, künstliche Ath u. subcutane Kochsalzinfu

Anaemia perniciosa progressiva.

Aetiologisch d. Ausschliessung von Anchylostoma duodenale wichtig. Symptomatisch grosse Dosen Arsen, Eisen.

55. Solut. Fowler. 3 0,
Liq. ferr. albumin. Drees.
S. 3mal tägl. 10 Tropfen.

56. Arsenici alb. 0·5.
Piper. nigr. 6 0,
Pulo. et ext. Liquir. q. s.
u. f. pill. Nr. 100.
S. Tgl. 1 Pille, jeden 3. Tag um eine Pille steigen bis 10 pro die und zurück.

Eisenpräparate s. 313—320 Ausserdem Aufenthalt in frischer Luft, schwere Weine.

Anaemie vide: Chlorosis.

Anchylostoma duodenale.

Schwer abzutreiben. Empfohlen werden:

57. Santonin.
Hydrarg. chlor. aa. 0·3.
M. f. p. d. tal. dos. = 3.
S. Tagl. 1 Pulver.

58. Extr. Filic. 0·5.
D. tal. dos. ad caps. gel. = 30
S. Binnen 2 Tagen zu nehmen
Vorsicht! Bei Vergiftungserscheinungen Reizmittel.

59. Thymol. 2·0.
D. tal. dos. = 3 ad caps. am
S. An einem Tage zu verbrauchen.

Aneurysma.

Allgemeinbehandlung, bestehend in absoluter Ruhe, knapper Diät und Herabsetzung d. Energie der Herzthätigkeit (Digitalis *und Jodkali*, letzteres 1—2 Grm. *dreimal täglich*). Bei constatirter *Syphilis energische* antiluetische *Behandlung. Localbehandlung* *entweder chirurg* od. durch Com*pression und elast.* Einwickelung Ueber die Wirkungen der Gelatineinjectionen bei Aortenaneurysma sind die Erfahrungen noch gering.

60. Kalii jodat. 1·5.
Tinct. digital. gtt. XV,
Aqu. dest. 150 0.
S. Tagsüber zu nehmen.

Angina diphtheritica (croupos a), vide: Diphtheria pharyngis et laryngis.

Angina pectoris vide: Stenocardia.

Angina tonsillaris (catarrhalis).

Bei d. einfachen Angina kalte oder Dunstumschläge um den Hals, ferner ein einfach. Gurgelwasser. In intensiven Fällen Eispillen od. Gefrornes, b. Kind im Bettruhe. Bei Abscessbildung Dunstumschläge, Gurgelungen m. warm. Thee (Decoct. Althaeae od. Malvae), eventuell Incision. Bei Hypertrophie der Tonsillen Gurgel. m. Essigw. u. Citronenaft, Bepinselung mit Jodtinctur; bei öfterer Recidive d. Angina: Tonsillotomie, eventuell Ignipunctur.

61. Kal. chlorici 5·0,
Aq. dest. 300·0,
Aq. menth. pip. gutt. duas.
S. Gurgelwasser.

62. Acid. carbol. 0·5.
Aq. destillat. 10·0.
S. Zu intrapurenen Inject. in das Tonsillargewebe.

63. Kal. hypermang. 1·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Mundwasser (Vor dem Gebrauche entsprechend zu verdünnen.)

64. Alum. crud. p. 5·0,
Aq. dest. 200·0,
Tinct. Lund. simpl. 10,
Mellis ros. 20·0.
S. Mundwasser.

Nach abgelaufener acuter Entzündung zur Verkleinerung der Drüsen 2—4malige Aetzungen mit

65. Acid. trichloracet. 0·3,
Jod. pur. 0·15.
Kal. jodat. 0·2,
Glycerin. 30·0.
S. Zum Bepinseln.

66. Acid. tannic. 0·5.
Spirit. vin. dilut.,
Glycerin. aa. 10·0,
Aq. font. 200·0.
S. Zum Gurgeln.

Anglom. Teleangiektasie, Gefässgeschwulst.

Exstirpation mit Messer und darauffolgende Naht, Galvanokaustik, Acupunctur, elastische Ligatur, Aetzungen m. Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure. Bei Tumor cavernosus empfiehlt v. Mosetig Injectionen von Wasserstoffhyperoxyd.

67. Hydrogen. hyperoxydat. 10·0.
S. Einige Tropfen zu injic.

Bei flachen Geschwülsten:

68. Empl. adhaesiv. 10·0,
Tart. emetic. 1·0.
S. Auf Leder zu streichen und 8 Tage liegen zu lassen.

Anorexie vide: Cat. ventriculi.

Anthrax.

Eröffnung des Anthrax durch ausgiebige, sich kreuzende Incisionen mit d. Messer, Thermocauter. Irrigation mit starken Antiseptica. Ausfüllung d. Wundspalten mit Jodoformdochten, Jodoformgazestreifen. Antisept. Verband, Umschläge m. Burow'scher Lösung, später Lapissalbe.

69. Arg. nitr. 1·0.
Bals. peruv. 5·0.
Ungt. simpl. 100·0.
S. Salbe.

Aphthae. Stomatitis aphthosa.

Sorgfält. Reinigung d. Mundes, wobei jede mechanische Beleidigung d. Schleimhaut (Quetschen, Reiben) zu vermeiden. So lange die Geschwüre klein sind, ist das Touchiren mit dem Lapisstift am zweckmässigsten, b. grösserer Ausdehnung sehr häufige Anwendung eines Mundwassers, am besten mit dem Irrigateur.

70. Boracis venet. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Mundwasser.

71. Kal. chlorici 2·0,
Aq. dest. 200·0,
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. Mundwasser. (Auch innerlich, bes. bei Kindern 2stündl. ein Theelöffel. Vorsicht!)

72. Kal. hypermangan. 0·1.
Aq. dest. 15·0.
S. Zum Bepinseln.

73. Tinct. Ratanh.
Tinct. gallar. aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln.

74. Acid. gallic. 5·0,
Glycerin. 20·0.
S. Zum Bepinseln.

75. Nitr. argent. 2·0,
Aq. dest. 10·0.
S. Zum Bepinseln.

Apoplexia, Haemorrhagia cerebri, Schlagfluss.

Entfernung der beengenden Kleider, frische Luft; bei Erwachsenen und Kräftigen Blutentziehung, welche bei blassem, collabirtem Aussehen, schwachem kleinem Pulse, b. alten, schwächlichen Person., bei Herzklappenerkrankungen, passiver Hyperämie, Lungenerweiterung und starker A

sklerose contraindicirt ist. Hochlagerung des Kopfes, Lagerung auf die gelähmte Seite, Eisumschläge auf den Kopf, starke Abführmittel, Clysmata, eventuell Kathet., Riechmittel (Ammoniak), Reiben und Bürsten der Haut. Später Ruhe, Verdunkelung des Zimmers; weitere Behandlung symptomatisch. Salinische Abführmittel stehen im Vordergrunde der Behandlung. Bei sehr schwacher Herzthätigkeit Wein, schwarzen Kaffee, ferner:

76. Aether. sulf. 20·0,
Camphor. ras. q. solv.
S. 1—2—3 Spritzen subcutan zu injiciren.

77. Moschi 0·5,
Rad. Valerian. 15·0,
Amyli 2·0.
S. Zum Klystier.

78. Inf. Sennae (od. Rad. rhei), e 15·0 ad 200·0,
Sal. amar.,
Syr. rub. Id. aa. 20·0.
S. 2ständl. 2 Esslöffel zu nehmen.

Zur Verhütung von Decubitus und Lungenhypostasen wiederholter Lagerungswechsel. — Gegen Lähmungserscheinung. nach Ablauf einiger Wochen Faradisation, Massage der gelähmten Extremitäten. Jodkali innerlich. Bei absteigender Degeneration vorsichtige Anwendung des absteigenden galvanischen Stromes entlang der Wirbelsäule. Später Bäder: Teplitz, Wildbad-Gastein, Ragaz, Pfäffers.

79. Kal. jodat 2·0—4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 3mal täglich 1 Esslöffel voll zu nehmen.

In veralteten Fällen:

80. Strychnin nitr. 0·005,
Aq. dest. 10·0.
S. Täglich 1 Spritze.

Arteriosklerosis.

Prophylakt. mässige Le
weise, regelmässige Bewe
im Freien, Bekämpfung des
ansatzes. Sorge für richtigen
durch Abführmittel oder K
bader Wässer, Anregung
Diurese (Milchcur). Bei Cor
sationsstörungen des Her
Herztonica, Aether, Valer
Strophantus, Digitalis (s. Vi
cordis).

81. Kal. jodat. 10·0,
Aq. font. 180·0.
Succ. liquirit. 20·0.
S. Täglich 1 Esslöffel.

Man berücksichtige bei
Behandlung die verschied
ätiologischen Factoren: S
Lues, Tabes, Morbus Bri
Diabetes, Bleivergiftung (s. d

Arthritis vide: Rheuma
mus articulorum.

Arthritis urica, Poda

Gicht, vide: Diath
urica.

Ascaris lumbricoides,

Spulwurm.

Vorerst ein einfaches Pu
(Calomel, Rheum). Erst,
dies nicht ausreicht, verc
man Zittwersamen. Auch Kly
mit $^1/_2$—1% Carbolsaurelo

82. Trochisc. Santonin. N
S. Tägl. 3 Stück z. neh

83. Santonini pur. 0·05—
Pulv. Calomelan. 0·2(
Succh. alb. aa. 2·0,
M. f. p. div. in dos. =
S. Täglich 3 Pu

84. Santonini pur. 0
Succh lactis 1·0
M. f. p. div. in
S. 2ständlich 1

85. *Santonini 0·20,*
Ol. Ricini 7·0.
S. 2stdl. (bei Kind.) 1 Kaffeel., bis mehrere Stühle erfolgen (Henoch).

86. *Infus. fl. Cinae e*
10·0—20·0 : 100·0.
S. Zum Klystier.

Ascites, Bauchwassersucht.

Behandlung des ursächlichen Leidens: Leber-, Herz- oder Nierenleidens etc., ferner Verordnung harn- od. schweisstreibender Mittel, event. drastische Abführmittel, Beförderung der Salivation. Diaphorese durch heisse Einpackungen oder durch ein heisses Bad (circa 40°) mit darauffolgender Einpackung, oder durch die neuestens wieder empfohlenen heissen Sandbäder; Vorsicht bei Herzschwäche. Mässige roborirende Nahrung. Giesshübler, Salvator. Milchcur. Bei drohender Gefahr Punctio abdom., ev. Laparotomie. Zur Entleerung hydropischer Ansammlungen an den Extremitäten oder im Scrotum der Southey'sche Capillartroicar empfohlen.

Zur Diurese:

87. *Dect. r. Ononidis spin. e*
10·0 ad 150·0.
Liqu. kal. acet.
Oxymel. Scillae aa. 10·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

88. *Rad. Levistic.*
Bacc. Juniper.
Rad. Ononid. spin. aa. 50·0.
Rad. Liq. 30·0.
M. S. Zum Thee.

89. *Pulv. bulb. scillae,*
Pulv. fol. digital. aa. 2·0,
Extr. Gentian. 1·2,
Ol. Juniperi 0·4.
M. f. p. Gummi arab. q. s. Pil. Nr. XXX. Consp. Lycopod.
S. 3—4stdl. 1 Pille.

90. *Pulv. fol. digital. 1·00,*
Calomel. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3stündl. 1 Pulver.

91. *Diuretin. Knoll 5·0—7·0.*
Aq. dest. 100·0.
S. Tagsüber esslöffelweise zu verbrauchen.

92. *Calomel. 0·1,*
Sacch. alb. 0·50,
M. f. p. dent. tal. dos. = 10.
S. 4 P. täglich. (Vorsicht bei Nierenkrank., Mundpflege!)

93. *Coffein. citr. 1·0,*
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Jede 2. Stunde 1 Pulver.

94. *Liq. Kal. acet.*
Syrup. simpl. aa. 30·0,
Aq. foenicul. 150·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel voll.

95. *Ureae pur. 10·0—20·0,*
Aq. dest. 200·0.
S. 1—2stündl. 1 Esslöffel voll zu nehmen. (Klemperer.)

96. *Strontii lact. 20·0,*
Aq. dest. 150·0.
S. 3—4 Esslöffel voll tägl.

Zur Diaphorese:

97. *Infus foliar. Jaborandi e*
5·0 : 150·0,
Liq. Kal. acet. 4·0,
Syr. acetos. citr. 40·0.
S. In einer Stunde zu nehm.

98. *Pilocarpin. hydrocht. 0·2,*
Aq. dest. 10·0.
S. 1/2—1 Spritze zu injiciren. (Macht leicht Collaps; bei Herzschwäche contraindic.)

99. *Natr. salicyl. 5·0 in dos.*
S. Stündl. 1 Pulv. [= 10.
Warme Einpackungen.

Asphyxie.

Entfernung eines eventuellen fremden Körpers aus den Luftwegen. Zufuhr von frischer Luft, erhöhte Lagerung des Kopfes. Beseitigung der die Respiration hindernden Kleidungsstücke.

dann Anwendung v. Hautre zen. Beim Scheintod d. Neugebornen: Entfernung des Schleims aus der Mundhöhle, künstl. Respiration, Hautreize. Katheterisation der Luftwege.

Asthma bronchiale, Krampf der Bronchien.

Forschung nach einem ursächlichen Leiden (Nase, Rachen). Behufs Unterdrückung der Anfälle: Meidung grellen Temperaturwechsels, reizender Speisen und Getränke, ferner etwaiger, erfahrungsgemäss den Anfall hervorrufender Gerüche; Luft- od. Klimaänderung zuweilen von Nutzen, besonders der Aufenthalt an der See, nicht aber der in Höhenlagen. Pneumatische Behandlung, Anwendung von verdünnter und verdichteter Luft, Bewegung im Freien. Während des Anfalles Sorge für frische Luft, Entfernung beengender Kleider, Sinapismen auf Brust und Waden, starker heisser Kaffee oder Thee, heisse Hand- und Fussbäder, Narcotica, besonders Morphium (subcutan) und Chloralhydrat, Asthmacigaretten. Inhalationen von Chloroform oder Aeth. sulf. Einathmen d. Dämpfe von verbrannter Charta nitrata oder von in Strammoniumtinctur getauchtem Salpeterpapier.

100. Codeïn. pur. 0·15,
Sacch. lact. 2·0.
M. f. p. dio. in dos. = 5.
S. Beim Anfalle 1 Pulver.

101. Heroin. 0·005—0·01—0·02,
D. tal. dos. Nr. VI.
DS. 1—3 Pulv. z. n.

Ebenso Dionin.

102. Extr. Belladonn. 0·50,
Pulv. r. Ipecac. 3·0,
Extr. Taraxac. q. s.,
u. f. pill. Nr. 20.
S. Täglich 5 Pillen.

103. Aetheris sulf. 2·0,
Extr. Belladonn. 0·05.
Aq. Laurocer. 5·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

104. Chloral. hydrat. 3·0,
Syr. simpl. 30·0.
S. Auf 1mal zu nehmen.

105. Nitroglycerin. 0·01,
Pulv. et extr liquir.
q. s. ut f. pil. Nr. XX.
DS. Täglich 1 Pille, dann nach je einer Woche steigen bis auf 3—5 Pillen und ebenso langsam abnehmen.

106. Nitroglycerin 0·5,
Aq. dest. 50·0,
S. 3mal tägl. 1—6 Tropfen vorsicht. bis 10 Tropf. steigen.

Inhal. v. je 4–5 Grm. Aq. Lauroc. mittelst Sprayapparat. Ferner:

107. Cocaïn. mur 1·0,
Aq. dest. 20·0.
S. Zur Einpinselung der Nasenschleimhaut.

108. Amylaether. nitr. 5·0.
Olei Foeniculi 10·0.
S. Im Anfalle 2—5 Tropf. auf ein Taschentuch zu inhaliren (Amylnitrit).

109. Pyridin. 10·0.
S. 10—15 Tropfen auf ein Taschentuch zu giessen und dieses vor Nase und Mund zu halten. (G. Sée.)

110. Antispasmin 1·0,
Aq. amygd. am. 10·0.
S. 2—3mal tägl. 15 Tropfen.

111. Natr. chlorat.
Natr. carb. aa. 1·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zur Inhalation.

112. Natr. jodat. 5·0,
Aq. dest. 150·0,
Syr cort. aur. 15·0.
S. 3 Esslöffel täglich.

113. Jodipin. 4·0.
Aq. dest. 40·0,
Aq. menth. piper 60·0.
f. emulsio.
DS. 3 Esslöffel täglich.

114. Sol. arsen. Fowl. 5·0,
Aq. dest. 10·0.
S. 3mal täglich 10 Tropfen u. steigend. Nach d. Mahlzeit

115. Tinct. Lobeliae.
Arth. acet. aa. 5·0.
S. Jede ½ Stunde 10—20 Tropfen.

116. Extr. Quebracho 5·0.
S. 3mal täglich 1—2 Theelöffel.

Ebenso: *Tinct. Quebracho.*

Bei Kindern:

117. Kalii jodat.
Chlorat. hydrat. aa. 3·0,
Aq. dest. ad 100·0.
S. 1-3 Kinderlöff. voll (je n. dem Alter d. Kindes) 2-3 m. tgl.

v. Noorden empfiehlt folgende Atropincur: Man beginnt mit der täglichen Dosis von ½ Mgrm. (innerlich), steigt jeden 2.—3. Tag um ½ Mgrm. bis zu 4 Mgrm. pro die, dann allmälige Verminderung der Dosis. Dauer der ganzen Cur 4 bis 6 Wochen. Nach halbjähriger Pause Atropincuren mit kürzerer Dauer und kleineren Dosen. In verzweifelten Fällen Morphin.

Asthma cardiale.

Bei erhöhtem Gefässdruck Entlastung des Herzens, allmälige Restriction der Getränkemenge, methodische Muskelübung, salinische Abführmittel, eventuell Diuretica (s. Ascites). Behandl. eines etwaigen Vitium cordis.

S. auch A. bronchiale.

Atelectasia pulmonum, Verdichtung der Lungen.

Bei Neugebornen tiefe Exspirationen hervorzurufen (Schreien); Reinigung des Mundes von Schleim; bei Kindern mit Bronchitis capillaris Entfernung des Schleims durch Brechmittel. Rum, Cognac, Thee. Bei Compressionsatelectase Behandl. der Grundkrankh. (pleurit. Exsudate).

118. Tartar. stib. 0·10,
Mixt. gummos. 30·0.
S. ¼stündl. 1 Kinderlöffel (bis Erbrechen erfolgt).

119. Inf. rad. Ipecac. e 0·50 ad 100·0.
Syr. rub. Idaei 15·0.
S. ½stündl. 1 Kinderlöffel.

120. Liq. ammon. anis. 20·0.
S. 2—5 Tropfen i. Wasser

121. Vin. stibiati,
Oxym. Scillae aa. 15·0.
S. Alle 10 Min. 1 Kinderlöffel (bis Erbrechen erfolgt).

122. Aetheris sulf. 10·0.
S. 1—2 Tropf. in Wasser.

123. Camphorae ras. 0·10.
Linct. gummos. 50·0.
S. Kaffeelöffelweise.

Balanitis, Eicheltripper.

Reinigung mit lauem Wasser, sodann mit Medicamenten, z. B. Kal. hypermang. in Lösung. Sorgfältige Isolirung der Eichel von der Vorhaut durch Einlagen von trockener Baumw. od. Leinwand. Geschwüre u. and. Verletzungen erheischen specielle Behandlung.

124. Kal. chlorici 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.

Einstreuung von:

125. Acid. salicyl. 0·5,
Talc. venet. 5·0.
S. Streupulver.

oder:

126. Tannin. pur.,
Amyl. pur. aa. 10·0.
S. Streupulver.

Vide: Ulcus, Sklerosis. Phimosis.

Blasenkatarrh vide: Cystitis.

Blasenlähmung.

In leichten Fällen Massage der Blasengegend, Aufforderung zu regelmässiger 1—2stündlicher Harnentleerung, hydropathische Abreibungen, kalte Sitzbäder, Perinealdouche, Elektrotherapie. Getränk: Franzensbader Nataliequelle. Innerlich:

127. Strychnin. nitr. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. ½—1 Spritze in die Blasengegend zu injiciren.

In schweren Fällen method. Katheterismus mit nachfolg. Blasenausspülung mit Borsäure (3—4%) oder Carbolsäure (¼—½%).

Vide: Cystitis.

Blennorrhoea conjunctivae

vide: Conjunctivitis.

Blennorrhoea neonatorum,

Augenblennorrhoe der Neugebornen.

Höchste Ansteckungsgefahr f. das zweite Auge und für die Augen der Umgebung; sehr sorgfaltige und sehr häufige Reinigung des Auges mittelst Lösung von hypermangansaurem Kali; Meidung hoher Zimmertemperaturen, von Staub, Rauch etc., Abblendung des Lichtes; Touchir. mit Lapislösung. Auch Belladonnasalbe auf Stirn und Schläfe. Prophylact.: Auswaschung d. Augen v. Neugebornen m. 1—2%iger Carbolsäure od. Lysol unmittelbar nach dem Bade und Einträufelung eines Tropfens einer 2%igen Lapislös. empfohl.

128. Argent. nitr. cryst. 0·5—1·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Zu Handen des Arztes (1—2%ige Lösung; tägl. 1- bis 2mal zu bepinseln).

129. Argent. nitr. cryst.
Aq. dest. 50·0. [0·10—0·30,
S. Zum Bepinseln (2—6%).

Bei Abnahme der Secretion die schwächere Lösung.

130. Argentamin 1·0,
Aq. 20·0.
S. 2mal täglich einträufeln oder einpinseln.

131. Kal. hypermang. 0·10,
Aq. dest. 100·0.
S. Waschwasser (mit Wasser zu verdünnen bis zu rosarother Färbung).

Bei Erscheinungen seitens der Cornea mit Vorsicht Atropin:

132. Atropini sulfur. 0·02,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

133. Atropini sulf. 0·05,
Vaselini 5·0.
M. exactissime.
S. Ein erbsengr. Stück in den Conjunctivalsack.

Blennorrhoea urethrae,

Tripper der Harnröhre.

Prophylact. wird empfohlen, möglichst bald, bis etwa ¼ Stunde nach dem Coitus, 2—3 Tropfen einer 2% Argent. nitric.-Lösung nach vorausgegangenem Uriniren mittelst Tropfglases in die Fossa navicularis einzuträufeln.

Bei acuten Formen m. reichlicher Pyorrhoe, Entzündung u. ödematöser Schwellung in der Umgebung der Harnröhrenmündung, nebst Schmerzhaftigkeit im Verlauf der Harnröhre: kalte Umschl., Brom, möglichste Ruhe; später Injectionen; strenge Diät: kein Bier oder Wein, keine reizenden Speisen; leichte Abführmittel; Suspensorium, wenig Bewegung. Auf die Gefahr des Secrets für die Augen aufmerksam zu machen. Nach Abnahme der Entzündungserscheinungen und bei reichlichem Ausflusse vorsichtig mit Einspritzunge

zu beginnen. Patient soll vorher uriniren, hierauf 2—4mal hintereinander je $^1/_2$ Spritze (etwa zehn Gramm d. lauwarmen Flüssigkeit enthaltend) injiciren und gleich wieder ausfliessen lassen. Diese Einspritzungen sind je nach der Intensität d. Secretion 3—6mal tägl. vorzunehmen. In der 2. u. 3. Woche kann eine volle Spritze injicirt werden, deren Inhalt durch Zudrücken d. Orificium 1—2 Min. in der Harnröhre belassen wird. Statt der Injectionen und neben denselben auch innerliche Mittel gegen den Tripper gebräuchlich. S. später.

134. Zinc. sulfur. 0·25—1·0,
Aq. dest. 100·0
S. Einspritzung.

135. Zinci sulfocarb. 0·20,
Aq. dest. 100·0.
S. Einspritzung.

136. Zinc. sozojodol. 1·0—2·5,
Tinct. op. simpl. 5·0,
Aq. dest. ad 200·0.
S. zur Einspritzung.

137. Kal. hypermg. 0·05,
Aq. dest. 100·0.
S. Einspritzung.

138. Acid. boric. 5·0,
Aq. dest. 150·0.
S. Aeusserlich.

139. Acid. tannic. 1·0.
Aq dest. ad 200·0.
S. Morgens und Abends einzuspritzen.

140. Creolin. (od. Lysol) 0·10.
Aq. dest. 150·0.
S. Einspritzung.

141. Ichthyol. p. 1·0—5·0,
Aq. dest. 100·0.
S Injection. Mit d. schwächsten Lösung zu beginnen. Täglich anfangs 3 bis 5, später weniger Einspritzungen.

142. Resorcini pur. (od. Antiseptin) 2·0,
Aq. dest. 150·0.
S. Einspritzung.

143. Airol 2·0
Aq. dest. 5·0,
Glycerin. 15·0.
S. Zur Injection.

144. Saloli 10·0,
Gummi arab. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Einspritzung.

145. Alumnol. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. In den ersten Tagen 3—4mal, dann 1mal täglich zu injiciren.

146. Argonin 1·5—2·0,
Aq. dest. 100·0,
D. ad vitr. nigr.
S. Zu Einspritzungen.

147. Argentamin 0·05—0·4.
Aq. dest. 100·0.
S. Wie d. Vorige.

148. Solutio Itroli (Argent. citric.) 0·025 : 200·0,
D. in vitr. flavo.
S. 4mal tägl. in die Harnröhre zu injiciren. (Credé.)

149. Protargoli 0·5—1·0—2·0,
Glycerini 0·5—1·0,
Solution. Natrii chlorat. (0·6%) 200·0
Dtr. ad vitr. nigr.
S. 3mal täglich zu injic. und in der Harnröhre 5 bis 30 Minuten zurückzuhalten.
(Mit den schwacheren Lösungen beginnen.)

150. Largin 0·5—3·0,
solve in:
Aq. dest. 200·0,
D. ad vitr. flav.
S. Nach Bericht 3mal tägl. zu injiciren.

Innerl. Mittel gegen den Tripper:

151. Herb. Herniar.,
Fol. uvae ursi aa. 15·0.
S. 1 Kaffeelöffel voll als Thee aufzugiessen.

152. Decoct. semin. lini 500·0
Syr. diacodii 10·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

153. Bals. Copaiv. 30·0.
S. Fr., Mitt. u. Ab. je

154 Bals. Copaiv. ytts. 10.
Exhibe in caps. gelatinos.
Dentur tales dos. Nr. 50.
S. Pr., M. u. Ab. 2—3 Kaps.

155. Balsami Copaiv. 5·0,
Cerae flav. ras. 2·0,
Pulv. Cubebarum q. s.
u. f. pil. Nr. 50.
S. 5—10 Stück täglich.

156. Ol. lign. Santali 25·0.
S. 20—30 Tropf. des Tags.

157. Extr. Pichi-Pichi fluid. 50·0.
S. 3mal tägl. 1 Theel. v. z. n

158. Ol. Santal. flav. Ostind., Salol. aa. 2·0.
Magnes. et Cerae alb. qu. s. ut f. pil. Nr. XXX.

Bei chronischem Tripper:

159. Zinci sulfur.,
Ac. carbol.,
Alumin. cr. aa. 0·2,
Aq. dest. 100·0.

160. Arg. nitr. 0·05,
Aq. dest. 100·0.

161. Cupr. sulf. 0·1—0·5,
Aq. dest. 100·0.

162. Bismuth. subnitr. 1·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Einspritzung.

163. Zinci sulfur.,
Acet. Litharyyr. aa. 0·50.
Aq. dest. 100·0.
S. Aeusserlich.

164. Merc. praec. rubr. 0·5,
Vaselini 10·0.
S. Salbe (z. Befettung von in d. Harnröhre einzuführ. Bougies).

165. Arg. nitrici 0·2,
Glycerini,
Butyr. Cacao aa. q. s.,
u. f. bacill. long. Cm. 5 crass. Mm. 3 Nr. 10.
S. Abends 1 Stück in die Harnröhre zu legen.

166. Alum. crud. 1·0,
Lanolin,
Butyr. Cacao aa. q. s.,
F. suppos. urethr. Nr. 5.
S. Wie das Vorige.

Statt Alaun Tannin 0·30 bis 0·50 oder Sulf. zinci 0·15—0·30.

167. Tannini pur. 5·0,
Opii in pulv. 0·30,
Glycerini pur. q. s.
u. f. bacill. Nr. 10.
S. Befettet in die Harnröhre einzuführen. (Tannoglycerinstäbchen, etwa 5—10 Cm. lang u. 4—5 Mm. i. Dchm.)

168. Tannini pur. 0·10,
Gelatini q. s.
u. f. bacill. urethrales.
Dentur tales doses Nr. 10.
S. Tägl. 2m. in d. Harnr. einzuf. (Gelatinstäbchen. Ebenso kann auch Plumb. ac., Zincum sulf. etc. verordnet werden.)

169. Ol. Cacao 100·0,
Cerae flav. 2—5·0,
Argent. nitr. 1·0,
Bals. Peruv. 2·0.
S. Salbe (erwärmt z. Eintauchen v. Metallsonden o. can. Sonden).

Bei Ermittelung d. erkrankten Partie der Harnröhre mit Hilfe d. Endoskops Bepinselungen mit Lapis- oder Jod-Tinctur:

170. Arg. nitr. cryst. 1·0,
Aquae destill. 20·0.
S. Zum Bepinseln.

In hartnäckigen Fällen Ultzmann's Sondencur mittelst konischer schwerer Metallsonden, welche in steigender Nr. (22—27 Charrière) tägl. bis in die Pars prost. eingef. werden. Sonden nicht m. Oel, sond. m. Glycerin befetten!

Ferner medicamentöse Localbehandlung:

Irrigation der vorderen Harnröhre m. adstringirenden Lösungen, welche durch einen weichen, bis in den Bulbus urethrae des stehenden Pat. eingeschobenen Katheter applicirt werden.

171. Zinci sulf.,
Alum. crud.,
Acid. carbol. aa. 1·0—2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.

Medicamente können
ter Form mittelst des
parates ange-
en: die gerade, endo-
öhre wird sammt d.
em horizontal liegen-
s in den Bulbus ein-
auf d. Obturator ent-
it dem Medicamente
Pinsel durch d. Röhre
sammt dieser rotirt.
itr. cryst. 1·0,
t. 30·0—20·0,
vitr. nigr.
Bepinseln.
ndl. schmerzh. Erect.
Chorda Vgl. auch
rie und Cystitis.

oea vaginae vide:

albus.

enitis, Lidrand-

ntzündung.

e Entfernung der vor-
ten und erweichten
Krusten, Reinigung
it lauwarmem Wasser
Allabendliche An
r verordneten Salbe
ere Zeit; bei habi-
en reizlose Diät, sol-
el, Eisen innerlich etc
prucc. alb.
Zinc. aa. 0·15,
i 5·0.
e (erbsengross vor
afengehen am Lid-
reiben).
rici 0·25,
. 5·0.
e.
rgol. 3·0,
rydat.
ia 1·0,
. 20·0.
e.
würsbildung Touchi-
is in Substanz; bei
Bepinselung mit
; ferner:
176. Ung. Diach. Hebr. 10·0.
S. Salbe (auf Leinwandstreif. messerrückendick gestrichen, aufzulegen).

Blepharospasmus,

Lidkrampf.

Behandlung des Grundleidens. Elektro- u. Hydrotherapie subcutane Myotomie des M. orbicularis empfohl. Augenschirm Schutzglas.
177. Cocain. mur. 0·06—0·3,
Vaselin. 30·0.
S. Lidsalbe.
178. Atropin. sulf. 0·02.
Ext. et pulv. Gentian.
q. s. f. pill. Nr. 30.
S. 3—6 Pillen tägl. z. n.

Bronchiektasie.

Behandl. des Bronchialcatarrhs (v. Bronchitis cat.), Balsamica int. und Inhalationen.
179. Ol. Terebinth.,
Gumm. Res. umm. aa. 5·0,
P. et extr. r. Acor. aa. q. s. u. f. pil. Nr. 50.
S. Früh, Mittags u. Abends je 5 Pillen.
180. Bals. Peruvian. 20·0.
Ol. Terebinth. 2·0.
S. Früh, Mittags u. Abends je 10 Tropfen.
Inhalationen v. Latschenkieferöl oder Acid. carb.
Bei fötidem Auswurf:
181. Myrtol. 0·3.
Da tal. dos. in caps. gelatin. Nr. 30.
S. Tägl. 3—5 Kapseln.

Bronchitis catarrhalis.

In acuten Fällen mit Fieber Bettruhe. Zimmertemper. gleichmässig ziemlich hoch zu halten (18°). Die Luft im Zimmer durch Erzeugung von Wasserdämpfen feucht zu erhalten. Feuchtwarme Umschläge auf die Brust (Kreuzbinden). Sorge für Stuhl. Subnovator, Giesshübler u. dgl.

Anfangsstadium Coupirung der Krankheit durch energische Diaphorese zu versuchen. Bei ausgebildeter Krankh. Expectorantia und Narcotica, bei sehr reichlicher Expectoration Adstringentia und Balsamica. Bei capillärer Bronchitis lauwarme Bäder mit kühlen Uebergiessungen. Bei chronischer Bronchitis Berücksichtigung der Aetiologie (Vitium, Nephritis), Beseitigung schädl. Momente (Staub, Rauch etc.). Im Sommer Aufenthalt in waldreicher Gebirgsgegend, in Salinen, im Winter in wärmerem Klima. Brunnencuren. Hydriatische Behandlung.

Expectorantia:

182. *Inf. rad. Ipecacuanh. e 0·50 ad 150·0,*
Tinct. Laud. simpl. gtts. 15,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. J. 2. Std. 1 Esslöffel voll.

183. *Infus. r. Alth. 150·0,*
Ammon. chlorat. 1·0,
Syrup. seneg. 15·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel voll.

184. *Dect. rad. Polyg. Sen. e 20·0 ad 200·0,*
Syr. Althaeae 20·0,
Liq. ammon. anisat 3·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

185. *Spec. pectoral. 30·0.*
S. Thee (Fr. u. Ab. 1 Tasse).

186. *Ammon. chlorat. 5·0,*
Stib. sulf. aurant. 0·6,
Pulv. rad. Alth.
Pulv. rad. Liquirit. aa. 15·0.
S. 3mal täglich 1 Theelöffel voll in einer Tasse Thee.

187. *Stib. sulf. aurant. 0·1,*
Sacch. alb. 0·5,
M. f. p. dt. tal. dos. Nr X.
S. 3 Pulver täglich.

Narcotica:

188. *Morphi muriat. 0·05,*
Sacch. alb. 2·0,
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Alle 3 Stunden 1 Pulv.

189. *Morphi muriat. 0·10,*
Pulv. rad. Ipecac. 0·20,
Natr. bicarbon.,
Sacchari alb. aa. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 15.
S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

190. *Pulv. Dower. 1·0,*
Natr. bicarb. 2·0,
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

191. *Extr. hyosciami 0·2,*
Sacch. alb. 3·0.
In dos. = 10.
S. 2stündl. 1 Pulver.

192. *Extr. Belladonn. 0·5,*
Sulf. aurant. Antimon. 0·3,
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. X.
S. 3 Pulv. tägl. zu nehmen.

193. *Codeïn. p. 1·0,*
Pulv. et Extr. Liquir. aa. q. s. f. pill Nr. 30.
S. 2—3 P. täglich.

194. *Peronin. 0·3,*
Rad. et succ. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. XXX.
S. Abends 2—3 Pillen zu nehmen.

195. *Heroin. 0·005—0·01—0·02,*
D. tal. dos. Nr. VI
DS. 3 Pulv. tägl. zu nehm.

196. *Dionin. 0·3,*
Aq. dest. 20·0.
S. 2—3mal tägl. 15 Tropf. in Zuckerwasser.

Adstringentia, Balsamica u. dgl.

197. *Myrrhae 12·0.*
Balsam. peruv. 6·0,
Extr. opii 2·0,
M. f. pil. Nr. CL,
Consp. rhiz. Irid.
S. 2stündlich 2—4 Pillen.

198. *Extr. fluid hydrast. canad. 20·0.*
S. 4mal tägl. 20—30 Tr.

199. *Ol. Terebinth. 20·0.*
S. 4mal täglich 10 Tropfen in Milch.

200. Terpin 10·0.
Alkohol (85%) 150·0,
Aq. dest. 100·0.
S. 3mal täglich 1 Esslöffel voll z. Mahlzeit. (Wie d. Vor.)

Inhalationen:

Wasserdämpfe, Mineralwässer, Kochsalzlösung, ferner:

201. Aq. lauroceras. 5·0,
Aq. dest. ad 500·0.
S. Zur Inhalation.
202. Tr. opii simpl. 1·0.
Aq. dest. ad 500·0.
S. Wie das Vorige.
203. Ol. Pini 2·5,
Aq. dest. ad 500·0.
S. Wie das Vorige.

Bei hohem Fieber Antipyretica: Chinin, Antipyrin, Phenacetin, Antifebrin.

Bei Greisen neben Expectorantien Sorge für Regelung der Diät und Aufrechthaltung der Kräfte. Alte Weine.

Bei Kindern ist auch die Diät zu reguliren (Verminderung der Kost), f. gleichmäss. Luft, leichten Stuhlgang zu sorgen und feuchte Wärme auf die Brust anzuwenden.

204. Mixt. oleos. 100·0,
Syr. Ipecac. 10·0,
Aq. Lauroc. gtts. 15.
S. Jede 2. St. 1 Kaffeelöffel.
205. Decoct. Althaeae 100·0,
Syr. Ipecac. 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Kinderlöff.
206. Inf. rad. Ipecac. e 0·30 ad 100·0,
Syr. rub. Id. 10·0.
S. Jede 2. St. 1 Kinderlöffel.
207. Syr. Senegae 20·0,
Oxymellis simpl. 5·0.
S. Alle 2 St. 1 Theelöffel.
208. Inf. Polyg. Senegae e 5·0 ad 100·0,
Liq. Ammon. anis. gtts. 20.
S. Jede 2. St. 1 Kinderlöffel.
209. Apomorphin. mur. 0·01,
Aq. dest.,
Syr. Althaeae aa. 15·0.
S. Ständlich 20 Tropfen.
210. Pulv. Doweri 0·20.
Sacch. alb. 2·0,
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3mal täglich 1 Pulver.
211. Natr. chlorat. 9·0,
Coffein. citr. 1·0,
Aq. q. s ad 1000 Ccm.
S. 200–400 Ccm. in Mengen von je 40 Ccm. subcutan.

Bei fötider Bronchitis:

Inhalationen von Ol. Terebinth., Carbolsäure, Aq. Picis, Creosotdämpfen; innerlich Ol. Terebinth., Tinct. Eucalypt., Myrtol, Chinin, Acid. tannic.

212. Acid. carbol. 2·5,
Aq. dest. 500·0.
S. Zur Inhalation.
213. Eucalyptol
Spirit. vin. dilut. aa. 10·0
S. 10 Tropf. zum Inhaliren.
214. Menthol. 0·1,
Solve in Spirit. vin. Cognac 25·0,
Adde Tr. Rhei vinos 10·0.
MDS. 3mal tägl. 15 Tropf.

Bronchitis crouposa.

Inhalationen v. heissen Wasserdämpfen, Aq. calcis u. dgl.; Brechmittel zur Entfernung der fibrinös-schleimig. Massen. Biermer empfiehlt energische Quecksilberbehandl. In chron. Fällen Jodkalium (Wunderlich). Ausathmung in verdünnte Luft.

215. Atropin. sulfur. 0·01,
Extr. pulv. liquirit.
qu. s. ut f. pil. Nr. XX.
DS. 2–3 Stück täglich.
216. Kal. jodat. 4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 2ständl. 1 Esslöffel voll.
(Bis z. dopp. Dosis zu steigen.)

Bubo vide: Adenitis inguinalis.

Carbunculus vide: Pustula maligna.

Carcinoma mammae, Brustdrüsenkrebs.

Bei noch unverletzter Haut Jodsalbe oder Pflaster; rechtzeitige Operation; bei zerfallener Haut Sorge für Reinlichkeit. Anwendung desinficirend. Mittel; schmerzstillende oder kräftigende Mittel innerlich je nach Bedarf.

217. Kali hypermang. 1·0.
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.

218. Acid. carbol. 2·0.
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.

219. Ung. Plumb. ac. 20·0.
S. Salbe.

Kleine Knoten mittelst Paquelin zu beseitigen. Auf zerfallende Ulcerationen:

220 Bitumin. fag. 20 0.
Calcar. sulfur. 80 0.
DS. Aeusserlich.

Carcinoma uteri, Gebärmutterkrebs.

Partielle Excision, resp. Uterusexstirpation bei Beschränkung des Neugebildes auf den Uterus, sonst symptomatische Behandlung; Sorge für Reinhaltung und Desinfection, Erhaltung d. Kräfte durch roborirende Nahrung und Medicamente; Meidung von körperlichen u. geist. Anstrengung.; bei Blutungen: Bettruhe, Einspritzung, Tamponade, eventuell Cauterisation; bei Schlaflosigkeit u. Schmerzen Narcotica. Gegen Uebelkeit, Erbrech.: Eispillen, Sodawasser, Giesshübler, Salvator., Aq. Laurocerasi etc.

Als Aetzmittel Jodphenol empfohlen (1 Th. Jod auf 4 Thl. ölig gemachte Carbolsaure), selbst Watte auf den Cervix u. dessen Canal zu appliciren.

Carcinoma ventriculi.

Nach festgestellter Diagnose operative Entfernung der carcinomatös erkrankten Theile, falls die Erkrankung localisirt ist; im anderen Falle symptomatische Behandlung neben roborirender Diät; daher Mittel gegen Erbrechen (Eispillen, Giesshübler), gegen Magenblutungen, gegen Schmerzen; Sorge für Stuhlgang; Milch oder Fleischbrühen je in kleinen Mengen Leube-Rosenthal'sche Fleischsolut. Salzsäure nach d. Mahlzeit. (Vgl. Catarrhus u. Ulcus ventr.) Gegen die dyspeptisch. Erscheinungen Condurango. Rohes Fleisch, Rothwein, Buttermilch empfohlen. Gegen die grossen Beschwerden infolge Speiseretention bei Pylorusstenose Auswaschung des Magens.

Behufs künstlicher Ernährung per anum Klystiere mit Pepton; ferner Fleisch-Pankreasclystiere, bestehend aus 300 Gramm feingehacktem Fleisch u. 100 Gramm Bauchspeicheldrüse, welches Quantum nach vorausgeschicktem Reinigungsklystiere auf 2mal (12 Uhr Mittags, 6 Uhr Abends) zu verabreichen ist.

221. Cort. Condurango 15·0.
Mac. p. hor. XII. c. Aq. 360·0
Dein coq. cd reman. 180·0.
S. 2—3 Esslöffel tägl.

222. Decoct. Condurango e 15·0
Tct. rhei vin. 5·0, [ad 180·0.
Resorcin. 2·0.
Syr. cort. aur. 20·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

223. Vin. Condurango 30·0.
S. Theelöffelweise vor dem Essen.

Bei übelriechendem Aufstossen:

224. Aspirin. 1·0.
Natr. bicarb. 6·0.
S. Messerspitzweise nach dem Essen.

Gegen Erbrechen:

225. Extr. Belladonn. 0·50,
Aq. dest. 30·0.
S. 3mal täglich 15—20 Tropfen in Zuckerwasser.

Gegen Schmerzen:

226. Cocain. hydrochlor. 0·1,
Aq. amygd. amar. 10·0.
S. 10 Tropfen mehrm. tägl.

Gegen Flatulenz 5—10 Tropfen Liq. Ammon. anis. oder Oleum Cajeputi, 2—3mal täglich einige Tropfen. Bezügl. der symptomatischen Behandlung vgl. auch Cat. ventriculi.

Cardialgie, Magenkrampf.

Berücksichtigung des ursächlichen Momentes (bes. Magengeschwür, Anämie); jedenfalls Regelung d. Diät; Narcotica geg. die Schmerzen; Eisen b. Chlorotischen. Guberquelle. Bei Neurasthenikern kräftige Ernährung, kalte Abreibungen des Körpers, Galvanisation der Magengegend, eventuell Höhenklima, Seebäder. Nützen die innerl. Mittel nicht rasch genug oder bei intensivem Anfall subcut. Morph.-Injection.

227. Mag. Bismuth. 2—5·0,
Morph. muriat. 0·10,
Natr. bicarb.,
Sacch. alb. aa. 2·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

228. Extr. Belladonn. 0·2,
Liq. Ammon. anis. 2·0,
Aq. dest. 10·0.
S. 2stündl. 10—20 Tropfen.

229. Solutio ars. Fowleri 5·0,
Aq. dest. 15·0.
S. 2mal täglich 5 Tropfen, dann steigend bis auf 30 Tropf. im Tage.

230. Cocain. mur. 0·1,
Sacch. alb. 3·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3mal tägl. 1 Pulv.

231. Orthoform 0·5—1·0.
D. tal. dos. Nr. V.
DS. 1—2 Pulv. zu nehmen.

232. Tinct. Nuc. vom.,
Aq. Laurocer. aa. 5·0.
S. 2mal tägl. 10—15 Tropf.

233. Morph. mur. 0·05.
Elaeosacch. Anisi 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Währ. d. Anfalles 1 Pulv.

234. Codein. p. 0·10—0·15.
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Wie d. Vorige.

235. Chlorali hydrat. 10·0.
Div. in dos. = 10.
S. In einem Glas Wasser aufgelöst je 1 Stück z. n.

Cardiopalmus, Hyperkinesis cordis, Nervöses Herzklopfen.

Causal-Indication: Behandlung der Anämie, Hysterie, Neurasthenie, Menstruationsstörung, Wurmleiden. Einschränkung des Tabakrauchens. Gegen d. Anfall: Kälte auf die Herzgegend, laue Bäder.

236. Natr. bromat.
Ammon. bromat. aa. 10·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Tägl. 2—3 Pulver in Wasser.

Siehe auch Stenocardia, Asthma.

Caries der Knochen.

Zunächst Behandlung der causalen Tuberculose, Scrophulose oder Syphilis. Local Ruhigstellung des Gliedes, Biersche Compression, versuchsweise Ignipunctur. Bei Erwachsenen frühzeitige Blosslegung d. Krankheitsherdes, gründl. Auskratzung desselben mit dem scharfen Löffel, lockere Tamponade mit Jodoformgaze, roborirende Diät, Medication, welche bei Kin-

nicht selten allein genügt, vollständige Heilung herbeizuführen.

Caries der Zähne vide: Odontalgie.

Catarrhus bronchialis vide: Bronchitis.

Catarrhus intestini, Darmcatarrh, Diarrhoe.

Acut: Bettruhe; warme Cataplasmen, Amylum-Klystiere; zum Getränke schleimige Mittel, warmer Thee; restringirte Diät, Schleimsuppen. Gegen Schmerzen in der Magergegend warme Umschläge, Thermophor-Compressen oder subcut. Morphium Injection. Bei Anwesenh. v. Fäcalmassen im Dickdarm ein leichtes Abführmittel (Ol. ricini, Calomel) oder Klysmen. Später Opiate.

Chron.: Ermittelung des ursächlich. Momentes; ein Abführmittel oder Klysma, wenn harte Kothmassen im Colon sind; passende Diät: leicht verdauliche Nahrung (Milchcur). Warme Leibbinde; möglichste Schonung vor Erkältung und vor Diätfehlern; Trinkcur m. Karlsbader Wasser als Getränk: Giesshübler, Krondorfer; in gewissen Fällen Kaltwassercur.

237. Decoct. r. Salep. 150·0.
Laudan. pur. 0·10,
Syr. Diacodii 20·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

238. Mixt. gummos. 150·0,
Tinct. Laud. simpl. gtts. 2·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

239. Dect. ligni Campech. e 20·0
ad 200·0.
Laud. liq. Syd. gtts. 20,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Jede 2. Stunde 1 Essl.

240. Tr. opii s. 3·0,
Tr. Strychni 2·0.
Tr. Cascarill. 10·0.
S. 3mal tägl. 15 Tropfen.

241. Laudani pur. 0·20,
Tannini pur.,
Sacch. alb. aa. 2·0.
M. f. p. div. in dos. =
S. Stündlich 1 Pulver.

242. Tannini pur. 1·0.
Morph. mur. 0·10,
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 P

243. Pulv. Dower. 1·0,
Tannini pur.,
Extr. Colombo aa. 0·5
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. =
S. Stündlich 1 Pulver.

244. Tannigeni 10·0.
S. 3mal täglich 1 Mes
spitze voll zu nehmen.

245. Tannalbin. 10·0,
div. in dos. X.
S. 3—4 Pulver tägl. z

246. Tannoform. 0·5.
D. tal. dos. Nr. X.
S. 3—4 Pulver tägl. z

247. Tannopin (= Tannon)
0·3—
D. tal. dos. Nr X.
S. 3—4mal tägl. 1 P
zu nehmen.

248. Tanocol. 1·0,
D. tal. dos. Nr. X.
S. Wie das Vorige.

249. Bism. salicyl. (od. subni
Sacch. lactis aa. 15·0.
M. f. p. div. in dos. =
S. 3stündl. ein Pulver.

250. Salicin 0·5,
Gummi arab. 6·0,
Sacch. alb. 4·0.
M. f. p. div. in dos. =
S. Stündlich ein Pulver

251. Decoct. r. Salep. 200
Tinct. Laud. simpl. 2·0
S. Zum Klystier.

Als Antifermentativa bei st
Zersetzungsvorgängen des
inhaltes Calomel (0·05—0·
oder

252. *Saloli,*
Bismuth. salicyl.,
Natr bicarb. aa. 10·0,
div. in dos. = 30 adcaps. amyl.
S. 2mal täglich 1—2 Kapseln vor dem Essen.

253. *Resorcin. 5·0.*
Aq. dest. 180·0,
Aq. Cinnamom. 20·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

254. *Menthol. 0·2,* [25·0.
Solve in Spirit. vin Cognac
Adde: Tr. Coto 10·0.
D. S. 3mal tägl. 15 Tropfen (in einem Löffel Rothwein).

durch Suppe mit Eiweiss. Bei heftiger Diarrhoe Minimum von Nahrung.

Bei Kindern unter 1 Jahre womöglich Ammenmilch, Regelung der Diät. Rahmgemenge (1/4 Liter süsser Rahm, 3/4 Liter Wasser, 15 Gramm Milchzucker). Biedert's künstliches Rahmgemenge. Klystiere mit Amylum, Leinsamen od. Decoct. Salep. Von Medicamenten am besten Opium als Tinct. opii simpl. oder Pulvis Doweri. Dosirung nach folgender Tabelle (Monti):

Alter des Kindes	Tinct. opii simpl.		Pulv. Doweri	
	Mischung	Einzeldosis	Dispensation	Einzeldosis
Bis zu 6 Wochen	1 gtt. : 100·0 Flüssigkeit	2stündl 1 Kaffeel.	0·05 in 10 Dosen	2—3 Pv. täglich
6 Wochen bis 3 Monat	1 gtt. : 70·0	2stündl. 1 Kinderlöffel	0·07 in 10 Dosen	2stündl. 1 Pulv.
3—9 Monat	2 gtt. : 100·0		0·1 in 10 Dosen	
9—12 Monat	2 gtt. : 70·0		0·1 in 10 Dosen	
1—2 Jahre	3—4 gtt. : 100·0		0·1—0·2 in 10 Dosen	

255. *Eucalypteol 0·25.*
D. tal. dos. Nr. X.
S. 4—6 Pulv. tägl. zwischen den Mahlzeiten zu nehmen.

Bei starkem Meteorismus:

256. *Magnes. ust.*
Sacch. alb. aa. 2·0,
Pulv. rad. rhei 1·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3mal tägl. 1 Pulv.

Vide: Colica flatulenta.

Beim Enterocatarrh der Kinder (vgl. auch Cholera infantum) ist die Diät zu regeln: Fleischbrühe, Schleimsuppe, Eiweisswasser, Fleisch. Bei Diarrhoea ablactatorum Aussetzen jeder Milchnahrung, Ersatz

257. *Tannigen. 0·25—0·5,*
d. tal. dos. Nr. X.
S. 3—4 Pulver täglich.

258. *Tannalbin. 0·5,*
d. tal. dos. Nr. V.
S. 2—4 Pulver täglich.

259. *Tannoform.*
Elaeosacch. menth. pip. aa. 0·25,
D. tal. dos. Nr. X.
S. 3—4 Pulv. tägl. in Thee, Milch u. dgl.

260. Decoct. r. Salep. 80·0,
Tinct. Ratanh. gtts. 20,
Tinct. Laud. spl. gtts. 1—
Syr. simpl. 10·0.
S. Stündl. 1 Kinderlöff

261. *Inf. cort. Cascarillae conc. e 10·0 ad 80·0,*
Syr. Chamomillae 10·0.
S. Jede 2. Stde. 1 Kinderlöff.
262. *Inf. rad. Colombo e 10·0, ad 80·0.*
Syr. rub. Idaei 10·0.
S. Jede 2. Stunde 1 Kinderl. (event. 1 bis 2 Tropfen Tinct. Laudani simpl. hinzuzufügen).
263. *Extr. Colombo 0·2.*
Pulv. Dower. 0·1—0·2.
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2ständl. 1 Pulver
264. *Tinct. Coto 10·0.*
S. 5—10 Tropf. mehrm. tägl.

Bei chronischem Catarrh jeden 2. Tag eine Darmirrigation mit 5‰ Kochsalz- oder 3% Natr. benzoic.-Lösung.

Bei drohend. Collaps russ. Thee mit oder ohne Rum, Liq. Amm. anis., Spir. aeth. innerlich.

Catarrhus laryngis vide:

Laryngitis und Tuberculosis pulmonum et laryngis.

Catarrhus pharyngis,

Rachencatarrh.

Häufiges Gurgeln m. Salbei- od. Eibischthee, öfters kleine Quantit. von Milch, Mandelmilch u. dgl., kalte oder Priessnitz-Umschläge um den Hals. S. a. Angina tonsillaris.

265. *Kal. chlorici 5·0,*
Aq. dest. 500·0.
Syr. Moror. 20·0.
S. Mundwasser.
266. *Alum. cr. pulv. 10·0,*
Aq. dest. 500·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Mundwasser.
267. *Boracis venet. 5·0,*
Aq. dest. 500·0,
Syr. Diacod. 20·0,
S. Mundwasser.
268. *Decoct. rad. Ratanh. e 15·0 ad 200·0,*
Tinct. Myrrhae 3·0,
Spir. Cochlear. 20·0.
S. Zum Gurgeln.
269. *Antinosin 1·0—2·0.*
Aq. menth. pip. 100·0.
S. 1 Esslöffel auf 1 Glas Wasser z. Gurgeln.

Bei chronischem Rachencatarrh Vermeidung der Schädlichkeiten (Alkohol, Tabak). Gebrauch v. Mundwässern, Einpins. v. Medicam., in hartnäck. Fällen Bestreichung mit dem Lapisstifte. Aetzungen m. dem Thermocauter.

270. *Acid. tann. 0·1,*
Spirit. vin. Gallic. 30·0,
Aq. dest. 60·0.
Syr. diacodii 10·0.
MDS. Gurgelwasser.
271. *Arg. nitr. cryst. 0·50,*
Aq. dest. 10·0.
S. Zum Bepinseln.
272. *Kal. jodat. 2·0,*
Jodi pur. 0·20,
Glycerini 10·0.
S. Z. Bepinseln (namentl. bei Pharyngitis sicca u. syphilitica).

Inhalationen von Lösungen v. Alumen, Kal. chloricum, Tannin etc. Vide: Anhang.

Catarrhus vaginae vide:

Fluor albus.

Catarrhus ventriculi acut.,

acuter Magencatarrh.

Beim einfachen „verdorbenen Magen" strenge Diät (reizlose, leicht verdauliche Speisen) durch 1—2 Tage, am besten Hungern durch 24 Stund.; nur wenn Speisen noch i. Magen vermuthet werden, ein Brech- oder Abführmittel; besser Ausspülung des Magens. Schlucken von Eisstückchen, kalte Umschläge auf den Magen (wo sie vertragen werden). Beim

durch mehrere Tage nebst Regelung des Stuhlganges; gegen den Durst Sodawässer: Giesshübler, Krondorfer, Preblauer, Salvat.; bei eintretender Besserung sorgfältige Wahl der Speisen, Somatose, Plasmon etc.

273. *Natr. bicarb. 2·0,*
Aq. dest. 150·0,
Syr. rub. Id. 15·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

274. *Natr. bicarb.,*
Magnesia ustae aa. 15·0.
S. Messerspitzw. (Bei saurem Aufstossen und lästiger Gasentwicklung.)

275. *Resorcin. resublim.*
Acid. mur. dil. aa. 2·0,
Aq. dest. 200·0,
Syr. cort. Aurant. 20·0.
D. in vitr. nigro.
S. 2ständlich 1 Esslöffel.
Gegen Brechreiz Eispillen, kohlensaure Wässer (Giesshübl, Salvator, Radein), event Morphium subcut. oder als Suppositorien.

276. *Aq. Lauroc. 10·0,*
Morphii mur. 0·10.
S. Ständlich je 5 Tropfen auf 1 Eispille.
Beim Erbrechen von Speiseresten Erleichterung durch laues Wasser oder Thee.
Als einfaches Stomachicum:

277. *Tinct. amarae (od. Tinct. Absynthii comp.) 30·0,*
Tinct. Nuc. vom. 10·0.
S. 15—20 Tropfen 4—5mal täglich.

278. *Tinct. Chinae comp.,*
Tinct. Calam arom. aa. 10·0.
S. Vor der Mahlzeit 10 Tr. auf Zucker.

279. *Acid. mur. 0·50,*
Aq. dest. 100·0.
S. 3mal täglich je 1 Esslöffel vor dem Essen.

280. *Extr. Gentian. 2·0,*
Aq. dest. 100·0,
Elaeosarch. Menthae 5·0.
S. 3mal tägl. je 2 Esslöffel.

Bei Kindern strenge Diät, mildes Laxans, Giesshübler, Radeiner.

281. *Natr. bicarb. 2·0,*
Aq. dest. 100·0,
Aq. Lauroc. 1·0,
Syr. rub. Idaei 10·0.
S. Ständl. 1 Kinderlöffel.

282. *Acid. mur. dil. gtts. 6—8,*
Aq. dest. 80·0.
S. Früh. Mittags u. Abends 1 Kinderlöffel.

S. auch Dyspepsie.

Bei hohem Fieber:

283. *Apolysin.,*
Sacch. alb. aa. 1·0,
Pulv. jalap. comp. 2·0,
M. f. p. div. in dos. acq.
S. 2stdl. 1 Pulv. [*Nr. X.*

Catarrhus ventriculi chronicus, chronisch. Magencatarrh.

Ermittlung d. Schädlichkeiten. Strenge u. lang durchzuführende Ordnung in der Diät: Keine fetten und gewürzten Speisen, keine geistigen Getränke; keine Hülsenfrüchte, wenig Gemüse, nicht zu viel Flüssigkeit. Empfohlen wird Milch, besonders saure; leicht verdauliche, nicht fette Fleischsorten, weiche Eier. Bei Trinkern Beschränkung des Alkoholgenusses. Bei sitzender Lebensweise Bewegung i. Freien. Sorge für tägl. Stuhlentleerung. Methodische Magenausspülungen mit warmem Wasser oder entsprechenden Lösungen (Natrium bicarbonicum, 1% Salicylsäure oder Borsäure, 1‰ Argentamin) 6—7 Stunden nach dem Essen. Gegen Anämie Eisenpräparate, Guberquelle, Franzensb., Cudova, Pyrmont. Mechanische Behandl. Massage, Kaltwassercur. Karlsbader oder Marienbader Wass. Radlauer's Eisenalbumin-P ton-Essenz.

284. Natri bicarb.,
Sacch. alb. aa. 10·0.
S. Messerspitzvoll 1/. St. nach der Mahlzeit.
285. Subnitr. Bism. 0·50,
Sacch. alb. 3·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh, Mitt. u. Abds. 1 Pulv.
286. Acid. mur. dil. 1·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Esslöffelweise.

Bei Sodbrennen und heftigen Schmerzen in der Magengegend (Gastralgie):

287. Natr. bicarb. 20·0.
M. f. P. S. Messerspitzw. nach dem Essen.
288. Subnitr. Bism. 1·0,
Morph. muriat. 0·05,
Natr. bicarb.,
Sacch. alb. aa. 1·0,
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

Bei gleichzeitiger Stuhlverhaltung:

289. Natr. sulf. 100·0,
Natr. bicarb. 80·0,
Natr. chlorat. 40·0,
Kalii sulf. 5·0,
S. Ein Kaffeelöffel voll in 1/2 Glas Wasser aufgelöst 1—2mal täglich zu nehmen.
(Künstliches Karlsbader Salz.)
290. Natr. bicarbon.
Magnes. ust.,
Pulv. rad. Rhei aa. 10·0,
Elaeos. Foeniculi 20·0.
S. 3mal tgl. 1 Messerspitze nach der Mahlzeit.
291. Inf. rad. Rhei 6·0 : 180·0,
Resorcin. 2·0,
Natr. bicarb. 8·0,
Syr. simpl. 10·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.
292. Tr. Cascar. sagradae 10·0.
S. Abds. 1-2 Kaffeel. v. z. n.

Bei Gasansamml. im Magen:
293. Magnesiae ust.
Natr. bicarb. aa. 20·0.
S. Messerspitzweise.

294. Aq. Carvi 200·0.
S. Nach der Mahlzeit 1 bis 2 Essl. zu nehmen.
295. Tr. nucis vom. 25·0,
Resorcin. 5·0,
Tr. amar. 10·0.
S. 2stündl. 10—15 Tropfen.

Bei Magenkrampf und kolikartigen Schmerzen:

296. Aq. Laurocer. 10·0,
Tinct. nuc. vom. gtts. 10.
S. Früh u. Abends je 10 Tr.

Gegen den sauren Geschmack im Munde Ausspülung mit einer Lösung von Natr. bicarb.; bei pappigem, bitterem Geschmack mit verdünnten Säuren.

Bei reichlicher Schleimbildung im Magen:

297. Argent. nitr. 0·50,
Pulv. et Extr. r. Acori q. s. u. f. pil. Nr. 50.
S. Früh u. Abends je 2 Pillen.

Wegen Appetitlosigkeit:

298. Extr. nuc. vom. 0·10,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.
299. Extr. Trifol. fibr.
Pulv. rad. Acor. aa. q. s. u. f. pil. pond. 0·20 Nr. 30.
S. Früh, Mittags u. Abends je 2 Pillen.
(Ebenso Extr. Gentianae oder Cascarillae.)
300. Extr. Gentian. 2·0,
Aq. dest. 200·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. 3stündl. 1 Esslöffel.
301. Tinct. amarae.
Tinct. Chin. comp. aa. 20·0.
S. Vor jed. Mahlzeit 1 Kaffeelöffel.
302. Cort. Condurango 15·0,
Mac. p. hor. 12.
c. Aq. dest. 300·0,
Dein coque ad remanent. Col. 150·0
Adde: Syr. cort. aur. 20·0
S. 4 Esslöffel täglich.

303. Vini Condurango 100·0.
S. 1 Kaffeelöffel v. d. Essen.
304. Tinct. rhei vinos. 50·0.
S. 3 Kaffeelöffel täglich.
305. Orexin. basic. s. tannic. d. tal. dos. Nr. V. [0·3.
S. Vormittags 1 Pulver in einer Tasse Fleischbrühe zu nehmen.
(Nach 5—10tägigem Gebrauch 8 Tage aussetzen und dann eventuell wiederholen. — Penzoldt)
306. Chloralbacid. 4·0.
Aq. dest. 180·0.
Syr. cort. aurant. 20·0
MDS. 2stündl. 1 Esslöffel
oder
307. Chloralbacid-Tabletten à 0·3—0·5.

Bei Kindern, namentlich bei Säuglingen, strenge Regelung der Diät: Leichte Abführmittel (vide Dyspepsie). Bei mehrjährigen Kindern vermeide man Fette, gebe wenig Amylacea und Gemüse, nicht zu viel Flüssigkeit, in erster Linie also Milch und Fleisch und dessen Praparate, kalte Wasserbinde üb. d. Magengegend. Giesshübler, Preblauer, Krondorfer, Radeiner, Salvator und eventuell kleine Mengen von Karlsbader Wasser, Karlsbader Salz, Mattoni's Quellsalz.

308. Pepsini germ.,
Sacch. alb. aa. 0·15.
M. f. p. dent. tal. dos. = 10.
S. Vor jeder Mahlz. 1 Pul.

Bald darauf:

309. Acid. mur. dil. gtts. 10,
Aq. dest. 150·0.
S. Theelöffelw. zu nehmen.

Catarrhus vesicae vide: *Cystitis.*

Cephalalgia vide: *Hemicranie.*

Cerumenanhäufung.

(Anhäufung v. Ohrschmalz im äusseren Gehörgange.)

Zunächst Erweichung des Cerumenpfropfes mit warm. Wasser, Glycerin oder mit:

310. Acid. boric. 0·30,
Ol. olivar. 15·0.
S. Ohrtropfen.

Nach Erweichung des Pfropfes wird der äussere Gehörgang mittelst einer gut schliessenden, mit lauem Wasser gefüllten Wundspritze mit mässiger Gewalt ausgespritzt. Falls der Pfropf sehr festsitzt, ist die Procedur zu wiederholen.

Chalazeon, Hagelkorn.

Ausschälung od. Punction mit nachfolgendem Ausdrücken. Bei messerscheuen Individuen oder nach erfolgloser Punction gelbe Präpicitat- (v. Nr. 451) oder Jodkalisalbe einzureiben.

311. Kali jodat. 0·50.
Lanolin. p. 8·0.
Vaselini 2·0.
M. f. Unguentum.
S. Salbe.
312. Empl. Diachyli 5·0,
Tende supr. lint.
S. Pflaster (zur Bedeckung bei hartnäckigen Formen).

Chloasma, Leberflecke

vide: *Ephelides.*

Chlorosis, Bleichsucht.

Berücksichtigung der ursächlichen Momente; Regelung der Kost, der Lebensweise etc., Luftveränderung. Im Anfange der Krankheit Behandlung symptomatisch. Bei der Verabreichung des Eisens die Verdauungsfähigkeit des Magens berücksichtigen. Behebung vorh. Stuhlverstopf

Eisensomat., Guberquelle, Franzensbad, Pyrawarth, Pyrmont. Bäder m. Mattoni's Moorextr. Darkauer Jodsalz. – In schweren Fällen Mastcur (Playfair-Mitchell) in Verbindung mit allg. Massage. Plasmon und andere Nahrpräpar.

313. Tinct. Ferr. pom. 50·0,
Tinct. cort. aurant. 20·0,
Aq. Laurocer. 10·0.
S. Früh, Mittags u. Abends je 1 Kaffeelöffel.

314. Ferr. oxyd. dialys.,
Pulv. r. Ithei chin. aa. 5·0.
Extr. rad. Acor. q. s.
u. f. l. a. pil. Nr. 50.
S. Früh, Mittags u. Abe... je 2 Pillen.

315. Lactatis Ferr. 0·50,
Elaeosacch. Calami 3·
M. f. p. div. in dos. ...
S. Früh u. Abends 1 ...

316. Ferr. sulfur.,
Nutr. bicarb. aa. 5·0.
Extr. rad. Acor. q. s.
u. f. l. a. pil. Nr. 50.
S. Früh, Mittags und ...
je 3 Pill. (Modificirte Bl... sche Pillen.)

317. Ferr. citr. ammoniat.
Aq. dest. 10·0.
S. Eine Pracaz Spritze zu injiciren.

318. Ferr. jodat. sacch.,
Sacch. Lactis aa. 5·0.
M. f. p. div. in dos. ...
S. Früh u. Abds. je 1 P...

319. Ferr. reduct. 0·10,
Pulv. cort. Chinae,
Elaeosacch. Citri aa. ...
Dentur tales doses 10.
S. 3 Pulver täglich.
Pyrophosphors. Eisen, Lös... Eisenalbum., Solutio ars. Fo... *Haemoglobinwein (Radl.)* et...

320. Solut. arsen. Fowler 3·...
Liq. ferr. album. Drees 30,
D.S. 3mal tägl. 10 Trop... Rothwein).

Bei gestörter Verdauung:

321. Acidi mur. dil. 2—4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 1—2 Essl. 1/4 Stunde nach jeder Mahlzeit.

Zuweilen nach der Salzsäure noch Pepsin 0·25.

Kobert empfiehlt die durch Einwirkung von Pyrogallol auf Blut gewonn. Präparate Hämol und Hämogallol:

322 Haemol (vel Haemogallol.) pulverati 25·0.
Dtr. ad scatulam.
S. 1 Messerspitze evtl. in ...

calories has become associated in mind, with the idea of energy, a factor in human life. During the war, and long thereafter, the cry for calories came from many parts of the world and helped to give concrete character to that problems of food fuel. Thus, it has come about that the "substantial" foods and the important meals of the day furnish a reminder of high calory values. Such items of "extra food" as sweetmeats, the ice cream soda

Collaps Excitantien, Einhüllun-

MARYLAND

Dr. Arthur J. Lomas Accepts Iowa University Post.—Dr. Arthur J. Lomas, second assistant superintendent of the Johns Hopkins Hospital and director of the dispensary, has been elected director of the hospital of the University of Iowa, at Iowa City, and has accepted the post.

Harvard Chair Offered to Dr. Howland.—Dr. John Howland, professor of pediatrics at the Johns Hopkins Medical School, director of the Harriet Lane Home and pediatrician *in chief of the Johns Hopkins Hospital, has received an offer from the Medical School of Harvard University to become professor of children's diseases at that institution.*

steine

zu

re
en.
s.

ss.
0.

f.
0.
ds

m.

ps.
yl.

h

Opiate

Als Abortivmittel die Darmeingiessungen (Enteroklysma) (Nr. 336) und die Hypodermoklyse (Nr. 337) empfohlen; gegen das Erbrechen Eispillen und *Narcotica*, schwarzer Kaffee, *Giesshübler*, Salvator; Frottiren d. Körpers m. warm. Tüchern u. *Einreibung mit* spirituösen Mitteln *wegen der Krämpfe*; im cyanotischen Stadium Stimulantia. — Hydriatische Behandlung. Umsichtige Desinfection (5% Carbolsäure, 1‰ Sublimat oder del.). Zur Zeit einer Cholera-Epidemie ist jeder gewöhnlichen Diarrhoe besondere Sorgfalt zuzuwenden.

331. Acid. hydrochlor. dil. 10·0.
S. Mehrere Tropfen mehrmals täglich in abgekochtem Wasser zu nehmen.
(Vorbeugend bei bestehender Epidemie).

332. Decoct. lig. Campech. e 20·0 ad 200·0.
Extr. Colombo 5·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Stündlich 1 Essloffel.

333. Laudani pur. 0·20,
Subnitr. Bism. 0·50,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Stündlich 1 Pulver.

334. Dect. r. Salep. 200·0,
Tinct. Opii croc. gtts. 20·0.
S. ½ stündl. 1 Esslöffel oder zum Klysma.

335. Pulv. r. Colomb. 1·0,
Extr. Opii aqu. 0·20,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

336. Acid. tannic. 20·0
Gummi arab. 30·0,
Tinct. opii 2·0,
Aq. dest. 1000·0.
S. Enteroklysma. (Auf 40° C. erwärmt.)

337. Natr. chlorat. 3·0,
Natr. carbon. 4·0,
Aq. dest. 1000·0
S. Zur Hypodermoclyse auf 40° C. erwärmt, ins Unterhautzellgewebe zu injiciren.

338. Tinct. Opii simpl. 5·0
Extr. Aloës aqu. 4·0.
S. 10—15 Tr. in 1 Glas
(oft als Choleratropf. ex

Eisensomat., Guberquelle, Franzensbad, Pyrawarth, Pyrmont, Bäder m. Mattoni's Moorextr. Darkauer Jodsalz. – In schweren Fällen Mastcur (Playfair-Mitchell) in Verbindung mit allg. Massage. Plasmon und andere Nährpräpar.

313. Tinct. Ferr. pom. 50·0,
Tinct. cort. aurant. 20·0,
Aq. Laurocer. 10·0.
S. Früh, Mittags u. Abends je 1 Kaffeelöffel.

314. Ferr. oxyd. dialys.,
Pulv. r. Rhei chin. aa. 5·0.
Extr. rad. Acor. q. s.
u. f. l. a. pil. Nr. 50.
S. Früh, Mittags u. Abends je 2 Pillen.

315. Lactatis Ferr. 0·50,
Elaeosacch. Calami 3·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

316. Ferr. sulfur.,
Natr. bicarb. aa. 5·0,
Extr. rad. Acor. q. s.
u. f. l. a. pil. Nr. 50.
S. Früh, Mittags und Abds. je 3 Pill. (Modificirte Blaud'sche Pillen.)

317. Ferr. citr. ammoniat. 2·0,
Aq. dest. 10·0.
S. Eine Pravaz Spritze voll zu injiciren.

318. Ferr. jodat. sacch.,
Sacch. Lactis aa. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. je 1 Pulv.

319. Ferr. reduct. 0·10,
Pulv. cort. Chinae,
Elaeosacch. Citri aa. 0·5.
Dentur tales doses 10.
S. 3 Pulver täglich.

Pyrophosphors. Eisen, Lös. v. Eisenalbum., Solutio ars. Fowl., *Haemoglobinwein (Radl.) etc.*

320. Solut. arsen. Fowler 3·0,
Liq. ferr. album. Drees 30·0.
D.S. 3mal tägl. 10 Tropfen in Rothwein).

Bei gestörter Verdauung:

321. Acidi mur. dil. 2—4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 1—2 Essl. 1/4 Stunde nach jeder Mahlzeit.

Zuweilen nach der Salzsäure noch Pepsin 0·25.

Kobert empfiehlt die durch Einwirkung von Pyrogallol auf Blut gewonn. Präparate Hämol und Hämogallol:

322 Haemol (vel Haemogallol.) pulverati 25·0.
Dtr. ad scatulam.
S. 1 Messerspitze voll in Oblaten 3mal tägl. kurz vor den Mahlzeiten zu nehmen.

323. Ferratin 20·0,
div. in dos. XX.
S. 3 Pulver tägl. z. nehmen.

Bei gleichzeitigen nervösen Beschwerden:

324. Ferropyrin 0·6,
Syrup. Aurant. 20·0.
Aq. dest. ad 200·0.
S. 3m. tgl. 1 Essl. voll zu n.

325. Sanguinoform. 10·0.
F. pulv. div. in dos. = X.
DS. Täglich 3 Pulver.

Cholelithiasis, Gallensteinbildg., Gallensteinkolik.

Symptomatische Behandlung der Schmerzen (Morphium intern oder subcut.), des Erbrechens, der transitorischen Verstopfung (Senna, Rheum) etc. Kost: mageres Fleisch, Fische, Eier. Obst, grünes Gemüse; Enthaltung von fetten Nahrungsmitteln, Oel und purem Wein, Säuren und säuregebend. Speisen. Bewegung in frischer Luft. In den freien Pausen Mittel behufs eventueller Auflösung der Steine. Franzensbader Natalliequelle, Giesshübler, Karlsbad, Ems, Krondorfer, Preblau, Salvator, Vichy. Währ. des Anfalles ausser Morphium Chloralhydrat, Inhalation v Chloroform oder Aether.

Collaps Excitantien, Einhüllun-

er Steine

g:

00·0,

0·0,

ages zu

stiere

fohlen.

lben s.

5,

·0,

2 P.

uriss.

25·0,

s. nt f.

·100.

bends

ehm.

caps.

myl.

sel.

mi-

rch

ere.

Opiate und ... Als Abortivmittel die Darmeingiesstungen (Enteroklysma) (Nr. 336) und die Hypodermoklyse (Nr. 337) empfohlen; gegen das Erbrechen Eispillen und *Narcotica*, schwarzer Kaffee, *Giesshübler, Salvator*; Frottiren d. Körpers m. warm. Tüchern u. *Einreibung* mit spirituösen Mitteln wegen der Krämpfe; im cyanotischen Stadium Stimulantia. — Hydriatische Behandlung. Umsichtige Desinfection (5% Carbolsäure, 1‰ Sublimat oder dgl.). Zur Zeit einer Cholera-Epidemie ist jeder gewöhnlichen Diarrhoe besondere Sorgfalt zuzuwenden.

331. Acid. hydrochlor. dil. 10·0.
S. Mehrere Tropfen mehrmals täglich in abgekochtem Wasser zu nehmen.

(Vorbeugend bei bestehender Epidemie).

332. Decoct. lig. Campech.
e 20·0 ad 200·0
Extr. Colombo 5·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

333. Laudani pur. 0·20,
Subnitr. Bism. 0·50,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Ständlich 1 Pulver.

334. Dect. r. Salep. 200·0,
Tinct. Opii croc. gtts. 20·0.
S. ½ ständl. 1 Esslöffel oder zum Klysma.

335. Pulv. r. Colomb. 1·0,
Extr. Opii aqu. 0·20,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

336. Acid. tannic. 20·0
Gummi arab. 30·0,
Tinct. opii 2·0,
Aq. dest. 1000·0.
S. Enteroklysma. (Auf 40° C. erwärmt.)

337. Natr. chlorat. 3·0,
Natr. carbon. 4·0,
Aq. dest. 1000·0
S. Zur Hypodermoclyse auf 40° C. erwärmt, ins Unterhautzellgewebe zu injiciren.

338. Tinct. Opii simpl. 5·0,
Extr. Aloës aqu. 4·0.
S. 10—15 Tr. in 1 Glas W
(oft als Choleratropf. exper

MARYLAND

Dr. Arthur J. Lomas Accepts Iowa University Post.—Dr. Arthur J. Lomas, second assistant superintendent of the Johns Hopkins Hospital, has been elected director of the hospital of the University of Iowa, at Iowa City, and has accepted the post.

Harvard Chair Offered to Dr. Howland.—Dr. John Howland, professor of pediatrics at the Johns Hopkins Medical School, director of the Harriet Lane Home and pediatrician in chief of the Johns Hopkins Hospital, has received an offer from the Medical School of Harvard University to become professor of children's diseases at that institution.

Bei heftigem Erbrechen:

339. Morphi muriat. 0·05,
Tinct. Op. croc. gtt. 20·0,
Aq. laurocer. 10·0.
S. 1/2stündl. 10 Tropfen.

340. Morph. muriat. 0·1,
Aq. dest. 10·0.
DS. Zur Injection.

Bei Collaps:

341. Camphor. ras. 0·30,
Sacch. alb. 3·0,
M. f. p. div. in dos. = 10,
S. Stündlich 1 Pulver.

342. Camphorae ras. 2·0,
Aetheris sulf. 10·0.
S. Zu Handen des Arztes (Je 10 Tropfen subcutan zu injiciren.)

343. Moschi opt. 0·30,
Olei Menth. pip. gtts. 10.
Aetheris sulf. 10·0.
S. Stündl. 5—10 Tropfen.

Cholera infantum, Brechdurchfall der Kinder.

Bettruhe, strenge Diät, Priessnitz-Umschläge auf den Unterleib, Klysmata mit Amylum, Decoct. sem. Lini od. rad. Salep.; innerlich Constipantia (vide Catarrhus intestin.). Im Säuglingsalter Ammenmilch, Wechsel d. Nahrung (neue Amme), Kalbsbrühe mit Milch, stündlich 3—4 Kaffeelöffel. Bei stark. Erbrechen Magenauswaschung, ev. Eiweisswasser. Im asphyctisch. Stadium Senfbad, Rum, Cognac, Kaffee, Campher, Liq. Amm. anis. Kochsalzinfusion.

344. Hydrarg. chlorat. 0·005—0·01,
Sacch. 0·5,
D. tal. dos. Nr. X.
S. 2—3 Pulver täglich.
(Zu Beginn der Erkrankung.)

345. Resorcin. 0·5—1·0,
Aq. dest. 1000·0.
S. Zur Auswaschung des Vagens.

346. Resorcin. resublim. 0·3
Aq. dest. 80·0, [*bis 0·5,*
Tinct. amar. 1·0,
Syr. simpl. 20·0.
D. in vitr. nigro.
S. 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

347. Arg. nitr. cryst. 0·10.
Decoct. rad. Salep. 50·0.
S. Für 2 Klystiere.

348. Acidi salicyl. 1·0.
Sol. in s. q. Spir. v., adde.
Aq. dest. 50·0.
S. Für 2 Klystiere.

349. Inf. flor. Chamomill. e 10·0 ad 100·0,
Resorcin. p. 1·0,
Aq. menth. pip.,
Syr. s. aa. 5·0.
S. Stündlich 1 Kaffeelöffel.

Bei Collaps:

350. Aether. sulf. 2·0.
Mixt. gummos. 100·0,
Aq. Cinnamom.,
Syr. simpl. aa. 5·0.
S. Stündlich 1 Kinderlöffel.

351. Liq. Amm. anis.,
Spir. aether. aa. 10·0.
S. 1/2stündl. 3—7 Tropfen.

352. Camph. trit. 0·10.
Mixt. oleosae 100·0.
S. 1/2stündl. 1 Kinderlöffel.

353. Natr. chlorat. 0·6,
Aq. dest. 100 0.
S. Zur subcutanen Infusion.

Cholera nostras vide Catarrh. intestin.

Chorda, schmerzhafte Erection.

Kalte Umschläge auf d. Glied und Perineum; Einreibung von passenden Salben; in heftigeren Fällen Stuhlzäpfch. m. Morphium od. Morphium-Injectionen. Amylnitrit 3—5 Tropfen zu inhaliren. Auch Bromkali oder Campher innerlich. Elektr. Behandlung Points de feu am Rücken.

354. Cocaini mur. 0·10,
Aq. dest. 5·0.
S. 2% Cocainlösung.
(Einige Tropfen 4—5mal im Tage in die Harnröhre zu injic.)

355. Extr. Belladonn. 1·0,
Lanolin. 8·0,
Vaselin. 2·0.
S. Salbe (z. Einreiben auf das Mittelfleisch und die Haut des Gliedes).

356. Morph. muriat. 0·10,
Butyr. Cacao q. s.
u. f. suppos. Nr. 5.
S. Abds. 1—2 St. zu verwend.

357. Lupulini 1·0,
Heroïn. 0·1.
Extr. Lupul. q. s.
u. f. pil. Nr. 10.
S. 1—2ständl. 1 Pille.

358. Kal. bromat. 0·5—1·0.
Dt. tal. dos. Nr. X.
S. Abds. 1-2 Pulv. zu nehm.

Chorea minor, Veits-Tanz.

Causale Behandlung b. reflectorischen u. secundären Formen (Abtreibung von Helminthen, Extraction von Zähnen, Beschleunigung der Geburt bei Ch. gravidarum) oft von Erfolg. Bei Ch. im Anschluss an Rheumatismus salicylsaures Natron. Im Allgem. jeder Reiz auf das Nervensystem fernzuhalten, Alkoholica, Kaffee zu verbieten. Bei Anämisch-Chlorotischen tonisirendes Verfahren, Eisen mit Chinin, bes. Chininum ferrocitricum. Darkauer Jodsalz. Moorbäder (Mattoni's Moorsalz). Gut gelüft. Wohnung u. Vermeid. v. körperlichen u. geistigen Anstrengungen. — Galvanisation, Massage und Gymnastik, manchmal Bettruhe u. Massage, leichte hydriatische Proceduren.

359. Ferr. carb. sacch. 2·0,
Oxyd. Zinc. 1·0,
Sacch. alb. 10·0.
S. Früh, Mittags u. Abends 1 Messerspitze voll.

360. Chinin. ferro-citric. 1·0,
Elaeosacch. calum. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3 Pulver täglich.

361. Sol. ars. Fowl. 10·0.
S. 5 Tropfen 3mal täglich (steigend bis 20 u. 25 Tropfen).

362. Liq. Kal. ars.,
Aq. dest. aa. 5·0.
S. 6 Tropfen 3mal tägl.

363. Antipyrin 10·0.
Dis. in dos. = 20.
S. Täglich 2—4 Pulver.

364. Kali bromat. 5·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Früh, Mittags u. Abends 2 Esslöffel.

365. Tinct. Ferri pom.,
Sol. ars. Fowleri aa. 5·0.
S. 5 Tropfen ansteigend bis 20 Tropfen täglich.

366. Exalgin. 2·0,
Dis. in dos. = 10.
S. Täglich 3 Pulver in warmem Zuckerwasser zu nehm.

367. Chloral. hydrat. 4·0.
Aq. dest. 150·0.
Syr. simpl. 30·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

Neuestens wird empfohlen:

368. Physostigmin. sulf. 0·01.
Aq. dest. 10·0.
S. Mit ½ Pravaz'scher Spritze zu beginnen, bis zwei Spritzen zu steigen.

369. Hyoscin. mur. 0·01.
Aq. dest. 10·0.
S. Injection. Wie d. Vor.

Chorioideitis.

Causale Behandlung. Nachforschung wegen Lues, Intermittens. Abführmittel.

Bei Glaskörpertrübungen:

370. Pilocarpin. mur. 0·50,
Aq. dest. 25·0.
S. Z. subcutanen Injection. Täglich 1 Pravaz'sche Sp. (= 0·02) zu injiciren.

Nach Ablauf der entzündlichen Erscheinungen:

371. Strychnin. nitr. 0·1,
Aq. dest. 10·0.
S. Injection. (Anfangs 2, später 3—4 Theilstriche unter die Schläfehaut zu injiciren.)

372. Folia Jaborandi c. stip. 50,
Aq. fervid. 100·0.
S. Ein Kaffeelöffel voll auf 1 Tasse Wasser esslöffelweise zu nehmen.

373. Natr. salicyl. 6·0.
Div. in dos. = 6.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

Cirrhosis hepatis, granulirte Leber.

Causale Behandlung; bei Potatoren allmalige Entwöhnung von geistigen Getränken, bei od. nach Intermittens Chinin, bei Lues antisyphilitische Cur. Regelung der Diät, Verordnung entsprechender Mineralwässer (Carlsbad, Marienbad, allenfalls Ems, Vichy, Homburg), leichte Abführmittel, Jodkali 1/2—4 Grm. pro die, daneben reine Milchdiät). Bei hypertrophischer C. h. wird Calomelbehandlung empfohlen. (6-, dann 4mal tägl. 0·05 Calomel 3 Tage lang, dann 3tägige Pause, durch längere Zeit.) Mundpflege! Symptomat. Behandlung; hauptsächliche Berücksichtigung des Magencatarrhs. Vide: Ascites.

Clavus vide: Tyloma.

Colica flatulenta.

Ermittelung und Bekämpfung der Ursache des Meteorismus, insbes. Anregung der Peristaltik durch Abführmittel (Hunyadi Janos, Mattoni's Bitterw.). Katapl*asmen: Warmflaschen, heisse Tücher, Unterleibsmassage, Elektricität. Moor-Umschläge. Heisser Thee: Chamomilla, Mentha, Melissa etc. Bei Kindern: Ermittlung und Beseitigung des ursächl. Momentes, Sorge für Entfernung des Darminhaltes durch reichl. Irrigation, Massage, Moorbäder (Mattoni's Moor-Extract), warmes Bad, bei heftigen Anfällen Chloralklysma: Regelung der Diät in qualitativer u. quantitativer Beziehung, namentlich keine fettreiche Milch, keine Amylacea; bei Säugling. Ammenwechsel.

374. Aq. Melissae s. Aq. Menth. pip. 150·0,
Extr. lign. Campech. 5·0.
Tinct. Laud. comp. gtts. 15.
Syr. simpl. 15·0.
S. Jede 2. Stunde 1 Esslöff.

375. Flor. Tiliae,
Flor. Chamomill.,
Fol. aurant. aa. 5·0.
S. Thee.

376. Olei Carvi 2·0.
Tinct. Valer. aeth. ad 20·0.
S. 20-30 Tropf. auf Zucker.

377. Extr. Cascar. sagrad. fluid. 10·0.
Syr. cort. aurant. 30·0.
S. 3mal tägl. 1 Kaffeelöffel.

378. Morph. mur. 0·05,
Aq. Lauroc. 10·0.
S. Tropfen.

379. Extr. Belladonnae 0·2.
Extr. Strychni 0·1,
Extr. opii 0·2,
Rad. Alth. [Nr. XX.
Succ. Liq. q. s. ut f. pil.
S. 2-3mal tägl. 1 Pille. (Leyden.)

380. Chloroformi gtts. 12,
Aq. Tiliae 50·0.
S. Jede 1/4 Stunde 1 Löffel.

Gegen blosse Flatulenz:

381. Magnes. ustae,
Elaeosacch. fornic. aa. 10·0.
S. Messerspitzweise z. n.

Bei nervösen älteren Kindern:

382. Extr. Bellad. 0·05,
Aq. amygd. amar. 5—10·0.
S. 10—20 Tropfen 3- bis 4stündlich.

…nygd. amar. 4·0,
…lladonn. 0·1.
…stündl. 10 Tropfen
…k d. Säugl. Wärme
…eib, Frottiren desselb.,
Irrigation (Klysmen)

…nstrualis vide:
…norrhoe.

…turnina, Bleikolik.
Sorge für Stuhlgang,
…pium; bei intensivem
…bcut. Morphiuminjec-
Bäder u. Umschläge
…terleib, warmer Thee.
…ssregeln zu Gunsten
…n Bleihütten etc.
Bellad. 0·05.
…nygd. am. 10·0.
5 Tropf. auf Zucker.
… puri 0·20.
… alb. 2·0.
… div. in dos. = 5.
… 1/2 Stunde 1 Pulver.

…e Athmung, warme
…ärmeflaschen, Frot-
…utreize; bei Blutver-
…lagerung d. unteren,
Einwickelung sämmtl.
…n, Transfusion, In-
…mer Kochsalzlösung.
…ge, Excitantien: Starke
…ampagner, schwarz.
…gnac, ferner:
…r. sulf. 10·0,
…or. trit. q. solv.
… Spritzen z. injiciren.
…amphorat. 10·0.
…e oben.
…phor. trit. 0·10,
…gummos. 0·50.
…o. d. tal. dos. = 10.
…stündl. 1 Pulver.

…, Verbrennung.
…r Ausdehnung kalte
…eventuell mit Aq.
… plumbica. Sofort nach der Verbrennung wirkt continuirliche Befeuchtung mit Glycerin als vollständiges und dauerndes Analgeticum. Vorhandene Blasen sind durch einen Einstich in d. Basis zu entleeren. Jodoformgazeverband, welcher erst im Verlaufe d. zweiten Woche gewechselt wird; schlagen die Wundsecrete durch, so genügt Wechsel d. Verbandwatte (Moseti g). Für das Gesicht Jodoformsalbe, darüber Maske aus Guttaperchapapier; selbe täglich zu erneuern. Bei Brandwunden auch Ichthyol oder Naftalan, eventuell v. Bardeleben's (Wismuth-)Brandbinden (Apotheker Br. Schmidt, Bremen). Bei gröss. Ausdehnung continuirliches Wasserbad. Gegen die Schmerzen Bepinselung mit 5- bis 10%igem Chloralhydrat od. einer 2%igen Cocainlösung. Bei Granulationswucherung Aetzung mit Arg. nitr.

389. Ol. Lini,
Aq. Calcis aa. 50·0.
S. Aeusserlich.

390. Aq. calcis,
Ol. Lin. aa. 50·0,
Thymol. 0·05 – 0·10.
S. Aeusserlich.

Dieses (modificirte Stahl'sche) Liniment kann später ersetzt werden durch:

391. Bismuth. subnitr. 9·0,
Acid. boric. 4·0,
Lanolin. 70·0,
Ol. olivar. 20·0.
S. Salbe.

392. Jodoform. (Dermatol, Airol) p. 2·0.
Vaselin. 20·0.
Lanolin. 30·0.
S. Salbe.

393. Nosophen 3·0,
Olei olic.,
Boli albi aa. 30·0,
Plumbi subacet. 20·0.
S. Salbe.

394. Europhen 3·0,
Ol. olive. 7·0,
Vaselini 60·0,
Lanolin. 30·0.
S. Salbe.

395. Cocaini mur. 0·20,
Aq. dest. 10·0
S. Zum Bepinseln.

396. Chlorali hydr. 1—2·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Zum Bepinseln oder zu Umschlägen.

Neuestens wird die Application von m. Pikrinsäure imbibirt. Watte oder sterilisirter Gaze empfohlen:

397. Acid. picronitrici 5·0,
Alcohol. 80·0,
Aq. dest. 1000·0.
S. Aeusserlich.

Am 3.—4. Tage Verbandwechsel.

Bei Kindern als inneres Beruhigungsmittel.

398. Chloralhydrat 1·0,
Aq. dest. 50·0,
Syr. cort. aur. 10·0.
S. Tägl. 2 Kinder- bis Esslöffel voll zu nehmen.

Nach Entfernung des Schorfes:

399. Acid. borac.,
Cerae alb. aa. 10·0,
Paraffin.,
Ol. amygdal. dulc. aa. 200.
S. Salbe.

400. Creolin 1·5,
Vaselin. 50·0,
S. Salbe.

401. Aristol. 3·0
Ol. olive. 20·0,
Lanolin. 100·0.
S. Salbe.

Comedones, Mitesser.

Local: Ausdrücken der Sebumpfröpfe mittelst Fingernägeln oder des Comedonenquetschers; Abreibung der Hautfläche mit Sandseife etc.; fortgesetztes Einpinseln von Essig, Aufstreichen von Citronensaft oder Bepinseln mit verdünnter Salzsäure beseitigen die schwarzen Köpfe der Comedon.; Rücksichtnahme auf ein eventuelles Allgemeinleiden.

402. Spir. sap. kalin. 50·0.
S. Zum Einreiben.

403. Lactis sulf. 10·0,
Spir. vini Gall. 50·0.
Spir. Lavand. 10·0.
Glycerini 1·50.
S. Zum Einreiben.

404. Naphthol. 5·0,
Sulf. praecip. 25·0,
Vaselin.,
Sapon. virid. aa. 15·0,
M. f. ungt. S. Salbe.

Mit dieser Salbe wird das Gesicht 2—3mal wöchentlich bestrichen und nach 10—15 Minut. (sobald leichte Röthe sichtbar und Brennen verspürt wird) abgewischt u. eingepudert. In der Zwischenzeit Behandlung mit indifferenten Salben und Amylum. Hier und da Waschungen mit Spir. sapon. kalin.

S. auch Acne vulg.

Commotio cerebri, Gehirnerschütterung.

Grösste Ruhe, dunkles Zimmer, Eisblase auf d. Kopf, Fieberdiät, Abführmittel. – Bei andauernder Bewusstlosigk. Hautreize, Frottirungen mit warmen Tüchern, kaltes Klysma, starke Riechmittel (Ammoniak, engl. Riechsalz). — Bei Harnverhaltung Katheter.

Condylomata acuminata, spitze Warzen, Feuchtwarzen.

Abtragung mittelst Hohlscheere und darauffolgende Aetzung mit Lapis; auch scharfer Löffel und galvanokaustische Schlinge verwendbar; Aetzung allein viel zu schmerzhaft, verzögert die Heilung. In Fällen zahlreicher klein

Condylome, ferner bei messerscheuen Individuen Streupulver, das jedoch jeweilig zu beseitigen und durch ein Verbandwasser ersetzt werde, so oft ausgedehnte Excoriationen zustande kommen. Bei messerscheuen Individuen, überhaupt bei Nichtausführung der Operation:

405. Calomel. laev. 10·0.
S. Streupulv. (nach vorgängiger Waschung m. Salzwass.).

Auch Bepinselung mit Salpetersäure, concentr. Sublimatsolution (0·20 ad 10·0 Spir.), Eisenchlorid, reiner Jodtinctur etc. verwendbar.

Eventuell auch:

406. Tinct. Jodinae 10·0.
Tinct. Gallarum 5·0.
Jodi pur. 0·1.
S. Früh u. Abds. zu bepins.
407. Acid. trichloracet. 0·3,
Jodi pur. 0·15.
Kal. jodat. 0·2,
Glycerin 15·0—30·0.
S. Vorsichtig mit einem Pinsel aufzutragen.

Condylomata lata vide: Syphilis universalis.

Congelatio. Erfrierung.

Bei anämischen, zu Perniones neigenden Individuen Hebung d. Ernährung, in der warm. Jahreszeit Hydrotherapie. Bei frischer Erfrierung Frottirung m. Schnee, kaltem Wasser. Bei Mortification d. Gewebes antiseptische Therap.

408. Aq. Goulardi 200·0.
S. Zu Umschlägen.
409. Plumb. ac. bas. sol. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Umschlägen.
410. Oxyd. Zinc. 2·0,
Lanolin. p. 25·0.
Vaselini 5·0.
S. Salbe.
411. M. praecip. alb. 2·0,
Vaselini 30·0.
S. Salbe.
412. Creosoti 2·0.
Ung. simpl. 15·0.
S. Salbe.
413. Empl. adhaesiv. 20·0.
Tende supr. linteum.
S. Pflaster (z. Druckverbd).
414. Pulv. Boracis 10·0,
Lanolini 40·0.
S. Zum Einreiben.

Bei eingetret. Hautgangrän bis zur Bildung der Demarcationslinie Umschläge mit essigsaurer Thonerde (Burow'scher Flüssigkeit):

415. Alum. crudi 5·0,
Plumb. acet. 25·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zu Umschlägen.

Bei mumificirendem Brand:

416. Bitumin. fagi 10·0,
Calcar. sulf. 50·0.
S. Streupulver.
417. Kal. hypermang. p.,
Argill. alb.,
Calcar. carb. aa. 10·0.
S. Streupulver.

Nach Entfernung der nekrotischen Partien antisept. Verband. Vide: Perniones.

Congestionen vide: Hyperaemia cerebri.

Conjunctivit. blennorrhoica acuta, acute Bindehaut-Blennorrhoe.

Bettruhe. Diät: Sorge f. Leibesöffnung; theilweise Verdunkelung des Zimmers; sorgfältige Reinigung d. Auges jede halbe Stunde. Desinfection mit übermangansaurem Kali oder Borsäure. Grosse Ansteckungsgefahr für das zweite Auge! Schutzverband. Antifebrile Medication. Eisumschläge, 8—10 Blutegel, welche bei Augenkrankheiten am besten am Processus mastoideus an der Schläfe oder hinter d. Ohren, selten oder nie am Nasenflügel applicirt werden. Im

laufe stets auf Complicationen seitens der Cornea zu invigiliren. Event. Scarificationen des Bindehautwalles. Behandlung eines etwa vorhandenen Trippers.

418. Arg. nitr. cryst. 0·50,
Aq. dest. 50·0.
S. Zu Handen des Arztes.

1%ige Lapislösung oder Protargol-Lösung, mit der die Bindehaut 1—2mal täglich zu bestreichen ist, passt im Beginne, sowie in Fällen von mässiger Secretion; bei reichlich. Secretion stärkere Lösungen:

419. Arg. nitr. cryst. 1·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Zu Handen des Arztes.

(2%ige Lapislösung.)

Bei grauer Infiltration der Bindehaut und bei croupösem Belag das Touchiren zu vermeiden!

Man pflegt auch mit mitigirt. Lapis zu touchiren:

420. Arg. nitr. cryst.,
Kal. nitr. aa. 2·0,
Misce f. bacill.
S. Zum Touchiren (stärker mitig. Lapis).

421. Arg. nitr. cryst. 2·0,
Kal. nitr. 4·0.
S. Zum Touchiren (schwächer mitig. Lapis).

422. Argentamin. 3·0—5·0,
Aq. dest. 100·0,
D. ad vitr. nigr.
S. Aeusserl. 1—2mal tgl. z. pins.

423. Gelatinetabletten mit Largin (1%ig).
S. Je ein Stück unter das Augenlid zu schieben und zergehen lassen (Welander).

424. Kal. hypermang. 0·10.
Aq. dest. 100·0.
S. Zur Desinfection.

Bei Schmerzhaftigkeit und gröss. Lichtscheu:

425. Ung. Hydrargyr. 10·0,
Extr. Belladonn. 2·0.
S. Erbsengross an Stirn und Schläfe mehrm. tägl. einzureib.

Treten Complicationen seitens d. Cornea auf, so verwende man:

426. Atropini sulf. 0·05.
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

Conjunctivit. blennorrhoica chronica, granul., aegyptiaca (militaris), chron. Bindehautblennorrhoe.

Vorsichtsmassregeln wegen Infection d. anderen Auges, sowie d. Augen d. Umgebung. Sorgfältige Reinhalt.; Schutzbrillen. Vermeidung von rauchiger oder staubig. Atmosph.; Schonung der Augen; zur Verminderung d. Schmerzen nach Cuprum kalte Umschläge od. Cocain. Elektrolyse, Peritomie.

427. Cupr. sulf. cryst. 10·0.
S. Zum Touchiren.

Der Blaustein muss passend geschliffen und glatt sein. Bei reichl. Secretion Lapis in Solut. (vide Nr. 419), selten en crayon; bei mässiger Secretion Cuprum sulfur. Abwechselnd mit Kupfer und Lapis verwende man:

428. Sacch. Saturn. 1·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Zum Bepinseln.

Auch Calomeleinstreuung. Kann d. Arzt d. Kranken nicht tägl. sehen, so wende dieser selbst d. Touchir. d. untern Lides mit Blaustein, oder falls dies nicht thunlich, ein Augenwasser an. Auch empfiehlt sich

429. Cupr. sulfur. 0·50,
Vaselini 5—10·0.
S. Salbe.

430. Cupr. sulf. 1·0,
Glycerini 10·0.
S. Augentropfen.

431. Plumb. acetic. 2·0,
Glycer. pur. anhydr. 10·0.
S. Aeusserlich.

Mittelst aseptischer Elfenbeinstäbchen zu appliciren.

Massage d. Conjunct. mit Borsäure.

Abreiben der Conjunctiva mit in ½ pro mille Sublimat getauchten Wattetupfern.

Bei Schmerzhaftigkeit:

432. Cocaini mur. 0·30.
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

Bei inveter. Pannus künstliche Ophthalmie erzeugt durch:

433. Sem. Jequirity subt. pulv.
Inf. per horas 24. [15·0.
cum Aq. dest. frig. 500·0
Filtra.
S. durch 3 Tage je 3mal die umgestülp. Augenlid. zu waschen.

Conjunctivit. blennorrhoica neonatorum

vide: Blennorrhoea neonatorum.

Conjunctivitis catarrhalis, Bindehaut-Catarrh.

Wiederholte Reinigung der Augen, besonders Morgens, mit lauwarmem Wasser oder Thee (Käsepappel- etc.). Keine kalten Umschläge, Aufenthalt in rauchgefüllten Localen, Küchen etc. zu untersagen, ebenso das Ausgehen bei Wind und Staub in den Strassen etc., überhaupt möglichste Schonung der Augen, also auch wenig Lesen und Arbeiten. Bei acuten Formen täglich einmaliges Bestreichen mit Lapislösung. Bei Cat. siccus Augendouche. Gleichzeitige Blepharadenitis zu berücksichtigen.

434. Argenti nitr. cryst. 0·25 bis
Aq. dest. 50·0. [0·30–0·50,
D. in vitr. nigr.
S. Zu Handen des Arztes.

(½—1%ige Lösung zur Bestreichung der Bindehaut mittelst Pinsels; ebenso ½%ige Protargol- und Largin lösung

435. Colyr. austr. int.,
Aq. dest. aa. 50·0.
S. Augenwasser (Früh und Mittags 1—2 Tropfen).

436. Zinc. sulfur. 0·10.
Aq. dest. 50·0.
S. Augenwasser.

437. Protargol. 2·0.
Aq. dest. 10·0.
S. Zum Pinseln d. Bindehaut.

438. M. praecip. alb.,
Extr. Belladonn. aa. 1·0.
Unguent. simpl. 10·0.
M. f. Ung.
S. Bohnengross an Stirne u. Schläfe alle 2—3 Stunden einzureiben. (Arlt'sche Salbe gegen Lichtscheu und heftigen Schmerz.)

Zur Secretionsbeschränkung:

439. Thioform 5·0.
S. Morgens und Abends mit einem Pinsel auf die Bindehaut zu streuen.

Treten Complicationen von Seiten der Cornea auf, so verordne man Atropin, eventuell Eserin und lasse die Reizmittel, falls sie nicht vertragen werden, weg. Bei Hornhautgeschwüren Jodoform. Bei Gefühl v. Trockenheit und Schwere der Lider:

440. Merc. praecipit. alb. 0·2 bis 0·25.
Lanolin. pur. 8·0,
Vaselini 2·0.
S. Erbsengr. am Lidrand einzureiben.

441. Xeroform 5·0.
S. Streupulver bei Conjunctivitis eczematosa).

Auch Einträufelungen v. Tinct. Opii croc. empfehlenswerth.

Bei leichten Catarrhen ohne erhebliche Secretion Waschungen der Augen m. spirituösen Mitteln: Franzbranntwein, Cölnerwasser, eventuell mit:

442. Lapidis divin. 0·50,
Aq. dest. 100·0,
Tinct. Op. croc. gtts. 5.
Acet. Litharg. 0·25.
S. Augenwasser. (v. C. Beeri.)

443. Spir. vini Gall.,
Aq. dest.,
Aq. rosar. aa. 20·0.
S. Waschmittel.
Auch Alumen-Krystall anwendbar.

Conjunctivitis crouposa.

Strenge Antiphlogose. Einpudern der Bindehaut mit Sulf. chin. Caustica erst nach dauernder Abstossung der Membranen.

Conjunctivitis diphtherit.

Schutz des gesunden Auges durch wasserdichten Verband. Beacht. d. Hornhaut. Dauernde Atropinisirung. Kälte. Bei Nachlass d. Entzündungserscheinung warme Umschläge.

Conjunctivitis follicularis.

444. Arg. nitr. 0·5,
Aq. dest. 50·0.
S. Einträufelung.
445. Protargol. 0·5,
Aq. dest. 50·0.
S. Einträufelung.

Bei Atropin-Conjunctivitis:

446. Plumb. acet. filtr. 0·25,
Aq. dest. 100·0.
S. Augenwasser.

Conjunctivitis scrophulosa (pustulosa).

Reinigung der Augen mit lauwarmem Wasser oder Thee. Beseitigung der zuvor mit Fett erweichten Krusten an d. Lidern; kein Verband; bei starker Lichtscheu Cocaineinträufelung; bes. *Rücksicht auf das diätetische Verhalten, Regelung der Kost (Fleisch, Eier, Milch, Bier, wenig Amylacea), trockene Wohnung, Bewegung im Freien etc. Innerlich Haller'sches Wasser, Eisen, Chinin, Jodkali, Phosphor, Leberthran.*

447. Calomelanos laevig. alc. 5·0
S. Zu Handen des Arztes.
(Mit e. Haarpinsel einzustreuen.)
448. Jodoform. subt. pulv.
Sacch. Lactis aa. 2·0.
S. Wie das Vorige.
449. Dermatol. 5·0.
S. Wie das Vorige.
450. Gallicin. 5·0.
S. Wie das Vorige.

Als Ersatz für Calomel-Inspersion Pagenstecher'sche Salbe:

451. Merc. praecip. flavi 0·20,
Vaselini 5·0.
M. exactiss. f. Ung. ophth.
S. Mittelst Pinsels auf die abgezogene Bindehaut gleichmässig zu vertheilen.
452. Calomelanos 0·20,
Lanolin. p. 3·0
Vaselini 2·0.
S. wie das Vorige.
453. Cocaini mur. 0·10,
Aq. dest. 5·0.
S. Augentropfen.
454. Merc. praecip. alb. 1·0,
Extr. Belladonn. 1·50,
Vaselini 10·0.
S. Bohnengross an d. Stirne und Schläfe einzureiben.

Bei starker Ciliarreizung Atropin sehr zweckmässig in Salbenform:

455. Atropini sulf. 0·05,
Vaselini 10·0.
S. Salbe (erbsengross mit einem Pinsel in den Bindehautsack zu bringen).
456. Ferr. carb. sacch. 2·0,
Chinini sulfur. 1·0,
Sacchar. albi 10·0.
M. f. pulv.
S. Messerspitzvoll Fr. u. Ab.
457. Kali jodat. 2·0,
Aq. dest. 50·0,
Syr. rub. Idaei 10·0.
S. Früh u. Abends 1 Esslöf

Constipation

vide: Ob

patio alvi.

Contusion, Quetschung.

Bei Blutextravasaten vorsichtige Massage. Bindeneinwickelung der Extremität von der Peripherie bis zum Centrum. Kälte.

Vide: Vulnus contusum.

Convulsiones vide:

Eclampsia.

Coryza, Schnupfen.

Prophylactisch Abhärtung bei Disponirten. Die Behandlung des chronischen Schnupfens siehe bei Ozaena.

458. Menthol. 1·0,
Chloroform 10·0.
S. 4–6 Tropf. auf die Handfläche zu giessen, mit d. anderen Handfl. zu verreiben und durch Nase und Mund einzuathmen.
(Mehrere Male zu wiederholen.)

459. Acid. carbol.
Liq. ammon. caust. aa. 5·0,
Spirit. vin. 15·0,
Aq. dest. 10·0.
S. Ein Schwamm hiemit zu tränken u. in einer Düte mehrere Min. lang unter d. Nase zu halt.

460. Salol 1·0,
Acid. salicyl. 0·2,
Tannin 0·1,
Acid. boric. 4·0.
S. Schnupfpulver (stündlich, aber nicht länger als einen halben Tag anzuwenden).

461. Cocain. hydrochlor. 1·0,
Camphor. 4·0,
Bismuth. subnitr. 30·0.
S. Schnupfpulver.

Gegen die übermässige Secretion nach Nachlass der entzündlichen Erscheinungen:

462. Natr. bicarb.,
Natr. salicyl.,
Natr. chlorat. aa. 10·0.
S. Eine Messerspitze voll in 1 Glas warmen Wasser zur Nasenspülung (mit d. Nasenschiffchen).

Coxitis, Hüftgelenksentzündung.

Allgemeinbehandlung. Roborir. Diät, Jodbäder, Steinsalzbäder. Innerlich Jod, Eisen, Leberthran. Stellungsverbesserung der Extremität eventuell in der Narkose; Immobilisirung der Hüfte durch starren Verband; permanente Gewichtsextension (Crosby), locale Kälteapplication. Später Taylor'scher Apparat. Bei Spontanluxation des Femur auf die hintere Darmbeinfläche Reduction und Immobilisirung in der Narkose.

463. Jodi puri 0·03—0·05,
Kali hydrojodici 1·0,
Aq. font. 80·0,
Syr. s. 20·0.
S. 3mal täglich 1 Kinderlöffel zu nehmen.

464. Ferr. jodat. sacchar. 1·0,
Pulv. rad. rhei chin. 0·4,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Croup vide: Diphtheria pharyngis et laryngis.

Cystitis, Blasencatarrh.

Bettruhe, warme Umschläge, wohl auch aromatische Cataplasmen auf den Unterleib, warme Bäder, besond. Sitzbäder. Gegen das Fieber Chinin; bei Frostanfällen warme aromat. Getränke (Lindenblüthenthee, leichter russischer Thee), bei heftigen Schmerzen im Perineum und Mastdarm Blutegel; gegen Harndrang Narcotica innerlich in Suppositorien oder Klystieren. Beseitigung von Injectionsmitteln bei nach Trip entstandenem Blasencatarrh. meiden reizender Nahrungs- und Getränke. Sorge für

gang. Z. Getränk Milch, Mandelmilch, Application des weichen Katheters im Bedarfsfalle und Injectionen in die Blase bei chronischen Fällen. Carlsbad, Marienbad, Wildungen. — Mineralwässer: Salvator, Giesshübler, Preblauer, Franzensbader Nataliequelle, Sauerbrunn Klösterle, Krondorfer Sauerbrunn, Radeiner Wasser. Prophylact.: Vorsicht bei Tripperbehandlung und Antisepsis bei Katheterismus.

465. Decoct. sem. Lini e 10·0 ad 200·0,
Tinct. Laud. simpl. gtts. 15,
Aq. Lauroc. 10·0.
Syr. Diacod. 20·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

466. Aq. Calcis 100·0.
S. Je 1/3 in 1 Glas warmer Milch 3mal täglich.

467. Mixt. gummos. 200·0,
Tinct. Laud. spl. gtts. 15,
Aq. Lauroc. 10·0.
S. Stündl. 1 Esslöffel.

468. Herb. herniar.,
Fol. uvae ursi aa. 20·0.
S. Thee.

469. Lupulini 0·20,
Morph. muriat. 0·05,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

Bei intensiven Schmerzen und Harndrang:

470. Morph. mur. 0·05,
Butyr. Cacao q. s.
u. f. l. a. suppos. Nr. 3.
S. Abends 1—2 Stück anzuwenden.

471. Cocaini mur. 0·10.
Butyr. Cacao q. s.
u. f. l. a. suppos. Nr. 3—5.
S. Stuhlzäpfchen.

472. Tannini pur. 1·0,
Camphorae rasae 0·50,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh, Mittags u. Abends 1 Pulver.

Wenn Opiate oder Tannin nicht vertragen werden:

473. Extr. cann. Ind.,
Extr. Hyosc. aa. 0·30,
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10
S. Alle 3 Stunden 1 Pulv.

Bei hochgradiger Cystitis:

474. Natr. salicyl. 10·0.
Div. in dos. = 10.
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 P. (in Oblaten oder Wasser).

475. Salol. (oder Alphol.) 10·0.
Div. in dos. X.
DS. Tägl. 2—4 Pulv. zu n.

Bei gonorrhoischer Cystitis Weglassen der Injectionen, innerlich:

476. Ol. ligni Santali gtts. 10.
Exhibe in caps. gelat.
D. tal dos. 30.
S. 3mal tägl. je 2 Kapseln.

477. Balsam. copaivae,
Ol. terebinth. aa. 5·0,
Magn. carb. q. s. u. f. pill. Nr. 50,
S. 2mal tägl. je 3—4 Pillen.

In chronischen Fällen (und nur bei diesen, niemals bei acuter Cystitis) nebst vollständiger Entleerung des Harns mittelst Katheters medicamentöse Injectionen anzuwenden:

478. Zinc. sulf.,
Alum. crud. pulv.,
Ac. carbol. aa. 0·50,
Aq. dest. 500·0.
S. Zu Injectionen.

479. Acid. borici 3·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Injectionen.

480. Kal. hypermang. 0·15 bis 0·20.
Aq. dest. 200·0.
S. Wie oben.

481. Pyoctanin. caerul. 1·0 od. Antinosin 0·5—1·0.
Aq. dest. 500·0.
S. Zur Blasenausspülu

Bei Cystitis purulenta:

482. Arg. nitr. cr. 0·20 bis 0·40,
Aq. dest. 400·0.
S. Zu Inj. ($^1/_{20}$ *bis* $^1/_{10}$%).
483. Resorcini 3—5·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Wie das Vorige.

In hartnäckig. Fällen kräftigere Adstringentia: Kal. hypermang. 0·1 : 100, Alaun 1—2%, Sulf. Zinci 0·3 : 100 etc.

Bei chronischem Catarrh des Blasenhalses Localbehandl. Inject. mittelst des Ultzmann'schen Irrigationskatheters oder Behandl. mittelst Supposit., welche mit Hilfe des Dittel'schen Porteremède eingeführt werden.

Darmblutung.

Prophylactisch bei Duodenal- und typhösen Geschwüren diätetische Massnahmen, reizlose Kost, Milchdiät. Bei Constatirung von Anchylostomumeiern im Stuhle Anthelmintica und Abführmittel (vide Anchylost. duodenale). Deckmittel, Ruhigstellung des Darmes mit Opiumpräparaten. Kälteapplication auf den Bauch. Excitantien (vide Collaps).

484. Magist. bismuth. 12·0.
Div. in dos. = 12.
S. 3stündlich 1 Pulver.
485. Carb. pulv. 6·0.
Div. in dos. = 6.
S. 2stündlich 1 Pulver.
486. Calcii carbon. 6·0.
Div. in dos. = 12.
S. 2stündlich 1 Pulver.
487. Tannin. p. 0·6.
Opii pur. p. 0·12.
Elaeosacch. menth. p. 6·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3stündlich 1 Pulver.
488. Alum. cr. 2·0,
Opii p. 0·15,
Sacch. alb. 5·0,
Div. in dos. = 6.
S. 3stündlich 1 Pulver.
489. Extr. secal. corn. 1·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. rub. id. 20·0.
S. Stündl. 1 Esslöffel zu n.
490. Ergotin (Bombelon) 10·0.
S. $^1/_2$*—1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Decubitus.

Bei beginn. Röthung Waschung m. Essigwasser, Franzbranntwein, Einreiben mit Citronenscheiben u. Applicat. von Pflaster. Sorgfältige Reinigung und Schutzverb., wenn bereits Substanzverl. gesetzt sind

491. Empl. sapon. 30·0,
Tend. supr. lint.
S. Pflaster.
492. Empl. Cerussae 15·0.
S. Auf Leder zu streichen.
493. Jodoform p. 1·0,
Lanolin 10·0,
Vaselin 20·0.
S. Salbe.
494. Calcar. chlorat. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Waschungen.
495. Kal. hyp. (od. Ac. carb.) 1·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Waschungen.

Bei tiefen Substanzverlusten mit Gangränescenz nach der Fläche oder Tiefe:

496. Picis liquidae 5·0,
Calcar. sulf. 40·0,
M. f. pulv.
S. Streupulver.
497. Acid. carbol. 5·0.
Ol. olivar. 50·0.
S. Aeusserlich.
498. Acid. tannici 1·0,
Plumb. acet. bas. sol. 5·0,
Ung. simpl. 20·0.
S. Salbe.

Nach erfolgter Reinigung der Fläche Argent. nitr.-Salbe.

Defluvium capillorum.

Behandlung des ursächlichen Leidens; daher Mittel gegen

borrhoe, Syphilis etc. Bei letzterer Krankheit local weisse Präcipitat-Salbe.

499. Liq. ammon. caust.,
Ol. amygd. dulc.,
Chloroformi aa. 10·0,
Spir. vini 50·0.
S. Waschmittel (nachdem d. Haare mit einer Bürste gut abgerieben, anzuwenden).

500. Ol. Macidis 5·0,
Ol. olivar. 50·0.
S. 2mal tägl. einzureiben.

501. M. praec. alb. 2·0,
Vaselini 20·0.
S. Pomade.

502. Resorcini pur. 5·0,
Ol. Ricini 45·0,
Spir. vin. 150·0,
Bals. Peruv. 0·50.
S. Mit Flanellappen tägl. auf die Kopfhaut einzureiben.

503. Tinct. Cantharid. 10·0,
Spirit. Rosmarin. 100·0.
S. Zum Einreiben.

504. Captol.
Acid. tartar.
Resorcin aa. 1·0.
Acid. salicyl. 0·7,
Ol. ricini 0·5,
Spirit. (65%) 100·0,
Essent. flor. aeth. q. s
S. Aeusserl. (Tägl. 1—2mal mit der Hand oder einem Schwämmchen auf d. Kopfhaut aufzutragen und dann mit der Hand trocken zu verreiben. — Zu prophylactischen Zwecken. Eichhoff.)

505. Captol.
Acid. tartar. aa. 1·0—2·0,
Lanolin. 5·0.
Vaselin. 90·0.
S. Pomade. (Abends auf die Kopfhaut zu reiben, der Kopf mit einer Mütze aus Wachstuch zu bedecken, am Morgen mit Seife abzuwaschen. — Für verzweifelte Fälle. Eichhoff.)

Siehe a. Alopecia, Seborrhoea.

Delirium tremens potatorum.

vide: Alkoholismus.

Diabetes mellitus, Zuckerharnruhr.

Regelung der Diät. Ausschliesslich Fleischkost; Vermeidung der Mehl oder Zucker enthaltenden Nahrungsm.; kein Bier etc., keine Gewürze. Zu Kaffee, Thee etc. statt des Zuckers Saccharin. Mit d. Entziehung der Amylaceen ist entschieden in dem Momente aufzuhören, als d. Harnuntersuchung Acetessigsäure oder Albumen ergibt. Methodische Ausbildung und Kräftigung der Musculatur; systematische Cur in Karlsbad; Giesshübler, Salvator, Krondorfer, mineral. Säuren und Verdauung fördernde Medicamente, versuchsweise absolute Milch- oder rein vegetarische Diät.

506. Opii pur. 1·0.
Natr. bicarb. 10·0,
Div. in dos. = 20.
S. 4—5 Pulver täglich zu nehmen.

507. Natr. salicyl. 5·0,
Aq. dest. 150·0.
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

508. Exalgin. 2·0,
Alcohol. Menthi 15·0,
Aq. dest. 200·0,
Syr. simpl. 30·0.
S. Früh u. Abends 1 Esslöffel zu nehmen.

509. Jambul. 0·3.
Dent. tal. dos. Nr. XII.
S. 3 Pulver täglich.

Bei drohendem Coma od. wenn dasselbe bereits eingetreten, Reizmittel (Aether, Campher), kühle Uebergiessungen im lauen Bade.

Stadelmann empfiehlt, zumal im letzteren Falle, Alkalien in grösseren Mengen:

510. Acid. citric. 15·0,
Natr. carbon. 40·0,
Saccharin. 0·3,
Aq. dest. 300·0,
Spirit. Menth. pip. gtts. 6.
S. Binnen 24 Stunden zu verbrauchen.

511. Natrii acet. 30·0,
Aq. carbon. 270·9,
Saccharini 0·3,
Essent. citri 7·0.
S. Wie oben.

Ist Coma eingetreten, so empfiehlt sich rasche intravenöse oder subcutane Injection von

512. Chlornatrii 14·0,
Aq. dest. 2000·0,
Natr. carbon. 10·0.
S. Die Hälfte auf 37° C. erwärmt zu injiciren.

Die Injection ist eventuell zu wiederholen, bis der Harn alkalisch reagirt. — Gleichzeitig ist ein Abführmittel (Ol. ricini) zu reichen.

Diarrhoe vide: Catarrhus intestinalis.

Diathesis urica.

Regelung der Lebensweise, namentlich Beschrank. u. Präcisir. des Quantums der Nahrung; gemischte Kost oder vegetarische Diät, vornehmlich wenig Fleisch, keine schwarzen Fleischsorten, keine Säuren, Obst, wenig oder keine geistigen Getränke. Sorge f. tägl. Stuhlentleerung, Proceduren, welche die Muskelkraft erhöhen u. den Lymphstrom beschleunigen (methodische körperl. Bewegungen, Heilgymnastik, allgemeine Körpermassage, kalte Abreibungen). Trinkcuren mit Alkalien (Gieshübler, Radein., Franzensbader Nataliequelle, Sauerbrunn Klösterle, Salvator). Salicylsaures Natron (3–4 Grm. pro die) empfohl. Gegen die Schmerzen Narcotica. Karlsbad, Marienbad, Pistyán, Baden bei Wien, Vichy, Homburg, Kissingen, Moorbäder (Mattoni's Moorextract). Auch hydropathische Proceduren und Soolbäder empfohlen.

513. Lithii carb. 3·0,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Täglich 2 Pulver.

514. Lith. citr. 0·1.
D. tal. dos. Nr XV.
S. 3—4mal täglich 1 Pulv. in reichlich Wasser zu nehmen.

515. Piperazin 1·0,
Aq. dest. 500.
S. Tagsüber zu nehmen.

516. Solution. Lysidini (50%), Aq. dest. 200·0. [10·0,
in vitr. nigr.
S. 2 6 Esslöffel täglich in alkalischen Sauerlingen zu nehmen.

517. Lycetol 1·0.
D. tal. dos. Nr. X.
S. 1—2 Pulver täglich in Zuckerwasser zu nehmen (drei Wochen hindurch).

518. Uricedin Stroschein 20·0,
Div. in dos. XX.
S. 1—2 Pulver täglich in Wasser.

519. Urotropin 1·0—1·5.
D. tal. dos. Nr. X.
S. Morgens 1 Pulver in Wasser gelöst zu nehmen (Nicolaier).

520. Phenocoll. mur. 10·0.
Div. in dos. X.
S. 1 Pulver täglich.

521. Acid. benzoic. 1·0.
Natr. phosphor. cryst. 8·0,
Aq. dest. 120·0,
Syrup. simpl. 30·0.
S. Tagsüber auf 4mal zu nehmen.

522. Tinct. Colchici 10·0.
S. Früh, Mittags u. Abe ie 10 Tropfen.

523. Vini Colchici 15·0.
Kali jodat. 2·0.
S. 3mal tägl. 10—15 Tropf.

Poehl empfiehlt subcutane Injectionen seines Spermin. (Anfangs tägl. 1—2 Pravaz'sche Spritzen einer 2%igen Lösung, später in grösseren oder kleineren Intervallen je nach dem Verlauf des Falles.)

Bei gleichzeitiger Albuminurie:

524. Extr. stigmat. maidis 6·0.
Natr. benzoic.,
Lithii carbon. aa. 3·0,
Ol. anis. gtt. 2.
F. pill. Nr. 60.
S. 2 Pillen vor jeder Mahlzeit während 20 Tagen jedes Monates.

Bei acutem Gichtanfall Bettruhe, Fieberdiät, Sorge für Stuhlentleerung, Hochlagerung der schmerzhaften Extremität.

Einreibungen mit:

525. Kalii jod. 1·0,
Jodi pur. 0·10,
Vaselin. 20·0.
526. Natr. sulfoichthyolic., Lanolin aa. 15·0.
S. Salbe.
527. Natr. salicyl. 6·0,
D. in dos. = 6.
S. 3 Pulv. täglich.
528. Extr. Belladonn. 2·0,
Adip. Suill. 20·0.
S. Salbe.
529. Ichthyol. 3·0,
Vaselin. 30·0.
S. Salbe.

Dilatatio ventriculi, Magenerweiterung.

Berücksichtigung der Ursache (Stenose des Pylorus, Atonie der Magenwände bei Neurasthenie, b. Trinkern.) Bei leichten Formen genügt eine Diätcur: kleine, häufige Mahlzeit., Verminderung der Flüssigkeitszufuhr, leicht verdauliche Kost, Vermeidung gewürzter, stark gesalzen. Speisen, Vermeidung von kohlensäurehaltigen Wässern und hier. Ruhe nach dem Essen; kleine Eisstückchen od. Eismilch. Hydrotherapie. Karlsbader Wasser.

Bei höheren Graden method. Magenausspülungen. Meidung vieler Flüssigkeiten, wiewohl vor dem Pumpen der Durst gestillt werden kann. Ruhe nach d. Mahlzeiten; elastische Bauchbinde. Als Nachcur Karlsbad, Kaltwassercur mit gleichzeitiger Massage. Symptomat. Behandlung vgl. Cat. ventr. chr.

Diphtheria pharyngis et laryngis, Rachen- und Kehlkopfdiphtherie.

Isolirung des Kranken. Desinfection d. Krankenzimmers. Heilserumtherapie. Wiener Serum (Paltauf), Höchster Serum (Behring). Subcutane Injection unter die Bauchhaut oder an der inneren Schenkelfläche mit sterilisirter (10 Ccm.) Spritze, nach vorheriger sorgfältiger Desinfection. Aseptischer Verschluss der kleinen Wunde. Kalte oder hydropathische (Priessnitz-) Umschläge. Eiscravatte. Eispillen. Gurgelwasser, Mundirrigation. Bepinselung der Membranen (am besten mittelst an einer Sonde oder Pincette wohlbefestigter Brunsscher Watte). Inhalation. Insufflation. Bei Erstickungsgefahr Intubation, Tracheotomie. Analeptica, Campher, Aether, Moschus. Wein, Cognac. Gegen das Fieber Chinin, Salicylsäure, hingegen keine das Herz tangirenden Mittel, wie Antipyrin, Phenacetin etc.

Zur localen Behandlung: Gurgelungen, resp. Irrigationen mit: Kalkwasser,

verdünntem Weingeist, Kalium chloricum (3%), Kalium permanganicum, Acidum salicyl. (½%), Hydrarg. bichlorat. (0·2‰), Borsäure (2—3%), Resorcin (1%), ferner mit:

530. Thymol 1·0,
Aq. dest.,
Spir. vini aa 100.
S. Nach Bericht.

Pinselungen. Mit möglichster Schonung des Kranken und der erkrankten Partien auszuführen. Geeignet hiezu: Sublimat (1‰), Carbolsäure (5%), Chromsäure (10%), Salicylsäure, Borsäure, alkoholische Mentholösung, Citronensäure (20%), Milchsäure (pur), Kalium permanganicum, Essig, Tinctura Myrrhae, ferner:

531. Cresol. pur. liquefact. 1·0,
Ol. Terebinth. rect. 20·0,
Spirit. vin. ad 50·0.
S. Mittelst Wattepinsels auf die Membranen zu reiben.
532. Acid. salicyl. 1·0,
Spir. vini rectif.,
Glycerini aa. 25·0,
S. Zum Bepinseln.
533. Subl. corr. 0·5,
Acid. tartar. 2·50,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Bepinseln.
534. Acid. boric. 5·0,
Glycerini puri.
Aq. dest aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln (stündl.).
535. Liquor. Natr. caust. 0·5,
Aq calc 60·0.
S. Zum Bepinseln des Pharynx.
536. Papayotini recent. 1·0,
Aq. dest. 20·0,
Acid. mur. q. s. ad react. acid. perfect.
S. (Mindestens alle halbe Stunden zu bepinseln.)
537. Resorcin. 3·0,
Glycerin. 30·0.
S. Zum Bepinseln.
538. Jodi pur. 0·4
Spirit. vini 20·0,
Chloroform. 2·0.
S. Zum Bepinseln.

Inhalationen: Heisse Wasserdämpfe, Aq. calcis, Sublimat (2‰), Carbolsäure (1%), Kalium chloric. (2%), Terpentinöl, ferner:

539. Liqu. natr. caust. 2·0,
Aq. calc. 25·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zur Inhalation.

Insufflationen:

540. Jodoform. pulv.,
Sacch. Lactis aa. 5·0.
S. Zur Insufflation
541. Natr. sozojodol. 3·0,
Flor. sulf. 3·0—6·0,
Sacch. pulv. 1·0.
S Zur Insufflation.

Aetzungen mit Resorcin in Krystallform, Argent. nitr. fus. Salicylsäure in Substanz.

Zur Allgemeinbehandlung:

542. Pilocarpin. mur. 0·03,
Pepsini 0·7,
Aq. dest. 80·0,
Acid. mur. guttas duas.
S. Stündlich 1 Kaffeelöffel.
543. Pilocarpin. mur. 0·1—0·2,
Aq. dest. 10·0.
S. Injection.

Bei Anwendung des Pilocarpin grosse Vorsicht wegen Collaps. Mit jeder Dosis 1 Thee-, resp. Esslöffel Weines zu geben.

544. Ol. Terebinth.,
Sacch. alb.,
Gummi arab. aa. 5·0.
Aq. dest. 120·0.
S. 3stündl. 1 Kaffeelöffel.
545. Tr. ferri chlorat. aeth. 5·0,
Aq. menth. pip.,
Syr. simpl. aa 30·0.
S. 2stündl. 1 Theelöffel voll.
546. Kali chlorici 1·0—2·0,
Aq. dest. 180·0,
Syr. rub. id. 20·0.
S. 2stündl. 1 Kinderlö

547. Natr. salicyl. 1—3·0,
Aq. dest. 80·0.
Syr. aurant. 20·0.
D.S. 2stündl 1 Esslöffel.
Im Bedarfsfalle (bei Laryngitis crouposa) ein Brechmittel:
548. Vin. stibiat. 15·0.
S. Alle 10 Min. 1 Theelöffel voll bis Erbrechen erfolgt.
549. Apomorphin. hydrochl. 0·1,
Aq. dest 10·0.
S. Zur subcutanen Injection. (Bei Kindern 1/4, bei Erwachsenen 1/2—1 Spritze.)
Bei hohem Fieber:
550. Chinin hydrochl. 0·3—1·0,
Aq. dest.
Syrup. rub. id. aa. 15·0.
S. Halbstündl. 1 Kinderlöff.
Bei secundären Paralysen Versuch mit subcutan. Strycninjectionen (tägl. 0·001 Strychnin. sulf. in die Nackengegend), allgemein kräftigendes Regime, Elektricität (nicht früher als 4 Wochen nach Ablauf der Krankheit), Sool- und Seebäder.

Dysenterie. Ruhr.

Prophylactische Behandlung z. Zeit einer Ruhrepidemie; Regelung der Diät; Nahrungsmittel, welche Diarrhoen erzeugen, zu meiden, jeder Durchfall sorgfältig zu behandeln, Schutz vor Erkaltung. — Allgemeinbehandlung, besteh. in Bettruhe, strenger Diät; Ventilation, exquisite Reinlichkeit in der Umgebung d. Kranken, strenge Desinfection! Im Beginne ein Brechmittel bei im Magen noch vorhandenen Ingestis od. ein leichtes Abführmittel bei im oberen Theile des Darmes befindlich. Fäcalmassen *(Ricinusöl). Gegen den Tenesmus u. kolikartige Schmerzen:* Warme *Umschläge auf d. Bauch,* Opium *in schleimigem Vehikel,* Salep- *oder Amylumclystiere, russ.* Thee *mit etwas Rum.*

Im entzündlichen Stadium:
551. Olei Ricini 50·0.
S. 2 Esslöffel voll; wenn nach 3 Stunden nicht starke Entleerungen folgen, noch ein Esslöffel. Am 3., 5. u. 7. Tage zu wiederholen.
552. Hydrarg. chlorat. 0·1,
Sacch. pulv. 0·3,
D. tal. dos. Nr. 5.
S. 2 Pulver täglich.
553. Rad. Rhei 6·0,
Rad. Ipec. 2·0,
Inf. Aq. feroid. q. s. ad Adde [colat. 120·0
Gummi arab. 4·0,
Syr. altheae 30·0.
S. Stündl. 1 Esslöffel.
554. Ol. Croton. 0·1.
Ol. Amygdal. 15·0,
Gummi arab. 7·5,
f. cum
Aq. Menth. pip. 120·0
emulsio, cui adde
Aq. Laurocer. 6·0,
Syr. amygdal. 30·0.
S. Stündl. 1 Esslöffel (Kindern 1 Kaffeelöffel).
555. Naphthalin 0·25. [amyl.
D. tal. dos. Nr. X ad caps.
S. 4stündlich 1 Pulver.
556. Acid. salicyl. 3·0,
Aq. dest. 1000·0.
D. S. Zur Mastdarmirrigat.

Bei hartnäckig. Tenesmus Stärkeklystiere m. Tinct. opii (10 Tropf. auf 1 Klystier) oder:
557. Extr. Belladonn. 0·25,
Ol. Cacao 15·0,
M. f. supposit. Nr. IV.
S. Stuhlzäpfchen.

Im diarrhoischen Stadium:
558. Ol. Amygdal. dulc. 15 0,
Gummi arab. 8·0,
Aq. dest. 200·0,
f. l. a. emulsio, cui add
Aq. Amygdal. amar. 4·0
Syr. simpl. 30·0.
S. 1—2stündlich 1 Esslö

559. Naphtalin. 5·0 (Naphtol. 5·0),
Ol. olivar. 20·0.
S. Zum Klysma. (Anfangs 3—4 Klysmen in 24 Stunden.)

560. Argent. nitr. 0·1,
Aq. dest. 200·0,
Aq. Lauroceras. 6·0,
Dtr. ad vitr. nigr.
S. 4mal tägl. 1 Esslöffel.

561. Extr. Strychnin. aquos. 0·1,
Aq. Cinnam. simpl. 150·0
Mucilago Gummi arab.,
Syr. simpl. aa. 30·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Auch Cantani's Enteroklyse (s. Nr. 336) empfohlen.

Dysmenorrhoe, Menstruationsbeschwerden.

Ermittelung d. Causalmomentes (mechanische Ursachen, ferner ob uterinal oder ovariell); Vermeidung v. Anstrengung u. Erkältung zur Zeit der Menses, Sorge für regelmässigen Stuhl; warme Umschläge auf den Unterleib, warme Irrigationen; Moorbäder (Mattoni's Moorextract), Darkauer Jodsalz, Ruhe, krampfstillende Mittel; Narcotica; Suppositorien mit Opium, Belladonna. Spirituosa, Fussbäder; bei der sogenannten congestiven Dysmenorrhoe örtliche Blutentziehung durch Blutegel oder tiefe Scarification an der Portio. Elektricität.

562. Aq. lauroc. 10·0.
Morphii muriat. 0·10.
S. Stündl. je 10 Tropfen auf Zucker.

563. Codeïn. p. 0·10,
Sacch. lact. 2·0.
M. f. p. dic. in dos. = 5.
S. 3mal täglich 1 Pulver.

564. Extr. cann. ind. 0·20.
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Alle 3 St. 1 Pulver.

565. Extr. Hydrast. fluid.
Vini Malacens. aa. 20·0,
Syr. cinnamom. 10·0.
S. 2—4stündl. 1 Theelöffel.

566. Tinct. Castorei canadens.
Tct. sem. Strychni aa. 50·0.
S. 4mal tägl. 20 Tropfen.
(8 Tage vor Eintritt der Menses zu beginnen und bis zum Ablaufe derselben fortzufahren, Litzmann.)

567. Tinct. Thebaic.
Tinct. Belladonn.
Tinct. Hyoscyam.
Tinct. Valerian.
Tinct. Strammon. aa. 20·0.
S. 3—4mal tägl. 20 Trpf.
(Fritsch.)

568. Kali bromat.
Antipyrin aa. 5·0,
solve in
Aq. dest. 60·0,
adde [10·0,
Extr. viburn prunifol. fluid.
Spirit. vin. Cognac. [15·0.
Syrup. cort. aurant. aa.
S. 2—4 Esslöffel tägl.

569. Extr. secal. corn. 0·10.
Sacch. alb. 3·0,
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Tagsüber zu verbrauchen.

570. Chloroform. 0·5,
Camphor. trit. 0·25,
Aether.,
Tinct. Myrrhae aa. 0·15,
Mucilag. Gum. arab. 1·0,
Aqu. dest. 50·0,
S. 1/4stündl. esslöffelweise.

Bei gleichzeitigen Neuralgien:

571. Chinin. salicylic. 1·0,
Solanin 0·15.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3mal tägl. 1 Pulv.

Dyspepsie, Verdauungsstörung.

Beseitigung des ursächliche Momentes: Regelung der Leber weise, besonders bei Anämisch gute Ammenmilch bei schw

lichen oder künstlich ernährten Kindern; Regelung der Nahrung dadurch, dass man das Kind in entsprechenden Zwischenräumen (jede 2. oder 3. Stunde) und nicht zu viel trinken lasse. Im Falle der Nothwendigkeit künstlicher Ernährung zweckmässige Surrogate: Kuhmilch m. Haferschleim, Kalbsbrühe oder Gelatinelösung 10·0 auf ½ Lit. Wasser, Eiweisswasser, 1 Hühnereiweiss auf ½ Liter gekochtes Wasser. Sorgfältige Reinhaltung der Aftergegend (vide Intertrigo, Ekzem).

572. *Natr. bicarb. 0·50,*
Aq. dest. 50·0.
Syr. simpl. 10·0.
S. Jede 3. Stunde 1 Kinderlöffel (vor der Nahrung).

573. *Extr. Cascar. 0·10,*
Pulv. rad. Rhei ch. 0·05,
Succh. alb. 2·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh, Mittags und Abends 1 Pulver.

574. *Tinct. Cascarillae,*
Tinct. Rutanh. aa. gtts. 20
Elaeosacch. Mac.
Sacch. Lactis aa. 5·0.
M. f. p. S. Messerspitzw.

575. *Pepsini germ. 0·10,*
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Vor jeder zweiten Mahlzeit 1 Pulver zu nehmen.

Gleich darauf zu nehmen:

576. *Ac. mur. dil. gtts. 10,*
Aq. dest. 150·0.
Syr. simpl. 10·0.
S. Kaffeelöffelweise.

Enthält der Magensaft einen Ueberschuss an Säure, so ist *Natr. bicarb.* indicirt; nur im entgegengesetzten Falle ist Salzsäure zu verordnen.

577. *Resorcin 0·3—0·5.*
D. tal. dos. Nr. 10.
S. 3—4mal tägl. 1 Pulver nach dem Essen.

578. *Extr. chinae Nanning. 30·0.*
S. 3mal tägl. 15—20 Tropf. in Portwein. (Bei Kindern als Corrigens Syrup. cort aurant.

579. *Magnes. ust. 15·0,*
Bismuth. carbon.,
Natr. carbon. aa. 5·0,
Extr. Belladonnae 0·1—0·2,
Extr. Strychni aquos. 0·1.
S. 3mal tägl. 1 Theelöffel nach dem Essen. (Bei Hyperdität und Schmerz. Boas.)

Bei Fettsäuregährung der Erwachsenen:

580. *Natr. sulicyl. 2·0.*
Natr. bicarb. 10·0.
S. Messerspitzw. nach dem Essen.

Vide auch Catarrhus ventriculi u. Colica flatulenta.

Bei Kindern:

581. *Orexinum tannicum 0·5.*
D. tal. dos. Nr. VI.
DS. 2 Stunden vor d. Mittag- u. Abendessen je 1 Pulv. zu n.

Dysphagie, Schluckweh.

Behandlung d. causal Leidens (Angina, Hypertrophie der Tonsillen, Tonsiliarabscess, Kehlkopfgeschwüre, Affectionen des Oesophagus, Hysterie etc.).

582. *Mixtura gummos. 150·0,*
Morph. mur. 0·05.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

583. *Cocain. hydrochlor. 0·005.*
Menthol. 0·01.
Succh. q. s. ut f. Tabula.
S. Mehrmals täglich nach Bedarf eine Tablette z. nehm.

Dyspnoe.

Ermittelung der Ursache und Berücksichtig. des Grundleidens. Sauerstoffinhalationen. Besonders bei Emphysem Quebracho sehr gerühmt.

584. *Tinct. Quebracho 30·0.*
S. Mehrmals tägl. 1 Kaffeelöffel voll.

585. Extr. strammon. 0·10,
Tct. digital. 4·0
Aq. Valerian. 30·0.
S. Im Anfalle kaffeelöffelweise zu nehmen.
586. Tct. Lobel. inflat. 15·0,
Tct. opii benzoic. 30·0.
S. 30 Tropfen in Zuckerwasser zu nehmen.
587. Solut. Oxycumpher. (50%) 10·0,
Spirit vin. 20·0,
Sucr. liquirit. 10·0,
Aq. dest. ad 150·0.
DS. 3mal tägl. 1 Esslöffel.

Bei Insufficienz des Herzens:

588. Inf. fol. digit e 0·5 ad 150·0,
Syr. cort. aurant. 20·0,
Tinct Strophant.,
Aq. laurocer. aa. 10·0.
S. 3mal tägl. 10—15 Tpf.

Siehe auch Asthma bronchiale.

Eclampsia gravidarum et parturientium, Eclampsie Schwangerer und Gebärender.

Prophylaktisch Schutz vor Erkältungen und Durchnässungen; bei constatirter Nephritis besonders diaphoretische Proceduren mit heissen Bädern u. Einpackungen zu empfehlen. Reichlicher Milchgenuss. Bei Prodromalerscheinungen der E. Bettruhe, Eisblase auf den Kopf, Narcoticum (Morphininjection od. Chloralklysma). Während d. Anfalles am besten vollkommene Narkose (Klystiere mit Chloralhydrat, Morphininjectionen, Chloroforminhalationen). Schutz d. Zunge vor Bisswunden. Einleitung d. künstl. *Frühgeburt nur in extremen* Fällen. *In schweren Fällen* Venaesection *als indicatio vitalis.* Wenn die *Geburt schon im Gange ist, schonend zu beschleunigen.*

589. Salis Seignetti 20·0,
Aq. dest. 150·0.
Syr. mannat. 20·0.
S. 1/4stündlich 1 Esslöffel.
(Abführmittel.)
590. Chloroform. 50·0.
S. Zu Handen des Arztes.
591. Chloral. hydr. 2·0,
Mixt. gummos. 100·0.
S. Für ein Klysma. (Zu wiederholen, wenn die Kranke wieder unruhig wird.)
592. Amyleni nitros. 5·0,
Olei Foeniculi 10·0.
S. 2—5 Tropfen auf ein Taschentuch zum Einathmen (Amylnitrit).
593. Morphi mur. 0·10,
Aq. Laurocer. 10·0.
S. jede 1/2 St. 15 Tropfen.
594. Laudani pur. 0·20,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Jede 1/2 Stunde 1 Pulver.
595. Tinct. Laud. simpl. 10·0.
S. 20 Tropfen zu 1 Klystier (jede Stunde zu appliciren).

Eclampsia infantum, Fraisen.

Berücksichtigung der Causal-Indication (Gehirnkrankheiten, Magen-, Darmcatarrh, Stuhlverstopfung, Diarrhoe, Darmparasiten, Fieber, Prodrome acuter Exantheme etc.); während des Anfalles kalte Abreibungen, kalte Umschläge, warmes Bad mit kalten Uebergiessungen d. Kopfes; Klysma mit Essig und Wasser zu gleichen Theilen. Beachtung der Hyperaemia (4—5 Blutegel an die Schläfen) und Anaemia cerebri (Aether subcutan). In anfallfreier Zeit ist für grösste Ruhe zu sorgen; Fisen, Chinin u. dgl. verordnen.

596. Chloral. hydr. 0·25
Aq. dest. 50·0.
S. Zum Klysma.

597. Chlorali hydr. 0·5—1·0,
Ammon. brom. 1·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. simpl. 20·0.
S. ½stündl. 1 Kinderlöffel.

Bei trägem Stuhlgang:

598. Calomelanos 0·50,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Stündlich 1 Pulver.

Bei wiederholten Anfällen:

599. Kali bromat. 2·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. rub. id. 20·0.
S. Stündl. 1 Kinderlöffel.

600. Kal. bromat. 2·0,
Ammon. bromat. 1·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. simpl. 30·0.
S. 3—4mal tägl. 1 Kinder- bis Esslöffel voll zu nehmen.

601. Atropin. sulf. 0·01.
Acid. sulf. dil. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. 1—3mal tägl. 10 Trpf.

602. Chloroform 10·0.
S. Z. Einathmen. (Vorsicht!)

Bei drohendem Collaps:

603. Moschi 0·30,
Mixt. gummos. 60·0.
S. ¼—½stündl. 1 Kinderl.

Ekthyma, Eiterblase vide: Impetigo.

Ekzema, nässende Flechte.

Entfernung der Borken nach Befettung derselben mit Leberthran, Ung. simpl. od. Mandelöl; Anwendung einer Salbe; erst später, und zwar nur im geeigneten Zeitpunkte Schmierseife u. Theer. Passender Verband. Hervorzuheben Unna's Salbenmullverbände. — *Bei acuten Ekzemen Bepinseln mit 2%iger Cocainlösung; weder Waschungen noch Bäder; bei heftiger Entzündung Eiwasserumschl., Amylumeinstäubung; bei chronischem und* recidivirendem Ekz. Berücksichtigung des Allgemeinzustandes.

604. Ung. Diachyli 50·0.
S. Salbe (messerrückendick auf Leinwand gestrichen, 2mal täglich aufzulegen).

605. Empl. Diach. simpl.,
Vaselini aa. 50·0,
Ol. Bergamotti 1·0.
S. Salbe. (Ung. Vaselin. plumbic.)

606. Thilanin 50·0.
S. Salbe.

607. Epicarin. 10·0.
Unguent. simpl. 100·0.

608. Epicarin. 10·0,
Ol. vaselin. 100·0.

609. Boracis venetae 5·0,
Lanolin. p. 30·0,
Vaselin. 20·0.
S. Salbe.

610. Plumb. carbon. 5·0,
Ung. emoll. 50·0.
S. Salbe.

611. Ung. Plumb. ac. 50·0.
S. Salbe.

612. Ung. Cerussae 50·0.
S. Salbe.

613. Zinc. oxydat. 5·0,
Benzoës pulv. 1·0,
Axung. Porc. 30·0.
S. Salbe. (Ung. Wilsoni.)

614. Acid. borici 10·0,
Lanolini puriss. 40·0.
S. Salbe.

615. Ac. salicyl. 10·0,
Gelatinae alb. 50·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Gelatinverb. (ein Theil in einer in warmes Wasser gestellt. Schale zu zerschmelzen u. dünn aufzustr.) Ebenso and. Medicam. in beliebig. Percentverhältniss.

616. Oxyd. Zinci 10·0,
Gelatin. anglican.
Glycerin. aa. 20·0,
Aq. dest. 40·0,
M. exact. f. gelatin.
S. Gelatinverband. (Unna's Zink-Gelatin wie oben.)

617. Naphtoli 1·0.
Lactis sulf. 5·0.
Spir. sapon. kal. 20·0.
Alcoholis dil. 100·0.
Glycerini 5·0
S. Zum Einreiben (bei torp. chron. Ekzemen).
Ebenso:
618. Losophan 1·0—2·0.
Spiritus 100·0.
S. Zum Einpinseln.
619. Lithargyri 10·0.
Coq. c. Aceti 30·0.
Ad reman. 20·0.
Ol olivar.
Adipis aa. 10·0.
Ichthyoli 10·0.
M. f. Ung. S. Salbe (Unna's Ichthyolsalbe).
620. Amm. sulfoichthyol. 1–3·0.
Aq. dest.,
Glycerini pur.,
Dextrini aa. 10·0.
M. leni calore. S. Paste.
621. Nosophen 1·0.
Vaselin. 10·0. [moll.
Ol. Paraffin. q. s. f. ung.
S. Salbe (Ekzem des Nasen einganges).
622. Dermatol (od. Nosophen).
Zinci oxyd. alb. aa. 2·0.
Vaselini flav. 20·0.
S. Salbe.
623. Dermatol 2·0.
Zinci oxyd. alb.,
Amyl. aa. 24·0.
Vaselini flav. 50·0.
M. f. Pasta.
624. Dermatol.
Zinci oxyd. alb. aa. 5·0.
Gelatin.
Glycerin.
Aq dest. aa. 30·0.
M. f. Gelatine.
625. Tumenoli 5·0.
Flor. Zinci,
Bismuth. subnitr. aa. 2·5.
Ung. lenit.,
Ung. simpl. aa. 25·0.
S. Salbe (b. näss Formen, Neisser).
626. Alumnol 10·0.
Lanolin. 50·0.
Paraffin. liquid. 35·0.
Ceresin 5·0.
S. Salbe.
627. Cutoli 4·0—8·0.
Ol. olivar. 10·0.
Lanolin ad 40·0.
S. Salbe (bei nässendem acutem Ekzem, besonders des Gesichtes, der Kopfhaut und der Ohren bei Kindern).
628. Bismuth. loretinic. 3·0.
Lanolin. 30·0.
f. ungt.
S. Salbe.
629. Extract. Myrtilli 50·0.
S. Mit einem Haarpinsel dick aufzutragen. (Winternitz.)
630. Lenigallol.
Lanolin. aa 100·0.
DS. Aeusserlich.
Bei chron. Ekzem der Hände und Füsse Einwickelung mit obigem Pflaster, Kautschukhandschuhe oder Fingerlinge, Seifenwaschungen, Hand-, resp. Fussbäder mit:
631. Kal. caustic. 25·0.
Aq. font. 500·0.
S. Zusatz zu 5 Bädern.
In Fällen acuten Ekzems, wo die Haut keinerlei Salben verträgt, Umschläge oder Amyluméinstreuungen.
632. Amyl. trit. 50·0.
S. Streupulver.
633. Amyli Oryzae 40·0.
Pulv. alum. plum. 10·0.
Pulv. r. Iridis fl. 2·0.
S. Streupulver.
634. Oxydi Zinci.
Cerussae aa 2·50.
Pulv. Talci ven. 50·0.
S. Streupulver.
635. Xeroform 5·0.
S. Streupulver. (Bei Conjunctivitis eczematosa.)

636. Acid. salicyl. 1·0,
Tinct. Benzoës 2·0,
Vaselini 50·0.
S. Salbe.

637. Zinci oxydat. 50·0,
Acid. salicyl. 2·0.
Amyl. oryz.,
Glycerini aa. 15·0,
Aquae dest. 75·0,
Coq. ad 140·0.
S. Kleisterpasta.

Gegen das heftige Jucken:

Eintupfen mit Spir. vini Gall. u. darauf folgende Bestreuung mit Streupulver. Auch:

638. Acid. carbolici,
Glycerini puri
Bals. Peruviani aa. 1·0,
Spir. vini 200·0.
S. Zum Einreiben.

639. Olei fusci 20·0,
Spir. saponat. 50·0,
Glycerin. 10·0.
S. Aeusserlich.

640. Ol. Cadini 10·0,
Glycerini 50·0.
S. Zum Einreiben.

641. Picis liq.,
Sapon. virid.
Spiritus aa. 20·0.
S. Zum Einreiben.

642. Naftalan 50·0.
S. Messerrückendick aufzutragen, die bestrichen. Stellen mit Watte oder Leinwand gut abzuschliessen.

643. Gallanol 1·0.
Traumaticin 10·0.
S. Zum Einpinseln.

Bei intensiver Entzündung der Haut mit starken Schmerzen kalte Umschläge, Umschläge mit:

644. Plumb. acet. 7·0,
Alum. crud. 20·0.
Aq. dest. 200·0.
S. Die Hälfte der Lösung mit 1 Liter Wasser verdünnt, zu Umschlägen.
(Liquor Burowi.)

645. Boracis 3·0,
Acid. salicyl. 0·3,
Aq. dest. 170·0,
Glycerin. 30·0.
S. Zu Waschungen.

646. Amyl. trit. 50·0.
S. Streupulver.

647. Oxyd. Zinci,
Cerussae aa. 2·50,
Pulv. Talci venet. 50·0.
S. Streupulver.

Bei Ekzem der Kinder:

648. Resorcin. 0·6–1·0,
Glycerin. gtts. X,
Aq. Calc. 30·0,

(Bei erythematösem, mit Jucken einhergehendem Ekzem.)

Bei inveteritem Ekzem und Verdickung d. Epidermis Application von Schmierseife u. nachträglich Salbenbehandlung.

649. Epicarin 15·0.
Flor. sulf. 5·0.
Ung. Zinc. oxydat. 100·0,
Ol. Neroli gutt. m.
MDS. Zum Einreiben.

650. Papaini 1·0,
Boracis pulv. 0·4,
Aquae dest. 10·0.
S. 2mal täglich zu pinseln.

651. Bismuth. subnitr. 2·50.
Lanolin. 50·0.
S. Salbe.

Nachdem die kranke Hautpartie mit einem gut eingeseiften Flanellstücke gewaschen worden, ist obige Salbe, dick auf Leinwand oder Rehleder gestrichen, aufzulegen.

Ekzema marginatum, umschriebenes Ekzem.

Gegen das Jucken Waschungen mit Sapo viridis, Spiritus saponatus kalinus, flüssiger Glycerinseife oder einem der nachfolgenden Mittel.

652. Kali caust. 1·0,
Aquae destill. 200·0.
S. 2mal tägl. einzureibe

653. Acid. carbol. 5·0,
Olei olivarum 100·0.
S. Zum Einreiben.
654. Acid. carbol. 5·0,
Spir. vini conc. 100·0.
S. Zum Einreiben.
655. Chrysarobini 5·0,
Lanolin. 30·0,
Vaselini 20·0.
S. Salbe.
656. Tranmaticini 30·0,
Chrysarobini 3·0.
S. Zum Einreiben.
657. Ac. pyrogall. 2·0,
Ung. simpl. 20·0.
S. Salbe.
658. Ac. pyrogall. 2·0,
Glycerin. pur. 5·0,
Spir. vin. 100·0.
S. Zum Bepinseln.
659. Lact. sulf. 5·0,
Naphtol. 1·0,
Spir. sap. kal. 20·0,
Alcohol. 100·0,
Glycerini 2·50.
S. Zum Einreiben.
660. M. subl. corr. 1·0.
Alcohol. rectif. 200·0.
S. Z. Einreiben. (Vorsicht!)
661. Naphtol. p. 1·0.
Spir. vin. 100·0,
Glycerin. 5·0.
S. Zum Bepinseln.
662. Florum sulf.,
Olei Fagi,
Cretae albae aa. 20·0,
Saponis virid.,
Axungiae Porc. aa. 40·0.
S. Mit Borstenpinsel einzureiben. (Modif. Wilkinson'sche Salbe, 6 Tage Früh und Abends einzureiben, hierauf die kranke Stelle mit Wolle oder Flanell zu bedecken.)

Elephantiasis. Sklerodermia, Pachydermie.

Bei Sklerodermie Roborantia, *Eisen, Amara, Leberthran, Bäder, Mattoni's Moorextract, Soolbäder, Darkauer Jodsalz,* im Sommer Milchcuren. Local: Salben von Cupr. sulfur., Jod, Ung. ciner., Thiosinamin mit Massage verbunden; hypodermatisch 15%ige alkohol. Thiosinaminlösung, tägl. 1 Pravaz-Spritze (v. Hebra).

Bei Elephantiasis Arabum: Bekämpfung der Entzündungserscheinungen, compl. Ekzeme und Geschwüre; lauwarme Bäder, Salben, Verbandwässer, Aetzmittel. Methodische Massage mit Zuthat von resorptionsfördernden Mitteln; Hochlagerung der Extremität, Compressionsverband.

Emphysema pulmonum, Lungendampf.

Behandl. d. Bronchialcatarrhs; Meidung der Schädlichkeiten, die diesen steigern; Diät; Lungengymnastik; während des asthmatischen Anfalles Abreibungen der Brust, Ableitung auf den Darmcanal. Einathmung comprimirter und Ausathmung in verdünnte Luft mittelst des pneumatischen Apparates; pneumat. Kammer; im Sommer Aufenthalt in Fichtennadelwäldern.

663. Extr. Belladonn. 0·10,
Pulv. rad. Ipecac. 0·30,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. P. div. in dos. = 15.
S. 3 Pulv. taglich.
664. Extr. Hyoscium.,
Sulfur. aurant. a. timonii aa. 0·20,
Natr. bicarb. 3·0.
M. f. P. div. in dos. = 12.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.
665. Apomorph. hydr. 0·05,
Pulv. et extr. Liquirit. q. s. ut f. pill. Nr. 50.
S. 1—3stdl. 1—3 Pillen.

Fehlen heftige Sympt. d. Bronchialcatarrhs, so verordne man:

666. Sal ammoniac. 2·0.
Pulv. et Extr. Liq. q. s. u. f. pil. Nr. 50.
S. Früh u. Abds. je 5 P.

667. Strychn. nitr. 0·01,
Syr. simpl. 100·0.
S. 2—4mal tägl. 1 Esslöffel.
668. Liq. Kalii arsenicos. 0·5,
Aq. dest. 250·0.
S. Zur Inhalation.

Bei gleichzeitiger Stuhlverstopfung: Rheum, Senna. Bitterwässer.

Bei Oedem d. Unterextremitäten werden subcutane Injectionen von Pilocarpin gerühmt.

669. Pilocarpini 0·20,
Aquae destill. 10·0.
S. 1/2 Spritze subcutan zu injiciren. [ad 100·0.
670. Inf. Fol. Jaborandi e 5·0
S. Auf einmal zu trinken

Capillartroicars vide: Ascites.

Bei herabgekommenen Individuen leichte Eisenpräparate:

671. Ferr. hydrogenio reduct., Chinin. sulf. aa. 2·0,
Extr. Taraxaci q. s. ut f. pilul. Nr. 40.
S. Nach dem Mittag- und Abendessen je 1—2 Pillen.

Auch Faradisation der Nervi phrenici empfohlen.

Vide: Dyspnoe.

Endocarditis acuta.

Behandlung rein symptomat.: Bettruhe, antifebrile Mittel, kalte Umschläge auf die Präcordialgegend; Digitalis, Natr. nitricum oder tartaricum; bei gesteigerter Pulsfrequenz; Reizmittel bei drohender Herzlähmung; bei drohend. Lungenödem Aderlass. Bei hohem Fieber Chinin. — Gleichzeitige Behandlung des ursächlichen Leidens.

672. Infus. fol. Digital. e 1·0, Kalii acet. 2·0, [ad 150·0, Syr. simpl. 15·0.
673. Pulv. fol. digit. 1·0, Sacch. alb. 2·0, M. f. P. div. in dos. = 6. S. 3 Pulver tägl.
674. Tinct. digital. gtts. XV, Kalii jodat. 0·15, Aq. dest. 150·0.
S. Tagsüber auf 3mal zu nehmen. [20·0.
675. Tinct. Strophant. hisp. S. 3mal tägl. 10—20 Tr.

Endocarditis chronica

vide: Vitium cordis.

Endometritis.

Bei acuter, nicht puerperaler E. Bettruhe, leichte Abführmittel, warme Wannenbäder, Priessnitz-Umschläge auf den Bauch, lauwarme, desinficirende Vaginalirrigationen, Vaginalsuppositor.

676. Morph. muriat. (o. Extr. Belladonnae) 0·10, But. Cacao 30·0. M. f. glob. vag. Nr. 10. S. 2—4 Stück in 24 Stund. zu verbrauchen.

Bei chronischer Endometritis Uterusirrigationen mit Carbol-, Lysol-, Creolin-, Sublimatlösungen (1 : 5000) etc., Application von Vaginaltampons u. Uterusbougies, welche Tannin, Borsäure, Carbolsäure, Jodtinctur, Airol, Ichthyol etc. enthalten. Moorbäder (Mattoni's Moorsalz), Darkauer Jodsalz. In hartnäckigen Fällen Auskratzen des Endometriums, Ausstopfen d. Uteruscavum mit Jodoform oder 10% Aetheraristolgaze.

Bei Endometritis cervicis Behandlung der Erosionen (s. d), Bepinselung der Cervicalschleimhaut mittelst d. Playfair'schen Sonde, mit Holzessig, Ferrum sesquichl., Ichthyol etc.

Enterocatarrh

vide: Catarrhus intestini.

Enuresis nocturna.

Bei Erschlaffung der Blase kal
Waschungen und Sitzbäder;
häufigem Harndrang warme

bäder; bei schwachen Kindern Chinin, Eisenpräparate (Radlauer's Eisenalbumin-Peptonat Essenz). Am wirksamsten Faradisirung m. d. Mastdarmrheophor. Der 2. Pol aufs Perineum, m. schwachen Strömen beginnend, tägl. 5—10 Minuten lang, durch 4—5 Woch. Massage (Thure-Brandt). Auch Kaltwassercur. Neuest. Schlafen mit erhöhtem Becken (Erheben des Fussendes d. Bettes) empfohl. Tonica innerl.

677. Tinct. rhur. aromat. 10.0.
S. 2mal tägl. 10—15 Tr. in Zuckerwasser z. n.
678. Lupulini 0·50,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. P. div. in dos. = 10,
S. Früh u. Abends 1 Pulv.
679. Extr. Bellad. 0·05,
Sacch. alb. 2·0,
M. f. P. div. in dos. = 5.
S. Vor dem Schlafengehen 1 Pulver. (Vorsicht!)
680. Strychnini nitr. 0·10.
Aq. dest. 10·0.
S. Zu subcut. Inject. (1/4 Spritze in die Kreuzbeingegend zu injiciren.)
681. Syrup. ferr. jodat.,
Syrup. simpl. aa. 25·0.
S. 3mal tägl. 1 Theelöffel.

Ephelides, Sommersprossen.

Bei ausgebreiteten Sommersprossen d. Gesichtes Bedeckung der erkrankten Stellen m. Leinwandläppchen, welche in

682. Merc. sublim. corros. 0·5,
Aq. dest. 50·0

getaucht und durch 4 Stunden mit dieser Flüssigkeit feucht erhalten werden. *Entzündungserscheinungen hiebei d.* kalte *Umschläge z. mildern. Blasen* seitlich *anzustechen und zu* entleeren. *Reispuder. Statt* dieser forcirten *Behandlungsweise* Waschen der Haut m. 1% Sublimatseife mehrm. tägl. und Abends Einreiben von

683. Hydrarg. bichl. corr. 0·5
Vaselini 30·0.
S. Salbe.
oder
684. Acidi salicyl. 2·0,
Sap. vir. 3·0,
Vaselini 20·0.
S. Salbe.
685. Hydrarg. praec. alb.,
Bismuth. subnitr. aa. 2·5,
Lanolini 40·0.
S. Erbsengross einzureiben.

Zu permanentem Gebrauch eignen sich:

686. Hydr. bichl. corr. 0·30,
Emuls. amygd. 30·0,
Tct. Benzoës 1·5.
S. D. Gesicht d. Abds. einzur.
687. Boracis 15·0,
Spir. Colon. 20·0,
Aq. dest. 130·0.
S. Wie oben.
688. Natr. bibor. 15·0,
Kal. carbon. 5·0,
Aq. rosar.,
Spir. Colon. aa. 80·0.
S. Abends einzureiben und Morgens trocken abzuwisch.
689. Zinci oxyd.,
Mag. Bismuth.,
Hydr. praec. alb. aa. 3·0,
Lanolini 5·0,
Vaselini 35·0.
S. Salbe. Abds. einzureiben.
690. Sulfur. praecip. 15·0,
Camphor. 1·0,
Muc. g. ar. 5·0,
Aqu. Calcis,
Aq. rosar. aa. 100·0.
S. Aeusserlich.
691. Naphtholi 2·0,
Glycerini 1·0,
Spir. sap. kal. 50·0.
S. Aeusserlich.

Epididymitis, Nebenhoden-entzündung.

Zweckmässig sofort. Bett erhöhte Lagerung durch e

chende Unterstützung des Hodensackes; Eisumschläge, Natr. salicylicum, 4 Grm. pro die (Picot), Abführmittel, säuerliche Getränke, Diät; wegen heftiger Schmerzen eine Salbe oder Morphium innerl. per Klysma oder subcutan; Sistirung der Injectionen wegen des Trippers; am 2. oder 3. Tage äusserl. Anwendung der Jodpräp.

692. Liqu. Burowi 500.
S. Zu Umschlägen.

Bei heftigen ausstrahl Schmerzen im Hoden und Samenstrang;

693. Extr. Belladonn. 2·0,
Vaselini 20·0.
S. Salbe.
694. Jodoform. 1·0,
Vaselini 30·0.
S. Zum Einreiben.
695. Tinct. Jodinae,
Tinct. Gallarum aa. 5·0,
S. Zum Bepinseln.
696. Kal. jodat. 1·0.
Jodi pur. 0·10.
Ung. emoll. 25·0.
M. f. Ung.
S. Salbe.

Externe Application v. Methylsalicylat (Bettmann), wodurch die Schmerzen beseitigt werden. 1 Theil Methylsalicylat : 2 Theile Ol. Olivar.; davon 6—8 Ccm. auf ein Stück nicht entfettete Watte, aufs Scrotum gelegt, darüber Guttaperchapapier und ein Suspensorium.

Heftpflasterverb. nach Fricke umständlich, praktischer: Wattekautschukverband und Suspensorium nach Langlebert.

Epilepsie, Fallsucht.

Vermeidung der einen Anfall begünstigenden Anlässe; Verbot geistiger u. körperlicher Ueberanstrengung; Rücksicht auf den Allgemeinzustand. Bei vorhan-Aura in einer Extremität Versuch der Coupirung des Anfalles durch Umschnüren derselben. Während des Anfalles Schutz vor Verletzungen durch Aufsicht; Lösung der beengenden Kleider, Einführung eines mit einem Tuch umwickelten länglichen Gegenstandes zwischen die Zahnreihen, um d. Einbeissen d. Zunge zu verhüten; Chapman'scher Schlauch. Bei Epilepsie infolge von Syphilis die entspr. Behandlung (Jodkali). Operative Behandlung bei Knochennarben am Schädel, Narben an peripheren Nerven u. dgl. Method. Kaltwassercur in einer Anstalt, systematische innere Medication.

697. Natrii bromat. 10·0,
Div. in dos. = 10.
S. Täglich 2—4 Pulver.

698. Kalii brom. 10·0,
Aq. dest. 150·0,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Jede 2. Stunde 1 Esslöffel.

699. Kalii bromat. 20·0.
Tct. calabar. 6·0,
Aq. dest. 100·0.
S. 2mal tägl. 1—2 Kaffeel.
(Die Dosis der Bromsalze zu steigern bei öfterer Wiederholung der Anfälle.)

700. Natr. bromat.,
Kal. bromat.,
Ammon. bromat. aa. 10·0,
Aq. dest. 300·0.
S. Tägl. 3—6 Esslöffel in einer Tasse Baldrianthee.

701. Bromalin (Merck) 10·0,
div. in part. aeq. X.
D. ad chart. amyl.
S. Täglich 2—8 Pulver und mehr.

702. Bromalin. 10·0,
Aq. dest. 10·0,
Syr. cort. aur. 90·0.
DS. Täglich 1—2 Kaffeelöffel voll zu nehmen. (Bei Kindern.)

Wo Bromkalium versagt, empfiehlt Huchard:

703. Picrotoxin 0·03,
Alkohol 10·0.
Aq. dest. 110·0.
S. Tgl. 1/2 Kaffeel. v. d. Mahlz.

704. Atropini sulfur. 0·03,
Spir. Vini conc. 20·0.
S. Früh und Abends 5 Tropfen auf Zucker.

705. Atropini sulf. 0·05,
Pulv. et Extr. Liqu. q. s. u. f. pil. Nr. 50.
S. Täglich 1 Pille zu nehm.

706. Zinci oxydat.,
Extr. Valerian. aa. 5·0,
Extr. Belladonn. 2·0,
Pulv. rad. Valerian. q. s. u. f. pil. Nr. 100.
S. 1—3 Pillen täglich.

707. Strontii bromat. 0·5,
D. tal. dos. Nr. XV.
S. 3mal tägl. 1/2—1 Pulver in Zuckerwasser.

708. Amylenhydrat. 5·0—10·0,
Aq. dest. 100·0.
S. 2—3 Esslöffel täglich.

709. Argent. nitr. 0·50,
Pulv. et Extr. acor. q. s. u. f. pil. Nr. 50.
S. 4—10 Stück des Tages.

710. Tinct. Simulo 30·0.
S. 1 Kaffeel. in Wasser z. n.

Bei gehäuften Anfällen Chloralhydrat innerlich oder per Klysma 2—3 Gramm.

Ein Theelöffel Kochsalz sofort nach Eintritt der Aura soll den epileptisch. Anfall verhindern. Bei der angiospastischen Form (blasse Gesichtsfarbe) coupirt bisweilen den Anfall Einathm. von Amylnitrit im Momente der eintretenden Aura.

Als Vorbeugungsmittel während der Aura:

711. Apomorph. mur. 0·10,
Aq. dest. 10·0.
S. Subcut. Inj. Anfänglich 1/2 Spritze = 0·005, allmälig weniger bis 1/4 Spritze.

Epistaxis, Nasenblutung.

Einspritzung von Eiswasser oder Essigwasser in die betreffende Nasenöffnung (neuerlich Heisswasser-Injectionen empfohlen); Tamponade d. Nasenloches bei aufrechter Kopfhaltung; bei starker und in einfacher Weise nicht zu stillender Blutung Tamponade d. Nase mit der Bellocqschen Röhre.

712. Aluminis crudi pulv. 20·0.
Aquae destillatae 50·0.
S. Schnupfwasser (für Personen, die an häufig., mässig. Nasenbluten leiden).

713. Zinci sulf. 1·0,
Alum. crud. 2·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Schnupfwasser.

714. Ferripyrin 18·0—20·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Kleine Wattebäuschchen damit zu tränken und auf die Nasenschleimh. zu appliciren.

715. Acid. tannici 1·0,
Sacch. 10·0,
S. Schnupfpulver.

716. Tinct. Gallar.,
Tinct. Catechu aa. 5·0.
S. Zum Bepinseln d. Nasenschleimhaut.

Epulis, Zahnfleischschwamm.

Abtragung m. Scheere, Messer etc., od. Cauterisation mit Lapis, Jodtinctur etc.; passende Mundwässer. Im Falle v. Blutung oder Geschwürsbildung Bepinselung m. concentr. Aetzmitteln.

717. Tinct. Jodin.,
Spir. vini aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln.

718. Acid. carbol. 1·0,
Spir. vini 20·0.
S. Zum Bepinseln.

719. Arg. nitr. cryst. 1·0,
Aquae destill. 10·0.
S. Zum Bepinseln.
720. Tinct. jodi,
Tinct. gallarum aa. 5·0.
S. Wie das Vorige.

Erosionen am Muttermund.

Tägliche Vaginalirrigationen m. Kal. hyperm.-, Carbol-, Creolin- oder Ichthyollösungen. Vorhandene Ovula Nabothi zu punctiren. Bei hyperämischer Schleimhaut Scarification. Holzessigeingiessungen mittelst Hartgummispeculum, einige Wochen lang täglich zu wiederholen.

721. Acet. pyrolignos. crud.
S. Aeusserlich. [*200.*

Aetzung der E. durch 4—5 Tage mit Salpetersäure (Fritsch).

722. Ichthyol. 5·0.
Glycerin. ad 100·0.
S. Zu Tampons.

Erysipel, Rothlauf.

Prophylaktisch haben sich Personen mit selbst geringfügigen Verletzungen von Erysipel-Kranken fern zu halten. Bettruhe, Fieberdiät, Sorge für leichten Stuhl durch Bitterwasser od. Ol. ricini. In leichteren Fällen mit mässigem Fieber genügt das Bestreichen der befallenen Stellen mit Vaselin. In schwereren Fällen empfiehlt Wölfler, um d. Fortschreiten des E. zu verhindern, an den Grenzen d. erkrankt. Partien daumenbreite Heftpflasterstreifen stramm anzulegen, Kraske Scarification d. erkrankt. Stellen und Application von 5% Carbol- *compressen*, Hüter Carbolinjec- *tionen. Analog der Wölfler-* *schen Compression wird Bestrei-* *chen mit Collodium empfohlen.* — *Die Versuche, E. mit Marmo-* *ek's Antistrept* n zu behandeln, erlauben noch kein definitives Urtheil. — Bei Collapszuständen starker Kaffee, Wein, Moschus, Campherölinjectionen. In Fällen m. schweren Hirnsymptomen Aderlass zu versuchen. — Gegen zu hohes Fieber Chinin, Antipyrin u. dgl.

723. Plumb. acet. bas. sol. 10·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Umschlägen.
724. Acid. carbol.,
Tinct. jod.,
Spir. vini aa. 1·0,
Ol. Terebinth. 2·0,
Glycerin. 5·0.
S. Zum Bepinseln (2stündl. die entzündete Fläche u. deren Umgebung).
725. Acid. carbol. 0·2,
Aq. dest. 10·0.
S. Zur subcutan. Injection. (Täglich 1—2 Spritzen in der Nähe d. Erysipels zu injiciren. Sehr schmerzhaft!)
726. Ammon. sulfo-ichthyol,
Aether sulf. aa. 5·0,
Collod. elast. 10·0.
S. Zum Einpinseln.
727. Jodol 10·0,
Collodii 90·0.
DS. Zum Bepinseln.
728. Ichthyol,
Amyl. aa. 80·0,
Albumin. 2·0,
Aq. dest. 40·0.
S. Unna's Ichthyolfirniss.
729. Resorcin. 5·0,
Vaselin. 20·0.
S. In die Haut einreiben u. die Stelle mit Watte bedecken.

Erythema.

Einfache od. zusammengesetzte Streupulver. Nur in manchen Fällen kalte Umschläge. Bei gleichzeitigem Fieber Chinin.

730. Plumb. ac. b. sol. 5·0.
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Umschlägen. (Bei Verlust der Epidermis.)

731. Acid. carbol. 0·5.
Spir. vin. rectif. 100·0.
S. Zum Betupfen.
732. Alum. plum. pte. 30·0.
S. Streupulver.
733. Oxyd. Zinci 5·0.
Amyli pur. 30·0.
S. Streupulver.
734. Spermatis ceti 30·0.
S. Zum Einreiben.
Vgl. Intertrigo.

Facialislähmung.

Causale Therapie (Lues); Beseitigung etwaiger, den Nerven compr. Tumoren, Abscesse etc.; bei rheumatischer Lähmung Diaphorese (innerlich Natr. salicyl.). Hautreize, Blutegel an den Warzenfortsatz, Massage. Später Elektricität: Faradisation der einzelnen Gesichtsmuskeln, Galvanisation des Facialis (Anode auf d. Proc. mastoid. der kranken, Kathode auf den der gesunden Seite). Bei veralteten Fällen:

735. Strychnin. nitr. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Tägl. 1/4—1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.

Favus, Erbgrind.

Wiederholt. Begiessen d. Favusmassen mit Oel (Leberthran) und Verreib. desselben mittelst eines steifen Borstenpinsels. Entfernung der erweicht. Massen, Abwaschen mit Seife oder Seifengeist und tägl. Epilation. Einreibung m. Theer od. Salicylsäure-, Carbolsäure-, Resorcinlösung od. Petroleummisch.

736. Saponis viridis 50·0.
S. Schmierseife.

737. Spir. Sap. kal. 50·0.
S. Zum Einreiben.

738. Olei Cadini,
Sapon. virid. aa. 50·0,
Spir. vini 100·0.
S. Aeusserlich.

739. Ichthyol. 5·0,
Acid. salicyl. 3·0,
Glycerin.,
Spir. vini aa. 50·0.
S. Aeusserlich.
740. Acid. carbol. (od. salicyl.)
Glycerini puri. [2·0,
Alcohol. aa. 20·0.
Aq. dest. 100·0.
S. Zum Einpinseln.
741. Acid. pyrogall. 2·0,
Vaselini 20·0.
S. Salbe.

Auch Einreibungen v. Carbolöl 1:20 oder Ol. cadini.

742. Thymol. 0·50,
Chlorof. 5·0,
Ol. Olivar. 15·0.
S. Zum Einreiben.
743. Petrolei 100·0,
Bals. Peruviani 10·0.
S. Zum Einreiben.
744. Chrysarobin 5·0,
Ac. salicyl. 2·5,
Collodii 30·0.
S. Aeusserlich.
745. Resorcini 5·0,
Vaselini 100·0,
S. Aeusserlich.
746. M. subl. corr. 0·20,
Spir. vin. Gall. 100·0.
S. Zu Waschungen oder Umschlägen.

Auch Bepinselungen mit Essigsäure mit Erfolg zu verwenden. Bei Favus unbehaarter Theile Anwendung von Seife, darauf Oel und schliesslich Theersalbe.

Febris intermittens vide:

Intermittens.

Fettleibigkeit vide:

Obesitas.

Fissura ani.

Application einer 5% Cocain-lösung oder -Salbe oder ein 10% Arg. nitr.-Lösun

pfung mit Salpeters., Cupr. sulf., Verschärfung mit dem Glüheisen.

747. Cocain. hydrochl. 1·0,
Acid. borici 2·0,
Lanolin. 30·0.
S. Salbe.

748. Argent. nitr. p. 1.0,
Vaselin,
Lanolin. aa. 5·0.
S. Salbe.

Häufige Anwend. folg. Salbe:

749. Calomel 0·25,
Pulv. opii,
Extr. Belladonn. aa. 0·10,
Ungt. Sambuci 5·0.
S. Salbe. (Allingham.)

Operative Behandlung, besteht in linearer Spaltung des Geschwürs und des Sphincters oder Sphincterdehnung n. Recamier. Bepinselung mit reinem Ichthyol.

Flatulenz vide: Colica flatulenta.

Fluor albus, Leukorrhoea, weisser Fluss. Blennorrhoea vaginae, Catarrhus vaginae.

Acut: Kalte Umschläge, Einspritzung mit kaltem Wasser, bei Fiebersymptomen auch säuerliche Getränke, allenfalls Bettruhe oder Vermeidung von Bewegung.

Chronisch: Ermittelung d. Ursache und der Ausdehnung d. Krankheit auf Nachbargebilde, ob primär oder secundär. Locale Behandlung durch Injectionen, eventuell durch Aetzmittel. Bäder mit Mattoni's Moor-Extract. Darkauer Jodsalz.

Bei Kindern: Reinhalt. durch Waschung oder Bäder. Oertlich *Adstringentien. Einführung von Jodoformstäbchen. Einlage von in Jodoform getauchten Wattetampons. Eventuell Allgemeinbehdl. m. Leberthran, C[illegible]*

750. Plumb. ac. b. sol. 10·0.
S. 1 Esslöffel in ¼ Liter Wasser (zum Einspritzen).

751. Kali chloric. 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

752. Alum. crud. p. 10·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

753. Acet. pyrolignos. 200·0.
S. Zum Einspritzen (5 Esslöffel voll auf einen Irrigator).

754. Zinci sulfur. 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

755. Acidi carbolici 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

756. Creolin (od. Lysol) 2·5,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

757. Acidi salicyl. 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

758. Kal. hypermang. 2·0.
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Einspritzen.

759. Formaldehyd (Formalin) 25·0,
Aq. dest. 75·0.
S. Aeusserlich; 1 Esslöffel voll auf 1 Liter Wasser zu Irrigationen.

Wirksamer als die von Pat. selbst auszuführenden Irrigationen ist die Anwendung concentrirter Flüssigkeiten durch den Arzt, indem d. Vaginalportion mittelst Röhrenspeculums eingestellt und nach Entfernung des Secretes mit Watte die Flüssigkeit eingegossen wird, welche die Portio durch einige Minuten umspült. Statt dessen auch Bepulverung mit Borsäure. Hierauf wird ein m. einem Faden versehener Wattetampon eingeführt, welchen Pat. nach einigen Stunden entfernt. Vaginal-Injectionen mit Lösungen von Mattoni's Moor-Extract [illegible] leinwächter

760. Merc. subl. corr. 0·2,
Aq. font. 200·0.
S. Zum Eingiessen.
761. Cupr. sulf. 10·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Zum Eingiessen.

In frischeren, zumal durch Infection bedingten Fällen:

762. Arg. nitr. cr. 10·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Zum Eingiessen.

Bei Geschwüren an der Vaginalportion:

763. Arg. nitr. cryst. 1·0,
Aq. dest. 20·0.
S. Zum Bepinseln.
764. Tinct. Jodinae,
Tinct. Gallar. aa. 5·0,
Jodi pur. 0·50.
S. Zum Bepinseln.
765. Tannini pur. 2·0,
Glycerin. pur. 20·0.
S. Zum Bepinseln.
766. Acid. chromic.,
Aq. dest. aa. 5·0.
S. Aetzmittel (mittelst Glasstab aufzutragen).
767. Jodoformi 1·0,
Glycerini 10·0,
Ol. Menth. gtts. 2.
S. Zum Bepinseln.

Vaginaltampons aus Baumwolle zu imprägniren mit:

768. Kalii jodat. 1·0,
Jodi pur. 0·10,
Glycerini 30·0.
S. Nach Bericht.
769. Tannini pur. 1·0,
Glycerini 30·0.
S. Wie das Vorige.
770. Alumin. crud. 1—3·0,
Butyr. Cacao,
Ung. emoll. aa. q. s.
ut f. suppos. (oder Globuli) 10.
S. 1—2 Stück tägl. einzulegen (in die Vagina).
771. Zinci sulf. 1·0,
Butyri Cacao,
Ung. emoll. aa. q. s.
ut f. suppos. (oder Globuli) 10.
S. Wie das Vorige.

Bei Fluor albus kleiner Mädchen:

772. Jodoform. 0·25,
Butyr. Cacao 1·0.
F. supposit. da tal. dos. = 10.
S. Früh u. Abds. ein Stück in die Scheide zu bringen.

Bei Schmerzen in der Umgebung des Uterus:

773. Morph. mur. 0·10,
Butyr. Cacao
Ung. emoll. aa. q. s.
u. f. Globuli 10.
S. Wie das Vorige.

Bei Chlorose Soolbäder, innerlich:

774. Chinin sulf. 1·0,
Ferr. sulf. 3·0,
Pulv. et succ. Liq. aa. q. s. ut f. pil. Nr. XL.
Consp. p. Lycopod.
S. Morgens und Abends je 1 Pille (zu steigen bis zu je 4 Pillen).

Bei Cat. uteri eventuelle blutige oder unblutige Dilatation (Laminaria), Reinigung mit dem Wattatampon, Injection m. Adstringent. mit dem Bozeman'schen Katheter (Carbollösung 2%, Creolin. ½%, Cupr. 10%, Alumen, Zinci sulf., Kal. hypermang., Tannin, Jodtinctur).

Frostbeulen vide: Pernio nes.

Fungus vide: Tumor albus.

Furunculus, Blutschwär

Anfänglich kalte Umsch
Bepinselung mit Jodtinctu

Cauterisation. Rechtzeitige Eröffnung mit dem Messer od. durch warme Kataplasmen. Bei öfteren Recidiven der Furunculose: Regelung der Diät und der Wohnräume; Luftveränderung. Im Bedarfsfalle Abführmittel. Mattoni's Bitterwasser.

Galaktorrhoea, Milchüberfluss.

Regelung der Diät, Abführmittel (Mattoni's Bitterwasser), öftere Waschungen der Brüste mit kühlem Wasser, entsprechende Unterstützung der stark gefüllten Brüste; warme Umschläge; Anwendung des Milchsaugers.

Gallensteine vide: Cholelithiasis.

Gangraena pulmonum, Lungenbrand.

Bettruhe, gute Lüftung d. Krankenzimmers, roborirend. Regime, China-weine, Eisenweine. Gegen hohes Fieber grosse Chinindosen, gegen starken Husten Narcotica. Die Sputa zu desinficiren.

775. Creosoti fagi opt. 2·0,
Tinct. absynth. comp. 6·0
Spirit. Vini Cognac. 50·0,
Vini malac. 150·0.
S. Umgeschüttelt 3mal tägl. 1 Esslöffel in Zuckerw. zu nehm.

776. Infus. rad. gentian.
e 10·0 : 170·0,
Chinin. sulf. 3·0,
Acid. sulf. 0·5.
Syr. cort. aurant. ad 200·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel voll.

777. Ol. Eucalypt.
Ol. pini pumilion. aa. 10·0,
Ol. Lavand. gtts. V.
S. 10 Tropfen in heissem Wasser zum Einathmen.

778. Ol. Thereb. rectif.
S. Zur Inhalation

779. Menthol. 0·15,
Ext. in caps. gelatinos.
D. tal. dos. Nr. 10.
S. 2—4 Kapseln tägl. z. n.

780. Myrtol. 0·12—0·15.
S. Wie das Vorige.

Gastralgia, Magenkrampf, vide: Catarrh. ventr.

Gastrektasie vide: Dilatatio ventr.

Gastritis vide: Cat. ventriculi.

Gastroenteritis vide: Cat. ventriculi.

Gingivitis, Zahnfleischentzündung.

Sorgfältige Pflege des Mundes. Reinigung des Zahnfleisches mit Zahnbürste od. Läppchen; häufig. Ausspülen mit Mundwasser.

781. Kal. chlor. 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Mundwasser.

782. Tinct. Ratanhiae,
Tinct. Gallarum aa. 10·0.
Tinct. Land. simpl. 1·0.
S. Zum Bepinseln.

Mundwässer vide: Angina, Aphthae, Stomatit. mercur.

Glaukom, grüner Staar.

Bei constatirter Diagnose sofortige Einträufelung von Eserin oder Pilocarpin bis zur Operation (Iridektomie, Sklerotomie) fortzusetzen, ängstliche Vermeidung von Atropin und mydriatischen Mitteln überhaupt, selbst in Fällen, wo nur Verd. a. Glaukom besteht.

783. Eserin. sulf. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Tägl. 2 [illegible] träufeln

784. Pilocarpin. mur. 0·10,
Aq. dest. 10·0.
S. Wie oben.
785. Acecolin. hydrobrom. 0·1,
Aq. dest. 10·0.
S. Zum Einträufeln.
Bei starken glaukomat. Schmerzen:
786. Eserini sulf.,
Morph. mur. aa. 0·10,
Aq. dest. 10·0.
S. Wie vorher.

Glossitis, Entzündung der Zunge.

Eiscompressen um Hals und Unterkiefer. Eispillen. In schweren, die ganze Zunge betreffenden Fällen tiefe Längsschnitte in den Zungenrücken. Bei Suffocationsgefahr Tracheotomie. Bei circumscriptem Process frühzeitige Eröffnung etwaiger Abscesse. Antiseptische Mundwässer. (S. unter Angina, Stomat. mercur.) Als Excitans Cognac und Wein.

Gonitis, Kniegelenksentzündung.

In acuten Fällen Ruhe, horizontale Lage der Extremität; kalte Umschläge; nach Sistirung der Schmerzen gefensterter starrer Verband, Compression mit trockenen Schwämmen. Bei grosser Schmerzhaftigkeit Morphiumsalbe. Bei chronischer seröser Synovitis Anwendung d. Jodkalijodsalbe, event. Punction und Injection von Jod. Massage. In chron. Fällen Moorbäder (Mattoni's Moor-Extract), Darkauer Jodsalz.

787. Empl. oxycroc.,
Empl. Hydrarg. aa. 10·0.
S. Pflaster.
788. Tinct. Jodinat.
Tinct. Gallarum aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln.
789. Ichthyol 5·0,
Lanolin.
Vaselin aa. 25·0.
S. Salbe.
790. Jodi pur. 0·5.
Kali jodat. 5·0.
Ungt. emoll. 50·0.
S. Salbe.

Gonorrhoe vide: Blennorrhoea urethrae.

Haematemesis, Bluterbrechen.

Berücksichtigung des Grundleidens; horizont. Lage im Bette; möglichste Vermeidung von Bewegungen und jeder Nahrung innerhalb der ersten 24 Stunden, sodann esslöffelweise abgekochte, eiskalte Milch; später nur flüssige Nahrung; starke Kochsalzlösung (kaffeelöffelweise) Eiswasser, Eispillen, Eisumschläge auf die Magengegend; Giesshübler, gut eingekühlt; gegen Ohnmachten Bespritzung des Gesichtes mit Wasser; Frottirung des Körpers mit Aether aceticus oder sulf., eventuell Campheräther injection. Bei drohender Verblutung Kochsalzinfusion. Bei kräftigem Puls Sistirung des Brechreizes durch subcut. Morphiuminjection. Grosse Wismuthdosen. Bei Unmöglichkeit der Ernährung durch den Mund Application nährender Klystiere. Vgl. Ulcus ventriculi.

791. Plumb. acet. 0·20,
Morph. mur. 0·10,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. P. div. in dos. = 10.
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

792. Extr. Secale corn.
Acid. sulph. arom. aa. 10·0.
S. 10—30 Tropfen in einem Weinglas Wasser wiederholt zu nehmen.

793. Protargol. 0·5.
Dent. tal. dos. Nr. XII.
S. 3—4mal tägl. 1 P. in Oblaten.

794. Ergotin. bis depurat. 1·0,
Morph. mur. 0·15.
Aq. dest.
Glycerin. aa. 5·0
S. 1 Pravaz-Spritze zu injiciren
Subcutane Injection v. Ergotin 0·03—0·05—0·1.

Bei Kindern:

795. Alum. crud. 0·50,
Aq. dest. 50·0.
Syr. rub. Id. 10·0.
S. Jede 5 Minut. 1 Kaffeel.

Haematurie, Blutharnen.

Ermittelung d. Ursache; ferner ob die Blutung aus d. Harnröhre, Harnblase oder Niere stammt; Ruhe, am zweckmässigsten Bettruhe; Diät; kalte Umschläge; Sistirung der Inject. beim Tripper.

796. Extr. Secal. corn. 1·0,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.
Jede 3. Stunde 1 Pulver.

797. Ergotini 1·0,
Laudan. pur. 0·10,
Sacch. alb. 2·0
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.
S. Jede 3. St. 1 Pulver.

798. Extr. Secalis corn. aq.,
Aq. dest. aa. 5·0.
Filtra.
S. Zu subcutan. Injection.
(3mal tägl. je 1/3 Spritze.)

799. Extr. fluid. Hydrast. can.,
Vini malacens. aa. 30·0,
Syr. Cinnamom. 15·0.
S. 1—2 Theelöffel 2—4stdl.

800. Extr. Hamamel. fluid. virg. 20·0.
S. 1—2 Theelöffel.

Bei Nierenblutungen:

801. Extr. haemostat.,
Tannini pur. aa. 0·50,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.
S. 3stündlich 1 Pulver.

Haemoptoë,

Bronchialblutung, Bluthusten, Lungenbluten.

Absolute Ruhe bei horizontaler Lage, Eisumschläge, starke Kochsalzlösung, Eispillen, Gefrornes; auch das sogenannte Binden der Glieder neuestens wieder empfohlen. (Die oberen Extremitäten werden knapp unter den Achselhöhlen, die unteren in der Mitte der Oberschenkel mit Binden abgebunden, doch dürfen dieselben nicht so stramm liegen, dass der Arterienpuls verschwindet. Die Binden sollen ca. 1 Stunde liegen, dann allmälige Lösung.) Von Nutzen 1/2—1 Esslöffel voll Kochsalz in wenig Wasser gelöst zu nehmen. Verbot d. Sprechens, des Genusses warmer Speisen; entsprechende Regelung der Diät, roborirende Mittel. Percussion zu unterlassen. Atropin, Morphin oder Heroin subcutan.

Bei starkem Hustenreiz:

802. Laud. pur. 0·10,
Plumb. acet. 0·20,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. Plv. div. in dos. = 10.
S. Jede 2. Stunde 1 Pulver.

803. Morph. muriat. 0·05,
Plumb. acet. 0·2,
Sacch. pulv. 3·0
M. f. pulv. div. in dos. = 10.
S. Stündlich ein Pulver.

804. Chloralhydrat. 1·0—2·5,
Aq. font. 200·0.
S. Klysma. (Pal.)

805. Extr. hydrast. canadens. 30·0.
S. Tägl. 3mal 30 Tropfen.

806. Inf. Secal. corn. e 1·0

Tinct. Laud. s.
Syr. cassill.

807. *Extr. haemostat. 1·0,*
Morph. mur. 0·10.
Elaeosacch. foenicul. 2·0.
M. f. Pulv. div. in dos. = 10
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

808. *Extr. Secal. corn. 1·0,*
Aq. dest. 10·0.
S. Zu subcut. Injectionen.

809. *Gelatine 2·0,*
Natr. chlorat. 100·0.
S. Auf 37° erwärmt; davon 10 Ccm. subcutan.

810. *Morph. mur. 0·1,*
Atropin. sulf. 0·005,
Aq. dest. 10·0.
S. ½—1 Spritze subcutan

811. *Acid. sclerotin. 1·0,*
Aq. dest. 25·0.
S. Subcutan 2—3 Spritzen in 24 Stunden zu injic.

Haemorrhagia cerebri

vide: Apoplexia.

Haemorrhoiden, goldene Ader.

Sorge für regelmässigen und leichten Stuhlgang (Mattoni's Ofner Bitterwasser), Verbot geistiger Getränke und excessiv. Körperbewegungen, dagegen sind regelmässige Spaziergänge empfehlenswerth. Bei entzündlichem Zustande Eisbeutel, bei Blutungen aus dem Mastdarm Ruhe, Eisumschläge u. Suppositor. Ergotin subcutan od. in Supposit. Kühle Sitzbäder; Mattoni's Moor-Extr., Darkauer Jodsalz, heisse intrarectale Injectionen als wirksam empfohlen. Operative Behandl.

812. *Alum. crudi,*
Tannini pur. aa. 10·0,
Butyr. Cacao q. s.
u. f. suppositoria Nr. 10.
S. Stuhlzäpfch. (bei Blutung.).

813. *Extr. opii aqu. 0·20,*
Lanolin. p. 16·0,
Vaselin. am. 4·0.
M. f. Ung.
S. Salbe.

814. *Ergotini 1·0.*
Aq. dest. 100·0.
S. Zu Umschlägen (bei ausgetretenen Hämorrhoiden).

815. *Extr. secal. corn. 0·50,*
Glycerin. 8·0.
Gelatin. q. s. u. f. supp. Nr. 3.
S. 1—2 Stück im Laufe d. Tages einzuführen.

816. *Chrysarobin. 0·8.*
Jodoform. 0·3.
Extr. Belladonn. 0·6.
Vaselin. 25·0.
S. Salbe. Nach Waschung d. Knoten m. 2% Cuchollas. u. Abtrocknung m. Watte zu applic.

817. *Kalii hydrojod. 2·0,*
Jodi puri 0·2,
Glycerini 30·0.
S. Damit getränkte Wattebäuschchen auf d. affic. Stelle zu legen und 2—3stdl. zu wechs.

818. *Anusol 7·5.*
Zinc. oxyd. 6·0,
Bals. peruv. 1·5,
Ol. cacao 19·0,
Ungt. cerei 2·5
M. f. suppos. Nr. XII.
Bei inneren Knoten:

819. *Chrysarobin. 0·08,*
Jodoform. 0·02,
Extr. Belladonn. 0·01.
But. Cacao 2·0,
Glycerin. q. s. ut f. suppos.
D. tal. dos. Nr. 5.
S. Stuhlzäpfchen.
Gegen das Jucken oder die Schmerzanfälle:

820. *Cocain. mur. 0·3—0·5,*
Lanolin. pur.,
Vaselin. aa. 5·0.
S. Salbe. Nach Seifenabreibung zu appliciren.

821. *Eucain A. 1·0,*
Menthol. 0·2,
Ol. olivar. 2·0,
Lanolin. ad 10·0,
M. f. ungt.
D.S. Salbe.
(Ebenso Eucain B

822. *Ichthalbin 10·0.*
S. Streupulver.
Auch Milch- od. Traubencuren, Karlsbad u. dgl. zu empfehlen.
823. *Extr. Cascar. sagr. fluid. 20·0.*
S. ½–1 Theel. 2–3mal tägl.
824. *Extr. hydrast. fluid. 20·0.*
S. 3mal tägl. 20 Tropfen.

Helminthiasis vide: Ascaris lumbricoides, Oxyuris vermicularis, Taenia.

Hemicranie, Migräne.

Beseitigung etwaiger Anomalien des Blutes und der Verdauung etc.; Rücksicht auf Erkrankungen d. Genitalorgane (bei Frauen), der Nase u. ihrer Nebenhöhlen, Vermeidung von Aufregungen. Während des Anfalles möglichste Ruhe, Aufenthalt in verdunkeltem Raum, kalte oder warme Umschläge, je nach der Individualität. Anwendung des Migranstiftes (Menthol). An den freien Tag. Chinin, Coffein, Bromkali etc. Faradisat., reizende heisse Fussbader, Waschungen m. Kölnerwasser oder Aether, auf den Kopf getraufelt; Massage, Elektricität.
825. *Chinini sulfur. 0·50,*
Succh. alb. 2·0.
M. f. pulv. div. in dos. = 3.
S. ½stündl. v. dem Anfalle.
826. *Coffeini hydrobrom. 1·0,*
Succh. alb. 2·0.
M. f. P. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. 1 Pulver.
827. *Coffeini citric. 1·0,*
Phenacetin. 2·0,
Succh. alb. 1·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
D. ad caps. amylac.
S. 2—3stdl. 1 Pulver.
828. *Kali bromat. 5·0,*
Aquae destill. 150·0,
Syr. cap. ven. 15·0.
S. Früh, Mittags u. Abend je 2 Esslöffel.
829. *Antipyrin. 5·0,*
div. in dos. = 5.
S. Bei Beginn des Anfal 1—2 Pulver im Zwisch raume von 1 Stunde zu neh
830. *Phenacetin. 5·0,*
div. in dos. = 10.
S. Wie das Vorige.
831. *Lactophenin 0·5—1·0.*
D. tal. dos. Nr. V.
S. 2—3 Pulver tägl.
832. *Migracnin 1·1.*
Dt. tal. dos. Nr. II.
S. In Wasser gelöst zu Event. n. 2 Stund. d. 2. Pu
833 *Citrophen 0·5—1·0.*
D. tal. dos. Nr. V.
S. 1—2 Pulver zu nehm
834. *Salophen 0·5—1·0.*
D. tal. dos. Nr. 10.
S. 2—5 Pulver tägl.
835. *Antinervin (Radlauer)*
Sacch. alb. aa. 0·5.
D. Tal. dos. Nr. 10.
S. 2stündl. 1 Pulver.
Natr. salicyl. 1·0 bei begin Schmerz, Wiederholung d. Do stündlich, bis der Schmerz sist oder Ohrensausen auftritt.
836. *Mentholi valerian. 5·0,*
Aq. dest. 25·0,
Syr. capillor. vener. 30·
DS. 2stündl 15 Tropf. zu
837. *Mentholi 1·0,*
Ol. Olivar. 0·50,
Lanolini 8·50,
M. f. ung.
S. Salbe.
838. *Extr. cann. Ind. 0·50.*
Pulv. et Extr. Taraxac. q. u. f. pilul. Nr. 25.
S. 3mal täglich vor d Mahlzeit zu nehmen.
Bei Chlorotischen:
839. *Pilul. Ferr. carbonic. (Valeti) Nr.*
S. Morgens und Abe 2—5 Pillen.

des Gesi

840. Amyl. nitros. 5·0.
S. 1—5 Tropfen auf ein Taschentuch und zu inhaliren.
841. Nitroglycerin 0·5,
Aq. dest. 50·0.
Zuerst 1—2 Tropfen, nach 3 Minuten abermals 2—3 Tropfen zu nehmen.

Hernia, Bruch.

Bei freiem Bruch Reposition des Darmes und passend. Bruchband, event. Radicaloperation (Bassini), letztere besonders bei angewachsenen Hernien.

Bei Hernia inflammata Bruchband sofort zu entfernen, Bettruhe, Hochlag. des Bruches, feuchte Wärme, Entleerung des Darmes durch Irrigationen. Ev. Operation.

Bei Hernia incarcerata, falls noch keine Zeichen v. Gangrän vorhanden, zunächst Taxis zu versuchen. Vorher ein warmes Bad. In neuerer Zeit wird die Application von Schwefeläther wieder empfohlen. In Intervallen von 10—15 Minuten werden 1—2 Esslöffel Aether auf die Bruchgeschwulst und auf die Gegend d. einklemmenden Ringes geträufelt. Nach $^3/_4$—8stündigen Versuchen soll die Reposition in der Regel spontan od. m. leichter Nachhilfe vor sich gehen. Erfolgt dieselbe nicht, Herniotomie.

Herpes, Bläschenflechte.

Behandl. exspectativ. Während der Bläschenbildung Bestreuung mit Amylum; Borken sind zu befetten; passender Schutzverband.

842. Oxydi Zinci 5·0,
Amyl. pur. 30·0.
S. Streupulver.
843. Alum. plumos.,
Pulv. Iridis flor. aa. 2·0.
Amyl. pur. 50·0.
S. Streupulver.
844. Ung. Plumb. 10·0.
Ung. emollient. 20·0.
S. Salbe.

Bei Herpes iris mit Fieber:

845. Chinini sulfur. 1·0,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

Bei Herpes iris im Munde:

846. Kal. chlorici 2·0,
Aq. dest. 200·0,
S. Mundwasser.
847. Tinct. Ratanh. 20·0.
S. Zum Bepinseln.

Gegen die Schmerzen bei Herpes Zoster subcutane Morphium- oder Chloroform-Injectionen oder:

848. Extr. Laud. aq. 5·0,
Empl. Lithargyr. 50·0.
S. Pflaster (zur Bedeckung der betreffenden Partie).
849. Extr. Belladonn. 5·0,
Vaselini 30·0.
S. Salbe.
850. Thiol. liquid. 2·0,
Axung. porci 20·0.
S. Salbe.

Herpes tonsurans.

Bei gering. Ausbreit. Schmierseife und dgl. ausreichend; bei grösserer Ausbreitung Seifenbäder u. nachträgl. Einreibung v. Carbol- od. Salicylsäurelösungen, hierauf Amylum. Bei Herpes tonsurans capillitii d. Verfahren w. b. Favus.

851. Sapon. viridis 50·0.
S. Schmierseife.
852. Spir. sap. kal. 50·0.
S. Zum Abreiben.
853. Acid. carbol.,
Spir. Lavand. aa. 2·0.
Spir. vini Gall. 100·0.
S. Zum Einreiben.
854. Acid. salicyl.,
Spir. Lavandul.
Spir. vini Gal
S. Zum Einre

855. Naphtoli 1·0,
Spir. vin. Gall. 100·0.
S. 2mal tägl. durch 2 bis 3 Tage einzupinseln.

856. Ol. Terebinth. 100·0.
S. Zum Einreiben.

857. Chrysarobin. 5·0,
Lanolin. 25·0,
Adip. suill. 10·0.
S. M. Borstenpins. einzureib.

858. Anthrarobin. 10·0,
Ol. olivar. 30·0,
Lanolin. 60·0.
S. Salbe.

859. Losophan 1·0—2·0,
Spiritus vin. 70·0,
Aq. dest. 25·0.
D. S. Zum Pinseln (auch als 5—20%ige Salbe oder mit Traumaticin 1:10).

860. Resorcin 5·0,
Glycerin 1·0,
Aq. flor. aurant. 20·0,
Spirit. q. s. ad 100·0.
S. Zum Einreiben.

861. Sulf. praecip. 4·0,
Hydrarg. ammoniat. 2·0,
Thymol. 0·6,
Vaselin. 4·0,
Ung. simpl. 30·0.
S. Salbe.

862 Epicarin. 15·0,
Sapon. virid. 200·0,
Zinc. oxyd. 10·0.
MDS. Einreibung.

Bei Herpes tons. maculosus:

863. Sapon. virid. 100·0,
Naphtoli 2·0,
Spir. Lavand. 10·0.
S. An 2 od. 3 Abd. einzureib.

Bei entzündeter Haut sind Salben anzuwenden:

864. Oxydi Zinc. 5·0,
Vaselini 50·0.
S. Salbe.

865. M. praec. alb. 5·0,
Lanolin. p. 40·0.
Vaselini am. 10·0.
S. Salbe.

Auch Schmierseifencyclus (vide Psoriasis) Wilkinson'sche Salbe (Nr. 1373), Pyrogallussalbe (vide Nr. 1364), u. zw. bei Herpes tons. maculosus am Stamm.

Hordeolum, Gerstenkorn.

Warme Kataplasmen (Semmelbrei); rechtzeitige Eröffnung durch einen feinen Stich und Entleerung des Eiters. Bei häufiger Recidive in der entzündungsfreien Zeit Anwendung einer Salbe des Abends.

866. M. praec. fluoi 0·20,
Vaselini 5·0.
S. Salbe.

867. M. praec. rubr. 0·20,
Ung. emollientis 5·0.
S. Salbe.

Hornhauttrübungen.

a) Oberflächliche: Einstäubungen von

868. Calomelan. anglic. 5·00.
Dtr. ad vitr. epistom. citr. claus.
D. Sig. Zum Einstauben.
(Mittelst eines Haarpinsels wird eine feine Wolke des Pulvers auf die Hornhaut gestaubt.)

Oder: Einstreichen von gelber Quecksilbersalbe 0·05—0·10 auf 10 Grm. Vaselin in den Bindehautsack.

b) Tiefe. Falls überhaupt noch Aussicht auf Aufhellung vorhanden ist: Massage mit oder ohne gelbe Präcipitatsalbe. — Anwendung von warmen Umschlägen: 2—3 des Tages durch ½ Stunde. — Elektrolyse.

Hydrokele, Wasserbruch.

Symptomatische Behandlung mittelst Punction. Behufs radicaler Heilung Incision oder Punction mit folgender Injection von Jodlösung, die man nach wenigen Minuten wieder abfliessen lässt. Vorhergehende Cocainisirung empfehlenswerth.

869. Jodi 1·0,
Kali jodat. 2·0,
Aq dest. 50·0.
S. Zur Einspritzung.
870. Tinct. jod. 10·0.
S. Zur Einspritzung.
871. Spiritus 95% 20·0.
S. Zur Einspritzung.

Hydrocephalus, Gehirnhöhlen-Wassersucht.

Beim acuten Hydrocephalus dasselbe Verfahren wie bei Meningitis oder Gehirnhyperämie (Eisumschl., kalte Uebergiessung., reizende Klystiere); Versuch der Quincke'schen Lumbalpunction. Beim chronischen Hydrocephalus der Kinder Behandlung der Rachitis u. Scrophulose, demnach entsprechende Nahrung, Landluft, Ammenmilch, Eisen, Leberthran etc.

872. Jodoform. 1—2·0,
Collodii 10·0.
S. Zur Bepinselung (auf Stirn, Schläfe u. Nacken mehrmals täglich).
873. Ferr. carb. sacch. 3·0,
Sacchari alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. 1 Pulver.
874. Kal. jodat. 2·0,
Aq. dest. 100·0.
Syr. rub. Id. 15·0.
S. Stündl. 1 Kinderlöffel.

Hydrophobie vide: Lyssa.

Hydrops vide: Ascites.

Hyperaemia cerebri, Gehirnhyperämie.

In erster Linie ist der Causal-Indication Rechnung zu tragen (Herzfehler, Emphysem etc.). Erhöhte Lagerung des Kopfes, absolute Ruhe, Verdunkelung des Zimmers. Sodann Blutentziehung in Form von Venaesectio oder Blutegeln an die Schläfen und in den Nacken. Eisumschläge auf d. Kopf, Zufuhr von Wärme an die Extremitäten, Fussbäder m. Senfmehl, ferner energische Abführmittel, in specie Klysmen. Regelung der Lebensweise, geringe Zufuhr von Nahrungsmitteln.

Hyperemesis gravidarum. Unstillbares Erbrechen der Schwangeren.

In leichteren Fällen Gebrauch alkalischer Wasser (Giesshübler, Salvator), Sorge für Stuhlentleerung, fleissige Bewegung. Bei höheren Graden, wenn der Ernährungszustand d. Pat. leidet, Eispillen, Cognac, Champagner. In schweren Fällen, wenn keine Nahrung behalten wird, ernährende Klysmen (Milch, Eidotter, Fleischpancreas etc.). Bei hartnäckigem Leiden Bepinselung d. Portio vaginal. mit 10% Arg. nitr.-Lösung. Wenn alle Mittel erfolglos und Pat. herabkommt, als ultimum refugium Einleitung des Abortus, resp. der künstl. Frühgeburt.

875. Chloroform. gtts. 10,
Aq. dest. 100·0.
S. 10—20 Tropfen nach d. Erbrechen.
876. Morphii mur. 0·2,
Acid. acet. glacial. q. s. ad Chloroform. 5·0, [solut.,
Alcohol. absol. 15·0.
S. 5 Tr. in Zuckerwasser.
877. Cocain. mur. 0·5,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2—3mal tägl. 1 Pulver.
878. Menthol. 1·0,
solve in
Spir. vin. 20·0,
Aq. dest. 150·0.
S. Stündl. 1 Esslöffel.

879. Resorcin 2·0
Aq. dest. 180·0,
Syr. simpl. 20·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

880. Orexin. bas. 0·3—0·5,
d. tal. dos. Nr. X.
S. 3 Pulver tägl. zu nehmen.

Hyperidrosis, profuse Schweissabsonderung.

Bestreuung mit Amylum oder Alumen plumosum pulv. Haut mögl. trocken zu halten; nächst den Genitalien und in der Achselhöhle Einlagen von Baumwolle behufs Vermeidung der Reibung; bei Fussschweiss leichte Fussbekleidung, innen mit Amylumpulver bestreut; auch häufige kalte Waschungen; Tanninbäder, Sublimatbäder, auch Bäder von Decoct. cort. Quercus. Gegen Schweissfüsse empfiehlt sich die Bepinselung der erkrankten Hautstellen mit concentrirt. Formalinlösung oder Fussbader in Formalinlös. (1 Esslöffel Formalin auf 1 Liter Wasser). In hochgradigen Fällen von H. pedum wird die Bepinselung mit 5%iger Chromsäurelösung, welche event. nach 8 Tagen zu wiederholen ist, empfohlen.

881. Ac. salicyl. 1·0—2·50,
Amyl. pur.,
Talc. venet. pulv. aa. 50·0.
S. Streupulver.

882. Acid. chrom. p. 3·0—5·0,
Alcohol.,
Aq. dest. aa. 50·0.
S. Die Fusssohle und die Haut zwischen den Zehen zu bepinseln. (In Zwischenräumen von 8—14 Tagen zu wiederholen.)

883. Ung. Diachyl. 50·0.
S. Salbe (allabendlich aufzulegen, am Morgen mit Vaselin zu entfernen, sodann mit einem der angeführten Streupulver zu bestreuen).

884. Naphtoli 5·0,
Alcohol. 100·0,
Glycerini 10·0.
S. 1—2mal täglich einzutupfen u. darauf Amylum.

885. Amyl. pur. 50·0,
Naphtoli 1·0.
S. Streupulver.

886 Alumnol,
Aristol. aa. 4·0,
Amyl. trit. 15·0.
S. Pulver zum Einstreuen in die Strümpfe.

887. Ammon. sulfoichthyol,
Terebinthin. aa. 5·0,
Ung. Zinci 10·0.
S. Auf die mit Spirit. camphoratus abgeriebenen Füsse einzustreichen.

888. Sudol-Crême 50·0.
S. Morgens und Abends einzureiben.

Gegen das übermässige Schwitzen der Hände:

Oefteres Waschen mit 20%iger alkoholisch. Formaldehydlösung; Hyperidrosis der Phthisiker und der Kachektischen siehe unter Tuberculosis pulmonum.

Hysterie.

Etwaige Anomalien der Menstruation, Chlorose oder Anämie etc. zu behandeln. Rücksicht auf den Zustand des Uterus und der Adnexa. Regulirung der Darmfunctionen. Medicamente (Bromkali) auf d. Anfalle zu beschränken, möglichste Vermeidung aller Narcotica. Bei Dyspnoe infolge von Flatulenz: Brausepulver, Spirit. aether.; bei Gehirnanämie Excitantien. Allgem. psych. Behandl. Passende Beschäftig. und Bewegung in frischer Luft. Massage; Gymnast.; Playfair-Mitchelsche Cur (Zufuhr grosser Mengen Nahrungsmittel bei vollständiger Bettruhe und häufiger Massag der ganzen Körperoberfläch

Psychische Behandlung; Kaltwassercur; Brunnencur in Marienbad oder Franzensbad, Bäder mit Mattoni's Moorextract, Guberquelle, Darkauer Jodsalz, Seebäder; krampfstill. Mittel innerl.; Elektricität in passenden Fällen.

889. Chinin. ferro-citr. 5·0,
Extr. Acor. q. s. f. pill Nr. 100.
S. 3—10 Pillen tägl.

890. Tinct. Valerian. 5·0,
Aq. antihyst. foet. 25·0.
S. 3stündl. 1 Kaffeelöffel.

891. Tinct. Castorei,
Tinct. Valerian. aa. 2·0,
Tinct. Asae foet. 5·0,
Tinct. opii croc. 1·0.
S. 3mal tägl. je 10 Tropf.

892. Kalii bromat.,
Natrii bromat.,
Ammon. bromat. aa. 30·0,
Solve in
Infus. rad. Valerian. e 50·0 ad 500·0.
S. 1 Esslöffel in Thee, 1- bis 3mal tägl.

893. Haemol. bromat. 1·0.
D. tal. dos. Nr. XX.
DS. 3—4 Pulv. tägl. zu n.
Bei hystero-epileptisch. Anfällen

894. Chloral. hydr. 2·0—3·0,
Morphii mur. 0·01—0·02,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p.
S. Auf 1mal zu nehmen.

895. Extr. Belladonn. 1·0,
Oxyd. Zinci 5·0,
Pulv. et muc. gummi arab. q. s. f. pill. Nr. 100.
S. 1—3 Pillen tägl.

896. Duboisin. sulfur. 0·04,
Aq. dest. 20·0.
S. ½—1 Pravaz-Spritze im Anfalle.

Bei Schlaflosigkeit:

897. Paraldehyd. 2·0—2·50 bis 3·0,
Syr. cort. aur. 10·0.
S. Auf 1mal zu nehmen.

898. Sulfonal. 4·0.
Aq. dest. 120·0,
Syr. Diacod. 15·0.
S. Die Hälfte 2 Stunden v. d. Schlafengehen z. n.

899. Chloralamid 2·0,
Aq. dest. 100·0,
Acid. mur. dil. gtts. 4,
Syr. c. aurant. 15·0.
S. Auf einmal zu nehmen.

900. Amylenhydrat 20·0.
S. Abends 1 Kaffeelöffel in 1 Glas Bier nach Umrühren zu nehmen.

901. Somnal. 10·0,
Aq. dest. 45·0.
Syr. rub. Id. 20·0.
S. Abds. 1 Esslöffel voll z. n.

902. Trional 5·0.
Div. in dos. = 5.
S. 1—2 Pulver vor dem Schlafengehen zu nehmen.

Vide auch Insomnia.

Ichthyosis, Fischschuppenkrankheit.

Ausschliessl. locale Behandlung; lauwarme Bäder; Einreibungen m. Fett, Oel, Leberthran, Lanolin, Schmierseife (s. Psoriasis). Maceration d. Kautschukleinwand.

903. Natr. carb. 300·0.
S. Ins Bad.

904. Naphtol. 2·5,
Vaselin. 20·0,
Lanolin. 30·0.
S. Einreibung.

905. Resorcin. p. 2·0,
Vaselin. 20·0,
Lanolin. 30·0.
S. Einreibung.

Nach Abstossung der verdickten Haut Einreibung mit:

906. Lanolin. 40·0,
Ol. olic. 10·0.
S. Aeusserlich.

Icterus, Gelbsucht.

Die Behandlung berücksich
die ursächlichen Verhältnisse

879. Resorcin 2·0
Aq. dest. 150·0,
Syr. simpl. 20·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

880. Orexin. bas. 0·3—0·5,
d. tal. dos. Nr. X.
S. 3 Pulver täyl. zu nehmen.

Hyperidrosis, profuse Schweissabsonderung.

Bestreuung mit Amylum oder Alumen plumosum pulv. Haut mögl. trocken zu halten; nächst den Genitalien und in der Achselhöhle Einlagen von Baumwolle behufs Vermeidung der Reibung; bei Fussschweiss leichte Fussbekleidung, innen mit Amylumpulver bestreut; auch häufige kalte Waschungen; Tanninbäder, Sublimatbäder, auch Bäder von Decoct. cort. Quercus. Gegen Schweissfüsse empfiehlt sich die Bepinselung der erkrankten Hautstellen mit concentrirt. Formalinlösung oder Fussbäder in Formalinlös. (1 Esslöffel Formalin auf 1 Liter Wasser). In hochgradigen Fällen von H. pedum wird die Bepinselung mit 5%iger Chromsäurelösung, welche event. nach 8 Tagen zu wiederholen ist, empfohlen.

881. Ac. salicyl. 1·0—2·50,
Amyl. pur.,
Talc. venet. pulv. aa. 50·0.
S. Streupulver.

882. Acid. chrom. p. 3·0—5·0,
Alcohol.,
Aq. dest. aa. 50·0.
S. Die Fusssohle und die Haut zwischen den Zehen zu bepinseln. (In Zwischenräumen von 8—14 Tagen zu wiederholen.)

883. Ung. Diachyl. 50·0.
S. Salbe (allabendlich aufzulegen, am Morgen mit Vaselin zu entfernen, sodann mit einem der angeführten Streupul- bestreuen).

884. Naphtoli 5·0,
Alcohol. 100·0,
Glycerini 10·0,
S. 1—2mal täglich einzutupfen u. darauf Amylum.

885. Amyl. pur. 50·0,
Naphtoli 1·0.
S. Streupulver.

886 Alumnol,
Aristol. aa. 4·0,
Amyl. trit. 15·0.
S. Pulver zum Einstreuen in die Strümpfe.

887. Ammon. sulfoichthyol.,
Terebinthin. aa. 5·0,
Ung. Zinci 10·0.
S. Auf die mit Spirit. camphoratus abgeriebenen Füsse einzustreichen.

888. Sudol-Crème 50·0.
S. Morgens und Abends einzureiben.

Gegen das übermässige Schwitzen der Hände:

Oefteres Waschen mit 20%iger alkoholisch. Formaldehydlösung; Hyperidrosis der Phthisiker und der Kachektischen siehe unter Tuberculosis pulmonum.

Hysterie.

Etwaige Anomalien der Menstruation, Chlorose oder Anämie etc. zu behandeln. Rücksicht auf den Zustand des Uterus und der Adnexa. Regulirung der Darmfunctionen. Medicamente (Bromkali) auf d. Anfälle zu beschränken, möglichste Vermeidung aller Narcotica. Bei Dyspnoe infolge von Flatulenz: Brausepulver, Spirit. aether.; bei Gehirnanämie Excitantien. Allgem. psych. Behandl. Passende Beschäftig. und Bewegung in frischer Luft. Massage; Gymnast.; Playfair-Mitchelsche Cur (Zufuhr grosser Mengen Nahrungsmittel bei vollständiger Ruhe und hä[illegible]

Psychische Behandlung; Kaltwassercur; Brunnencur in Marienbad oder Franzensbad, Bäder mit Mattoni's Moorextract, Guberquelle, Darkauer Jodsalz, Seebäder; krampfstill. Mittel innerl.; Elektricität in passenden Fällen.

889. *Chinin. ferro-citr. 5·0,*
Extr. Acor. q. s. f. pill Nr. 100.
S. 3—10 Pillen tägl.

890. *Tinct. Valerian. 5·0,*
Aq. antihyst. foet. 25·0.
S. 3stündl. 1 Kaffeelöffel.

891. *Tinct. Castorei,*
Tinct. Valerian. aa. 2·0,
Tinct. Asae foet. 5·0,
Tinct. opii croc. 1·0.
S. 3mal tägl. je 10 Tropf.

892. *Kalii bromat.,*
Natrii bromat.,
Ammon. bromat. aa. 30·0,
Solve in
Infus. rad. Valerian. e 50·0 ad 500·0.
S. 1 Esslöffel in Thee, 1- bis 3mal tägl.

893. *Haemol. bromat. 1·0.*
D. tal. dos. Nr. XX.
DS. 3—4 Pulv. tägl. zu n.

Bei hystero-epileptisch. Anfällen

894. *Chloral. hydr. 2·0—3·0,*
Morphii mur. 0·01—0·02,
Sacch. alb. 2·0,
M. f. p.
S. Auf 1mal zu nehmen.

895. *Extr. Belladonn. 1·0,*
Oxyd. Zinci 5·0,
Pulv. et muc. gummi arab. q. s. f. pill. Nr. 100.
S. 1—3 Pillen tägl.

896. *Duboisin. sulfur. 0·04,*
Aq. dest. 20·0.
S. 1/2—1 Pravaz-Spritze im Anfalle.

Bei Schlaflosigkeit:

897. *Paraldehyd. 2·0—2·50 bis 3·0,*
Syr. cort. aur. 10·0.
S. Auf 1mal zu nehmen.

898. *Sulfonal. 4·0.*
Aq. dest. 120·0,
Syr. Diacod. 15·0.
S. Die Hälfte 2 Stunden v. d. Schlafengehen z. n.

899. *Chloralamid 2·0,*
Aq. dest. 100·0,
Acid. mur. dil. gtts. 4,
Syr. c. aurant. 15·0.
S. Auf einmal zu nehmen.

900. *Amylenhydrat 20·0.*
S. Abends 1 Kaffeelöffel in 1 Glas Bier nach Umrühren zu nehmen.

901. *Somnal. 10·0,*
Aq. dest. 45·0,
Syr. rub. Id. 20·0.
S. Abds. 1 Esslöffel voll z. n.

902. *Trional 5·0.*
Div. in dos. = 5.
S. 1—2 Pulver vor dem Schlafengehen zu nehmen.

Vide auch Insomnia.

Ichthyosis, Fischschuppenkrankheit.

Ausschliessl. locale Behandlung; lauwarme Bäder; Einreibungen m. Fett, Oel, Leberthran, Lanolin, Schmierseife (s. Psoriasis). Maceration d. Kautschukleinwand.

903. *Natr. carb. 300·0.*
S. Ins Bad.

904. *Naphtol. 2·5,*
Vaselin. 20·0,
Lanolin. 30·0.
S. Einreibung.

905. *Resorcin. p. 2·0,*
Vaselin. 20·0,
Lanolin. 30·0.
S. Einreibung.

Nach Abstossung der verdickten Haut Einreibung mit:

906. *Lanolin. 40·0,*
Ol. olio. 10·0.
S. Aeusserlich.

Icterus. Gelbs

Die Behandlu
die ursächlicher

die einzelnen Symptome. Daher sind Mittel zu verabfolgen gegen Catarrh des Magens und des Duodenums (siehe diese); bei Fieber Bettruhe und Diät; bei Schmerzen in der Lebergegend Umschläge. Ferner Stuhl u. Harn befördernde Mittel; gegen das Hautjucken sind sehr warme Bäder zuweilen von Effect. Grosse Darmirrigationen von kaltem Wasser; innerhalb 24 Stunden je eine Darmeingiessung von 1 bis 2 Litern unter anfänglicher Temperatur von 15°, später von 22°. Karlsbad.

907. Natr. bicarb.,
Sacch. alb. (od. Pulv. rad. rhei) aa. 15·0
S. Messerspitzweise nach dem Essen.

908 Extr. nuc. vom. 0·02,
Pulv. rad. rhei 2·0,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Tägl. 3 Pulver.

Bei Stuhlverstopf.: Marienbader Kreuzbrunn, wenig Bitterwasser oder:

909. Extr. Rhei ch.,
Extr. Aloës aquos. 3·0,
Pulv. Trifol. fibr. q. s.
ut f. pill. Nr. 50.
S. Früh und Abds. je 3 Pill.

910. Decoct. Tamarind. e 20·0
Acidi tartar. 2·0 [ad 150·0
Syr. mannat. 20·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

911. Podophyllin. 0·20,
Extr. hyosciam. 0·10,
Elaeosacch. anisi 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2 Pulver täglich.

Gegen das Hautjucken bei Icterus Essigwaschungen, Citronensaft, Carbolöl, warme Bäder, oder:

912. Menthol. (oder Acid. salicyl.) 2·0,
Spir. vini 50·0.
S. Aeusserlich.

Bei Kindern:

Bettruhe, strenge Diät (Milch, wenig Suppe). Behufs Erzielung ausgiebiger Entleerungen:

913. Tinct. Rhei aquos. 50·0.
S. 3—4 Essl. im Tage.

Ileus, Volvulus, Darmverschluss.

Berücksichtigung der Ursache. Sistirung jeglicher Nahrungszufuhr. Gegen den Durst Eispillen. Nur bei durch Koprostase bedingtem Ileus kräftige Abführmittel, in allen anderen Fällen Ruhestellung des Darms durch Opium:

914. Extr. opii aquos. 0·3,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2ständl. 1 Pulver.

Bei heftigen Schmerzen und Erbrechen Eispillen, Morphiuminjectionen. Hegar'sche Irrigationen: Eingiessungen von 2—4 Liter Wasser, 10% Kochsalzlösung, oder:

915. Magnes. sulfur. 150·0,
Aq. font. 500·0.
S. Zusatz zu 2 Liter Wasser zur Eingiessung.

Wenn das Hinderniss i. Dünndarm sitzt, können Magenausspülungen von Erfolg sein. Auch der constante Strom (der eine Pol im Rectum, der andere auf der Bauchwand) wird empfohlen. Luftinsufflation in d. Mastdarm. v. Ziemssen empfiehlt d. Aufblähung des Dickdarms durch Entwickelung von Kohlensäure im Mastdarm vermittelst getrennter Einbringung von Natr. bicarbon. und Weinsteinsäurelösung. Prolongirte heisse Bäder. Wenn alle diese Mittel nicht rasch wirken, operative Behandlung — Laparotomie, eventuell [illegible]

Impetigo, Pustelflechte.

Ermittelung des ursächlichen Momentes und Beseitigung der schädlich. Potenzen; Erweichung der Borken durch Fett oder Oel, sodann Bäder und Umschläge mit blossem Wasser oder medicamentösen Zusätzen; Salben, Carbolverband, Gypstheerpulver.

916. *Bismuth. subnitr. 3·0.*
Ung. simpl. 30·0.
S. Salbe.

917. *Merc. praecip. alb. 2·0.*
Vaselin.,
Lanolin. aa. 15·0.
S. Salbe.

Impotenz.

Rücksichtnahme auf ev. organ. Leiden, auf psychische Momente. In diesen Fällen, sowie bei vorausgegangener Onanie Hebung des Selbstbewusstseins, Elektricität, Hydrotherap., Eisencuren, Suspension mittelst des Sayre'schen Apparates. Locale Behandlung allfälliger veralteter Tripperformen durch Aetzungen der Pars prostatica u. durch Inject. mittelst Katheterspritze (vide: Pollutionen, Blennorrhoea urethrae u. Cystitis). Anwendung der Kühlsonde, durch welche man Wasser, anfangs von 14—16° R., dann sinkend bis zu 9—10° R. strömen, und die man 5—30 Minuten liegen lässt. Von guter Wirkung sind in manchen Fällen Urethralsuppositorien, die mittelst d. Dittel'schen Porte-remède in die Pars prostatica gebracht werden:

918. *Acid. tannic. 0·5.*
But. Cacao q. s. ut f.
suppos. urethral. longitud.
centim. 2. Nr. 5.
S. In den ersten Tagen je
½, später je 1 Supposit. ein-
zuführen.

919. *Zinci phosphorati 0·6.*
Extr. nuc. vom. 2·0.
Extr. avori q. s. f. pill.
Nr. 100.
S. 3 Pillen tägl.

920. *Extr. Damian. fluid. 30·0.*
Tinct staphysagriae 15·0.
Aq. dest. 120·0.
MDS. 2mal täglich 1 Ess-
löffel voll.

Influenza (Grippe).

Symptomatische Therapie. — Gegen Kopf- u. Muskelschmerzen Chinin, Antipyrin, Phenacetin, Exalgin, Salophen. Behandl. des Bronchialcatarrhs (s. Bronchitis), Kreosotpräparate, roborirende Medication d. gastrischen Störungen mit Menthol, Benzonaphtol. Anfangs Calomel, Ricinusöl, Wein, Bettruhe, Schutz vor Erkältung während d. Reconvalescenz.

921. *Antipyrin. 4·0.*
Alcohol. 10·0.
Aq. dest. 100·0.
Syr. Altheae 60·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

922. *Salipyrin 0·50—1·0.*
Ad nebul.
Da tal. dos. Nr. sex.
S. 2—3mal tgl. 1 Pulv. z. u.
(Kindern 0·1—0·4).

923. *Salophen 0·5.*
D. tal. dos. Nr. X.
S. 2ständlich 1 Pulver (bis zur Linderung d. neuralgischen Schmerzen).

924. *Phenacetin.*
Sacch. alb. aa. 0·25.
M. f. p. da tal. dos. Nr. 10.
S. 3 Pulver täglich.

925. Jodopyrin. 1·
M. f. pulv. d
S. Täglich

926. Citroph
D. tal. d
S. 3 - 4

961. Methylenblau 0·1,
Exh. in caps. gelat.
D. tal. dos. Nr. X.
S. Täglich 5 Kapseln in Zwischenräumen v. 2—3 Stunden zu nehmen. (Gegen eventuell sich einstellende Blasenbeschwerden und vermehrten Harndrang mehrere Male tägl. eine gehäufte Messerspitze von gepulverter Muskatnuss.)

962. Sol. arsen. Fowler. 5·0.
S. 3—5 Tropfen 4mal tägl. (in der anfallfreien Zeit).

Bei Kindern:

963. Chinin. tannic.,
Sacch. alb. aa. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 6.
S. Tägl. 3 Pulver in Milch gelöst, in 3stündl. Intervallen. (Für Säuglinge.)

964. Chinin. bisulf. 0·8,
Decoct. Alth. 50·0.
Tr. opii simpl. gtt. III.
S. Zum Klystier. (Für 5- bis 8jährige Kinder.)

965. Euchinin. 0·1—0·2,
Sacch. alb 0·2.
M. f. p. dent. tal. dos. Nr. VI.
S. Täglich 2 Pulver.

Intertrigo, Frattsein.

Streupulver in leichten Fällen; in Fällen von Excoriationen und Geschwürsbildung Salben nach vorhergeh. Wasch. m. lauwarm. Seifenwasser oder Kleienabsud.

966. Amyl. pur. 50·0.
S. Streupulver.

967. Oxydi Zinci (od. Acid. borici) 5·0
Amyli pur. 50·0.
S. Streupulver.

968. Alum. plumos.,
Pulv. r. Ireos fl. aa. 5·0,
Amyl. pur. 50·0.
S. Streupulver.

969. Magn. ust. pulv. 5·0,
Talci ven. 20·0,
Ac. salicyl. 0·20.
S. Streupulver.

970. Tannoform. 10·0,
Talci pulv. 20·0.
S. Zum Einpudern

Streupulver eignen sich für Fälle ohne Excoriationen.

971. Oxydi Zinci (od. Acid Vaselini 50·0. [borici) 5·0.
S. Salbe.

972. Merc. praecipit. alb.,
Oxydi Zinci aa. 2·0.
Vaselini 50·0.
S. Salbe.

Vor Erneuerung der Salbe Waschungen angezeigt.

973. Ac. salicyl. 2·0.
Vaselini 50·0.
Zinci oxydat.,
Amyl. pur. aa. 25·0.
S. Pasta.

974. Cocaini olein. 0·5—1·0,
Lanolini 18·0.
Ol. Olivar. 2·0.
S. 2mal täglich einzureiben und hierauf einzupudern.

Iritis, Regenbogenhautentzündung.

Berücksichtigung d. ursächlich. Momente: Einreibungscur etc. bei Syphilis, Salicylsäure b. rheumat. Form; in manch. Fällen Bettruhe; Atropineinträufel., Verdunkelung d. Zimmers, Schutzbrillen, keinerlei Anstrengungen der Augen, Sorge für Leibesöffnung, Blutegel. Bei starken Schmerzen heisse Umschläge. Zur Zerreissung hartnäckiger Synechien, als stärkeres Mydriaticum Hyoscin oder der abwechs. Gebr. eines Mioticum u. Mydriaticum (Eserin u. Atropin).

975. Atropini sulf. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropf. (je 1—2 Tropf. in d. Bindehautsack einzuträuf.).

Bei Atropin-Conjunctivitis ist dieses zu sistiren; auch Intoxicationserscheinungen können sich einstellen.

Als Ersatzmittel des Atropins gilt Duboisin:

976. Duboisini 0·03,
Aq. dest. 3·0.
S. Augentropfen.

977. Homatropini hydrobrom
Aq. dest. 10·0. [0·10.
S. Augentr. (sehr schwaches Mydriaticum).

978. Scopolamin. hydrobrom.
Aq. dest. 20·0. [0·2—0·4.
S. Augentropfen.

979. Extr. Bellad. 1·50,
Ung. cinerei 10·0.
S. Auf Stirne und Schläfe erbsengross einzureiben.

980. Natr. salicyl. 10·0.
Div. in dos. = 5.
D. ad caps. amyl.
S. Täglich 1—3 Pulv.
Bei grossem Schmerze und Lichtscheu.

981. Cocaini mur. 0·25.
Atropini sulf. 0·03,
Aq. dest. 5·0.
S. Augentropfen.

982. Morphii mur.,
Atropin. sulf. aa. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

983. Hyoscini hydrojod. 0·01,
Aq. dest. 5·0.
S. Augentropfen. (1 Tropfen einzuträufeln; Intoxicationsgefahr grösser als bei Atropin!)

984. Eserini sulf. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropf. (Mioticum).

985. Pilocarpini mur. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropf. (Mioticum).
Bei Syphilis Einreibungscur, eventuell:

986. Kal. jodat. 5·0,
Aq. dest. 150·0,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Früh, Mitt. u. Abs. 1 Essl.

987. Calomelanos 0·10,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 2 Pulver täglich.

Auch subcutane Inject. v. Mercurial-Präparat., vide: Syphilis.

Ischias, Hüftweh.

Berücksichtigung d. ursächlich. Momentes; im Falle von Constipation sind Abführmittel anzuwenden, bei Erkaltungsursache Dampfbäder, Moorbad. (Mattoni's Moorsalz mit Darkauer Jodsalz) und locale Hautreize, Natr. salicyl. innerlich; Einreibung von Ichthyol; Massage in Verbindung mit entsprechender Gymnastik, Elektricität, Points de feu, blutige Nervendehnung; in unheilbaren Fällen subcutane Morphium-Injectionen. Nebst Jod zuweilen auch Salicylsäure. Innerlich Lactophenin, Salipyrin, Analgen u. andere Antineuralgica (vgl. Neuralgia trigemini).

988. Tinct. Jodinae 20·0.
S. Zum Bepinseln.

989. Kal. hydrojod. 5·0,
Aq. dest. 150·0,
Syr. simpl. 15·0,
S. Früh. Mitt. u. Ab. 1 Essl.

990. Acid. salicyl. 5·0.
F. Pulv. div. in dos. = 10.
S. 1—2ständl. 1 Pulver in Oblaten.

991. Natr. salicyl. 10·0.
F. Pulv. div. in dos. = 10.
S. 1—2ständl. in Oblat. z. n.

992. Ol. Tereb. rectif. 5·0.
Magnes. carb. q. s.
ut f. pil. Nr. 50.
S. Früh u. Abends je 5 Pill.

993. Chloroform 2·0,
Aq. dest. 100·0.
Vitelli ovi Nr. I. [(Erb.)
S. 3 Klystieren zuzusetzen.

Keratitis, Hornhautentzündung.

Berücksichtigung lichen Momente, (Bindehautentzün primär (Scrophul

961. Methylenblau 0·1.
Exh. in caps. gelat.
D. tal. dos. Nr. X.
S. Täglich 5 Kapseln in Zwischenräumen v. 2—3 Stunden zu nehmen. (Gegen eventuell sich einstellende Blasenbeschwerden und vermehrten Harndrang mehrere Male tägl. eine gehäufte Messerspitze von gepulverter Muskatnuss.)

962. Sol. arsen. Fowler. 5·0.
S. 3—5 Tropfen 4mal tägl. (in der anfallfreien Zeit).

Bei Kindern:

963. Chinin. tannic.,
Sacch. alb. aa. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 6.
S. Tägl. 3 Pulver in Milch gelöst, in 3stündl. Intervallen. (Für Säuglinge.)

964. Chinin. bisulf. 0·8,
Decoct. Alth. 50·0.
Tr. opii simpl. gtt. III.
S. Zum Klystier. (Für 5- bis 8jährige Kinder.)

965. Euchinin. 0·1—0·2,
Sacch. alb 0·2.
M. f. p. dent. tal. dos. Nr. VI.
S. Täglich 2 Pulver.

Intertrigo, Frattsein.

Streupulver in leichten Fällen; in Fällen von Excoriationen und Geschwürsbildung Salben nach vorhergeh. Wasch. m. lauwarm. Seifenwasser oder Kleienabsud.

966. Amyl. pur. 50·0.
S. Streupulver.

967. Oxydi Zinci (od. Acid. borici) 5·0
Amyli pur. 50·0.
S. Streupulver.

968. Alum. plumos.,
Pulv. r. Ireos fl. aa. 5·0,
Amyl. pur. 50·0.
S. Streupulver.

969. Magn. ust. pulv. 5·0,
Talci ven. 20·0,
Ac. salicyl. 0·20.
M. f. pulver.

970. Tannoform. 10·0,
Talci pulv. 20·0.
S. Zum Einpudern
Streupulver eignen sich für Fälle ohne Excoriationen.

971. Oxydi Zinci (od. Acid Vaselini 50·0. (borici) 5·0.
S. Salbe.

972. Merc. praecipit. alb.,
Oxyli Zinci aa. 2·0,
Vaselini 50·0.
S. Salbe.
Vor Erneuerung der Salbe Waschungen angezeigt.

973. Ac. salicyl. 2·0,
Vaselini 50·0.
Zinci oxydat.,
Amyl. pur. aa. 25·0.
S. Pasta.

974. Cocaini olein. 0·5—1·0,
Lanolini 18·0.
Ol. Olivar. 2·0.
S. 2mal täglich einzureiben und hierauf einzupudern.

Iritis, Regenbogenhautentzündung.

Berücksichtigung d. ursächlich. Momente: Einreibungscur etc. bei Syphilis, Salicylsäure b. rheumat. Form; in manch. Fällen Bettruhe; Atropineinträufel., Verdunkelung d. Zimmers, Schutzbrillen, keinerlei Anstrengungen der Augen, Sorge für Leibesöffnung, Blutegel. Bei starken Schmerzen heisse Umschläge. Zur Zerreissung hartnäckiger Synechien, als stärkeres Mydriaticum Hyoscin oder der abwechs. Gebr. eines Mioticum u. Mydriaticum (Eserin u. Atropin).

975. Atropini sulf. 0·05.
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropf. (je 1—2 Tropf. in d. Bindehautsack einzuträuf.).

Bei Atropin-Conjunctivitis ist dieses zu sistiren; auch Intoxicationserscheinungen können sich einstellen.



Refrigerium etc.) und eventuell Allgemeinbehandlung. Atropin-Einträufelung, eventuell Schutzverband, Schutzbrillen; bei intensiven Schmerzen in sonst kräftigen Individuen Blutegel; körperl. u. Augenruhe; leichte Abführmittel.

994. Atropini sulf. 0·05.
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

995. Scopolamin. hydrobrom.
Aq. dest. 20·0. [0·2,
S. Augentropfen.

Gegen Lichtscheu und Schmerz:

996. M. praec. alb. 1·0,
Extr. Belladonn. 1·50,
Ung. simpl. 10·0.
S. Bohnengross an Stirne und Schläfe einzureiben.

997. Cocaini mur. 0·10,
Aq. dest. 5·0.
S. Augentropfen.

Gegen intensive u. ausstrahlende Schmerzen:

998. Extr. Belladonn. 1·0,
Ung. cinerei 10·0.
S. Auf Stirne und Schläfe einzureiben.

999. Extr. Opii aq. 0·50,
Ung. Hydrarg. 10·0.
S. Wie vorher.

Wenn keine Reizungserscheinung vorhanden sind und zur Aufhellung der Trübungen:

1000. Calomelan. laevig. 5·0.
S. Zu Handen des Arztes.
(Zum Einstreuen in den Bindehautsack.)

1001. Jodoformi od. *Dermatol.*
S. Wie vorher. [*pulv. 5·0.*

1002. M. praecip. flav. 0·20,
Vaselini 5—10·0.
M. exactiss., f. Ung. ophth.
S. Stecknadelkopfgross auf die abgezogene Lidbindehaut gleichmässig zu vertheilen.
(Pagenstecher'sche Salbe.)

1003. Tinct. Opii croc. 5·0.
S. Je 1 Tropfen in den Bindehautsack einzutr.

Zur Aufhellung v. Trübungen auch Massage und Elektrolyse empfohlen.

Bei Keratitis scrophulosa Haller Jodwasser oder:

1004. Kal. jodat. 1·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

Vide: Ulcus corneae.

Keuchhusten vide: Tussis convulsiva.

Laryngismus stridulus vide: Spasmus glottidis.

Laryngitis acuta, acuter Kehlkopfcatarrh.

Priessnitz'sche Ueberschläge um den Hals, leichte schweisstreibende Mittel (Fliederthee); Ruhe und gleichmässige Temperatur. Meidung kalt. Getränke; empfehlenswerth Selterswasser, Giesshübler mit Milch; Radeiner, Krondorfer, Salvator; Milderung des Hustenreizes durch Brustthee, Eibischthee, Haferschleim, Inhalationen, Narcotica. Bei stärkeren Entzündungserscheinungen Abführmittel, Eisumschläge, Eispillen, Senfteige auf den Hals. Locale Behandlung besonders anfangs nur mit grosser Vorsicht.

Bei Kindern Bettruhe, feucht. Zimmerluft, Priessnitz-Umschläge, warme Limonade, warmes Zuckerwasser; bei schwerer Respiration statt der bisher üblichen Brechmittel Einathmung heisser Wasserdämpfe, selbst bei klein. Kindern leicht ausführbar durch Thätigkeit des Inhalationsapparats unter der über d. Gesicht gehobenen Decke.

1005. Codein. 0·15,
Spirit. q. s.
Aq. amygdal. am. ad 15·0.
S. 3ständlich 15 Tropfen.

1006. Heroin. 0·005—0·02,
d. tal. dos. Nr. VI.
DS. 3 Pulv. tägl. zu nehm.
1007. Dionin 0·3,
Aq. dest. 20·0.
S. 2—3mal tägl. 15 Tropf. in Zuckerwasser.
1008. Pulv. Doweri,
Natr. bicarb.,
Sacch. alb. aa. 1·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh, Mittags und Abends 1 Pulver.
1009. Aq. Lauroc. 10·0.
Mur. Morphii 0·05.
S. Jede 2. Stunde je 10 Tr.
1010. Extr. Hyosciam. 0·05,
Pulv. gummos. 0·5.
D. tal. dos. Nr. VI.
S. 2—3ständl. 1 Pulver.
1011. Cocaini mur. 0·25—0·50
Aq. dest. 250·0.
S. Zu Inhalationen.
1012. Aq. Lauroc. 10·0,
Mur. Morphii 0·10.
S. Je 10 Tropfen in das zu inhalirende Flüssigkeitsquant.
1013. Morphii mur. 0·20,
Alum. crud. pulv. 2·0,
Sacch. alb. 15·0.
S. Zum Einblasen mit Hilfe des Kehlkopfspiegels und des hiezu geeigneten Instrumentes.
1014. Cocaini mur. 0·20—0·50,
Bism. subnitr.,
Sacch. alb. aa. 5·0,
Morph. mur. 0·20.
S. Zur Insufflation.
1015. Apomorph. mur. 0·10,
Aq. dest. 10·0.
S. Zu subcut. Inj.

Bei Kindern:

1016. Inf. rad. Ipecac. e 0·30 ad 80·0,
Syr. rub. Id. 20·0.
S. Ständl. 1 Kinderlöffel.
1017. Mixt. oleos. 100·0,
Aq. Lauroc. gtts. 20,
Syr. Ipecac. 10·0.
S. Stündl. 1 Kaffeelöffel.
1018. Dec. Althaeae 100·0,
Sal. Ammon. dep. 1·0,
Syr. cap. Ven. 10·0.
S. Ständl. 1 Kaffeelöffel.

Bei Anämie, Scrophulose etc. Berücksichtigung des Allgemeinzustandes u. insbesond. Regelung der Diät.

Laryngitis chronica, chron. Kehlkopf-Catarrh.

Ermittelung d. Ursache (häufig bei starken Rauchern u. Trinkern) u. allenfallsige allgem. Behandlung (Syphilis, Tuberculose, Stimmbandlähmung). Jedweder Reiz auf d. Kehlkopf hintanzuhalten; Vermeidung von kalten Getränken, von Alkoholicis, reizend. Speisen, staubigen oder raucherfüllten Locale n; Verbot des Ausgehens bei Wind und Staub, des Rauchens etc. Starker Hustenreiz durch Narcotica zu mildern. Inspersionen pulverisirter Medicam. mit Hilfe eines einfachen Pulverbläsers und Kehlkopfspiegels. Man insperg.: Alum. crud. pulv., Ac. tannic., Plumb. acet., Sacch. alb. allein oder mit Narcoticis. Einpinselungen (anfangs schwacher Lösungen) unter Controle des Kehlkopfspiegels mit Hilfe des Aetzpinsels.

1019. Extr. Belladonn. 0·50,
Alum. crud. pulv.,
Sacch. alb. aa. 5·0.
S. Z. Einblasen. (Insufflation mit Hilfe d. Kehlkopfspiegels.)
1020. Morphii muriat. 0·05.
Tannini pur.,
Sacch. alb. aa. 5·0.
S. Zum Einblasen.
1021. Pulv. Dower.,
Sacch. alb. aa. 5·0.
S. Zum Einblasen.
1022. Zinc. sozojodol. 1·0,
Sacch. lactis 10·0.
S. Zum Einblasen.

1023. Argent. nitr. cryst. 1·0—2·0—5·0—10·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Zum Bepinseln.
(Im Beginne die schwächeren, allmälig die stärkeren Lapislösungen zu verwenden.)
In geeigneten Fällen durch 10 bis 20 Minuten Inhalationen v. adstring. Mitteln, ferner Ol. Tereb., Juniperi etc. (Vide: Anhang.)

Gegen den Husten:

1024. Aq. Laurocer. 10·0.
Morph. mur. 0·10.
S. Tropfen.
1025. Extr. Belladonn. 0·10,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. 1 Pulver.
1026. Morph. mur. 0·10,
Pulv. rad. Ipecac. 0·20,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. 1 Pulver.
1027. Codein. p. 0·10—0·15,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3mal tägl. 1 Pulver.
Heroin und Dionin, s. bei Laryngitis acuta.
Bei Schlaflosigkeit: Chloralhydrat, Sulfonal etc.

Laryngitis crouposa (häutige Bräune, Angina membranacea, Croup)

vide: Diphtheria pharyngis et laryngis.

Laryngospasmus, Stimmritzenkrampf.

Bei Kindern causale Behandlung der Rachitis und Scrophulose. *Regelung d. Diät; ausschl. animalische Kost, Gröss. Pausen zwischen den Mahlzeiten. Statt künstlicher Ernährung Ammenmilch. Im Anfalle energische Hautreize, Sinapismen*, Einreibung mit Senfspiritus, Bespritzen d. Gesichtes mit kaltem Wasser, lauwarmes Bad m. kalten Uebergiessungen, Inductionsstrom auf die Nervi phrenici. In den anfallsfreien Zeiten Nervina.

1028. Apomorphin. mur. 0·05,
Acid. mur. dil. gtts. 5,
Aq. dest. 10·0.
S. 1—2 Spritzen subcutan.
1029. Infus. chamomill. e 10·0 : 100,
Tct. Asae foetid. 2·0.
S. Auf 2 Klystiere.
1030. Moschi 0·5.
Mixt. gummos. 100·0.
S. Ständl. 1 Kinderlöffel.
1031. Chloral. hydrat. 1·0.
Aq. dest. 100·0.
S. Ständlich 1 Kinderlöffel.
1032. Kal. bromat. 3·0.
Aq. dest. 90·0,
Syr. simpl. 10·0.
S. Auf 3mal zu nehmen.
Bei L. der Erwachsenen Behandlung der zu Grunde liegenden Hysterie, Chorea; Einathmen v. heiss. Wasserdämpfen, eventuell m. Zusatz von Chloroform (40 Tropfen auf 1 Liter Wasser)
1033. Zinc. valerian.,
Asae foetid. aa. 1·0.
Pulv. et Extr. Gent. q. s. u. f. pill. Nr. 20.
S. Morgens und Abends 1 Pille zu nehmen.

Lepra.

Innerliche Darreichung von Kreosot, Natrium salicyl., Arsen, Eisenpräparaten, Jod.-Local., Tr. Jodi, Empl. hydrargyri, Chrysarobin, Pyrogallus, Empl. sapon. salicyl. Gegen die Parästhesien und Hyperästhesien Elektricität, Strychnin, Morphin, Heroin, Cocain. Neuerdings wieder Chaulmoogra-Oel empfohlen zu subcut. Injectionen — 5 Grm. pro die. Symptomat. Behandlung. Sorg

für Licht, Luft, gute Ernährung, Klimawechsel. Für Lepragegenden Assanirungs-Bestrebungen. Leproserien.

Leukaemie.

Causale Behandl. bei Syphilis, Malaria. Zur Verkleinerung chron. Milztumoren wurden parenchymatöse Injectionen von Extr. secal. corn., Sol. ars. Fowleri mit Erfolg ausgeführt. Roborir. Diät, Landluft, Eisen- und Arsenpräparate (Guberquelle), Radlauer's Eisen albumin - Peptonat - Essenz. (S. Chlorose.)

1034. Sol. arsen Fowleri 5·0,
Aq. dest. 10·0.
S. 3mal tägl. 10 Tropfen, allmälig bis 20 Tropfen steigen.

1035. Kali jodat. 2·0,
Aq. dest. 150·0.
S. 2ständlich 1 Esslöffel.

1036. Chinin. muriat.,
Sacch. alb, aa. 2·9.
Div. in dos. = 10.
S. 2ständlich 1 Pulver.

1037. Syrup. ferr. jodat. 100·0.
S. 2mal täglich 1 Theelöffel.

Leukorrhoe vid.: Fluor albus.

Lichen, Knötchenflechte.

Bei L. scrophulosorum innerlich und äusserlich Leberthran; bei L. pilaris Seifenwaschung u. Einreibung irgend einer weich. Salbe; bei L. ruber Arsenikpräparate (vide Psoriasis). Innerlich Guberquelle. Statt der innerlichen Behandlung wird Carbol-Sublimat- [illegible] empfohlen.

[illegible]bol. 20·0.
[illegible]r. 0·5—1·0.
[illegible]. 500·0.
[illegible]des Tages über [illegible]per einzureiben.
(Unna.)

1039. Merc. praec. alb. 3·0,
Vaselin.,
Lanolin. aa. 15·0.
S. An die juckenden Stellen einzureiben.

1040. Chrysarobin 5·0,
Traumaticin 50·0.
S. Zum Einpinseln.

Lupus, fressende Flechte.

Auskratzen mit dem scharfen Löffel, Sticheln mit einem Spitzbistouri od. einer Stichellanze od. multiple, lineare Scarification bei localer Aetheranästhesie; Watteverband. Aetzung d. Knoten und Infiltrate, besonders im Gesichte zweimal wöchentlich mit einem gut gespitzten Lapisstifte, Pacquelin's Thermokauter etc. Chirurgische Behandlung durch Exstirpation mit nachfolgender Thiersch'scher Transplantation oder Lappenplastik (Lang), Röntgentherapie, Scarification und Kreosotapplication. Bei Kindern zuvor Versuche mit gelinden Mitteln, Jodglycerin, Jodtinctur, graues Pflaster. Innerlich Leberthran, Jodkali, Eisen. — Bezüglich der Frage d. Behandlung des L. mit dem Koch'schen Tuberculin sei auf „Tuberculosis pulmonum" verwiesen.

1041. Argent. nitr. fusi 10·0.
S. Aetzstift (Lapis en Crayon).

1042. Argent. nitr. cryst.,
Aq. dest. aa. 5·0.
S. Zum Bepins. (bei ulcerirt. Formen).

1043. Kali caust. 5·0,
Aq. dest. 10·0.
S. Mit Charpiepins. anzuw.

1044. Kali caust.,
Calcis vivae aa. 20·0.
Spir. vin. conc. q. s.
ut f. pasta.
S. Wiener Aetzpasta.
Muss unmittelbar vor Application bereitet und

10 Min. liegen gelassen werden, aus welchem Grunde d. einzelnen Bestandtheile separat zu verordnen sind, nämlich:

1045. Kalii caust. fusi 20·0.
S. Aetzkali.

Auch Chlorzink, Carbol und Pyrogallussäure, die Cosme'sche, Landolfi'sche und Canquoin'sche Pasta, sowie die Galvanokaustik anwendbar.

1046. Sapon. unguinosi 10·0,
Tuberculin. 0·5—1·0—2·0
Mf. Salbenseife. Einzureib.
1047. Acid. lactic. 10·0.
S. Mit Pinsel od. Watta zu appliciren.
1048. Acid. pyrogallici 5·0,
Vaselini 20·0.
S. Früh u. Abds. einzureiben.
1049. Acid. cinnamyl.,
Cocain. mur. aa. 1·0,
Spir. vin. 18·0.
DS. Zur Inject. (1—2 Tropf. in d. Knötchen zu injiciren. — Lauderer.)

Lymphangioitis. Lymphgefässentzündung.

Hochlagerung der Extremität. Einwickelung derselben in Compressen, welche mit Ungt. ciner. messerrückendick bestrichen sind. Luftdichter Abschluss mit Guttaperchapapier oder Billroth-Battist. Bei deutlicher Fluctuation Incisionen, Drainage, antisept. Verband.

Lymphoma malignum.

Arsenikbehandlung, und zwar local und innerlich combinirt. — Local werden täglich 2—3 Tropfen reiner Arsenikösung mit einer Pravaz'schen Spritze in das Parenchym des Lymphoms injicirt. Entstehen Abscesse, so wird damit ausgesetzt; innerlich wird mit Tropfen Früh und Abends beginnen und täglich 1 Tropfen mehr dazu genommen; so steigt man bis 30 Tropfen und wieder herunter bis auf 3. War der Erfolg kein vollständiger, so wird der Turnus noch einmal wiederholt. Treten Erscheinungen von allgemeiner Arsen-Intoxication ein, so wird sofort ausgesetzt. — Guberquelle (2—3 Esslöffel pro Tag), Haller Jodwasser.

1050. Sol. arsen. Fowler. 5·0.
S. Zu Handen des Arztes.
(Zur Injection.)
1051. Sol. arsen. Fowleri,
Tinct. ferri pomat. aa. 5·0.
S. Nach Bericht.

Lyssa, Hydrophobie, Wuthkrankheit.

Sofortige Excision, besser Cauterisation der Bisswunde als Vorbauungsmassregel. Beim Ausbruche der Krankheit Isolirung, strenge Beobachtung, Schutz vor Selbstverletzungen; bei kräftigen Individuen Aderlass. Eventuell Chloralhydrat, subcutane Injectionen von Morphium, Curare u. dgl. Pasteur'sche Präventivimpfungen.

1052. Kal. caust. 5·0,
Aq. dest. 500.
S. Aeusserlich (zum Auswaschen der Bisswunde).
1053. Acid. carbol.,
Spir. vin. conc. aa. 10·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich. (Ebenso.)

Malaria vide: Intermittens.

Malleus, Rotz.

Cauterisation der inficirten Stellen mit Kali causticum, Salpeter- oder Carbolsäure. Die auftretenden Erscheinungen sind entsprech. zu behandeln, Abscesse zu eröffnen, d. Nase auszuspritzen etc. Quecksilbereinreib. (2mal tägl. mit 2 Grm. grauer Salbe) zu versuchen

Mania.

Sorge für Ruhe, Bettlage, bei congestiv. Zuständen Umschläge auf den Kopf. Bei Anämischen kräftige Ernährung. Aufsicht; bei grosser Aufregung und Jactation Isolirung, prolong. warme Bäder (26—28° R.) mit gleichzeitigen kalten Umschlägen auf den Kopf; bei Schlaflosigkeit Bromkali 2–3·0, Hyosciamin 0·01 bis 0·02 int. od. subcut., Chloralhydrat, Paraldehyd. Duboisin. sulf. (0·0008—0·002 pro Injection.)

Mastitis, Brustdrüsenentzündung.

Bei fehlend. Fluctuation feuchtwarme Ueberschläge, Stützen der Brust durch dreieckiges Tuch oder Heftpflasterverband, Fixirung des Armes der kranken Seite in einer Mitella. Bei gross. Schmerzhaftigkeit das Säugen zu verbiet. Fieberdiät. Abführmittel.

Ist Fluctuation nachweisbar, ausgiebige Incision in radiärer Richtung gegen die Brustwarze.

Mastodynie, Brustdrüsenschmerz.

Stützen der Brust durch Bandagen in Fällen von bedeutender Schwere derselben; warme Bekleidung (Flanell, Fell auf die Brust). Antineuralgica, Elektricit.

1054. Empl. saponat.,
Extr. Belladonn. aa. 10·0.
S. Pflaster (auf Leinwand gestr. an d. schmerzhafte Stelle.)

1055. Tinct. Belladonn. 5·0,
Aq. amygd. am. conc. 20·0.
Spir. Aetheris 5·0.
F. Früh u. Abds einzureib.

Melancholia.

Hebung d. Ernährungszustand. (Eisen etc.), Ruhe in der Umgebung, Fernhalten v. Aufregung., Vermeidung lärmender Vergnügungen und Zerstreuungen, am besten Abgeschiedenheit, leichte Handarb.; Vorsichtsmassreg. geg. Selbstmordversuche. Bei Depress. Morph., Alkoh. (Cognac), schwere Weine; b. Angstanfallen Morphininjection; bei Schlaflosigkeit Bier in grosser Quantität, Paraldehyd. Bei Abstinenz künstliche Ernährung mittelst Schlundsonde.

1056. Paraldehyd. 3—6·0
Tinct. c. Aurant. 20·0.
S. Auf 1mal zu nehmen.

S. auch die Eisenpräparate.

Meningitis, Hirnhautentzündung.

Anwendung energischer antiphlogistischer Mittel, so: Eisumschläge auf den Kopf, starke Abführm., kalte Klystiere, Uebergiessungen d. Kopfes mit kaltem Wasser, Blutegel bei Kräftig. etc.; im Uebrigen strengste Ruhe in gleichmässig temperirtem, etwas verdunkeltem Zimmer; später Jodkali innerlich. Als Sedativum Morphium subcutan.

1057. Calomelan. 0·50
Pulv. rad. Jalapar.
Sacch. alb. aa. 2·0
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3stündlich 1 Pulver.

1058. Kal. jodat. 2·0,
Aq. dest. 150·0.
Syr. Moror. 20·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei heftigen, durch Kälte und Blutentziehung nicht zu beseitigenden Kopfschmerzen:

1059. Morph. mur. 0·1,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3mal tgl. 1 Pulver.

Bei grosser Unruhe Einathmung von Chloroform.

1060. Chloral. hydrat. 5·0,
Aq. font.,
Syr. cort. Aurant. aa. 30·0.
S. 2stündl. 1 Kaffeel.

Bei starkem Sopor und Depressions-Zuständen überhaupt kalte Begiessungen, Hautreize, Essigklystiere.

1061. Camphor. ras. 1·0,
Subage c. muc. gumm. Arab.
Adde ad: [20·0.
Inf. rad. Valerian. e 10·0
ad 200·0.
S. 2 Klystieren.

1062. Aether sulf. 10·0,
Camphor. ras. 1·0.
S. Injection.

Bei Kindern: Möglich. Ruhe in der Umgebung. Verdunkeln des Zimmers, Eisumschläge, Einhüllung in kalte Tücher. Auch Chinin u. Jodkali innerlich 1—2·0 pro die; später roborirende Diät und Mittel (Eisen etc.); bei wiederholtem Auftreten von Fraisen Bromkali oder Jodkali. (Vide: Eklampsie.) Calomel, Morphium, Chloralhydrat etc. wie oben, in entsprechend kleineren Dosen.

Menorrhagie vide: Metrorrhagie.

Metrakinesis, Wehenschwäche.

In der ersten Geburtsperiode (Eröffnungsperiode) bloss symptomatisch; wiederholte warme Sitzbäder. Erst in der zweiten (Austrittsperiode), und zwar gegen das Ende derselb. Verabreichung von Secale gestattet; jedoch bloss bei regelmässigen Fötaltönen, bei fieberfreiem Zustande der Gebärenden und bei der Möglichkeit, die begonnene Geburt manuell oder instrumentell zu beendigen. Massiren d. Uterus. Entsprechende Lagerung d. Gebärend. Sprengen der Blase.

1063. Secalis cornuti pulv.,
Sacch. alb. aa. 2—3·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 1/4 Stunde 1 Pulv.

1064. Inf. Secal. corn. e 5·0
ad 150·0.
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. Jede 1/2 Stunde 1 Esslöffel.

1065. Extr. Secal. corn. 3·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. rub. Idaei 10·0.
S. Jede 1/2 Stunde 1 Esslöffel.

Metritis, Gebärmutterentzündung.

Bei acuter M. Bettruhe, horizontale Lage mit erhöhtem Becken, Abführmittel, Eisblase auf den Bauch, schmerzstillende Suppositorien. Eventuell locale Blutentziehung. Localbehandl., Vaginalirrigationen besser zu unterlassen. Später Priessnitz-Umschläge, warme Vollbäder; Secale, Ergotin in der Nachbehandlung.

Bei chronischer M. körperliche Anstrengungen, Coitus zu meiden. Sorge für regelmäss. Stuhl. Bei Anämischen Eisen- u. Arsenpräparate, Brunnen- und Badecuren (Marienbad, Franzensbad, Königswart, Schwalbach), Sool- und Moorbäder (Mattoni's Moorextract). Bei stark vergröss. Uterus Jodbäder (Hall), Darkauer Jodsalz. Local Bepinselungen der Portio mit Jodtinctur, Vaginaltampons (Glycerin). Locale Blutentziehung. Elektricität. Innerlich Secale, Ergotin, Hydrastis canadensis. Thure-Brandt'sche Massagebehandl. In hartnäckigen Fällen operative Behandlung.

1066. Extr. fluid. Cascarae sagradae 20·0.
S. Abends 10—15 Tropfen zu nehmen.

1067. Extr. Aloës 6·0,
Extr. Rhei comp. 3·0,
Extr. Colocynth. comp.,
Ferr. pulv. aa. 1·50,
M. f. pill. Nr. 100.
S. 1—3 Pillen täglich.

1068. Jodi puri,
Kal. jodat. aa. 1·0,
Spir. vini 2·0,
Vaselini 30·0.
S. Salbe. (Zum Bestreichen der Portio.)

1069. Jodoform. 3·0,
Vaselin. 30·0.
S. Wie das Vorige.

1070. Jodi puri 1·0.
Kal. jodat. 5·0,
Glycerini p. 40·0.
S. Aeusserlich (damit getränkte Tampons in die Vagina einzuführen).

1071. Ichthyol. 10·0,
Glycerin. 100·0.
S. Auf Wattetampons in die Vagina zu bringen.

1072. Ammon. sulfo-ichthyol.,
Lanolin. aa. 10·0.
S. Zur Einreibung d. Bauchdecken.

Metrorrhagie, Blutungen aus dem Uterus.

Ermittelung des ursächlichen Momentes (zurückgebliebene Eihaut- oder Placentareste, mangelhafte Involution d. Uterus, Retroflexio, Metritis, Polypen, Fibrom, Carcinom, Adenom) u. Behandlung desselben; Bettruhe; Diät; kühlende Getränke (Giesshübler, Salvator) und Injectionen. Injectionen von heissem Wasser (40°), Tamponade, kalte Umschläge auf d. Unterleib. Als ultimum refugium intrauterinale Injection, doch ist hier conditio sine qua non, dass d. Uteruscanal gut durchgängig sei. Subcutane Ergotin-Injection, intrauterine Gelatineinjectionen. Als dicatio vitalis subcut. Injection u Aether.

1073. Infus. Secal. cornuti e 5·0 ad 150·0,
Elixir. acid. Halleri 2·0,
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. Alle 10 Minuten 1 Esslöffel.

1074. Secal. corn. pulv. 2·0.
Div. in dos. = 10.
S. Jede Stunde 1 Pulver.

1075. Extr. Secal. corn. 1·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. flor. aurant. 15·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1076. Cornutin. pur. 0·08,
Argillae 3·0,
Aq. dest.,
Glyc. q. s.
ut f. pill. Nr. XX.
S. Im Tage 2 Pillen.

1077. Tinct. Cinnam. 50·0.
S. ½ständlich 1 Kaffeelöffel.

1078. Tct. Ferr. ac. aeth. 10·0,
Aetheris acet. dep. 5·0.
S. ½ständl. 15 Tropfen.

1079. Aluminis crud. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Einspritzungen.

1080. Extr. Secalis corn.,
Glycerini pur. aa. 1·0,
Aq. dest. 5·0—10·0.
S. Zu subc. Inj. (1 Spritze voll zu injiciren).

1081. Extr. fluid. Hydrast. canad. 20·0.
S. Mehrmals täglich 20 bis 30 Tropfen.

1082. Stypticin. 1·0,
Tinct. Cinnamom. 10·0,
S. 4mal tägl. 10 Tropfen in Zuckerwasser zu nehmen.

Migraine vide: Hemicrania.

Milium, Hautgries.

Anstechen der Epidermis mittelst ausgeglühter feiner Nadel und Ausdrücken d. kugelförmi Körper m. Comedonenquetsch

1083. Spir. sapon. kalin. 5
S. Zum Einreiben.

Milzbrand

vide: Pustula maligna.

Molluscum contagiosum

vide: Condylomata subcutan.

Morbilli, Masern.

Behandlung ganz exspectativ. Bettruhe bei entsprech. Zimmer- und Lufttemperatur. Lüftung, Verdunkeln des Zimmers. Wegen Disposition zu Catarrhen gleichmässige Wärme des Körpers; warme Getränke, eventuell ein indifferentes Mittel; leichte Abführmittel, mässige Nahrung. Treten Complicationen hinzu, so ist entspr. Behandl. einzuleiten. Bei excessiv hohem und anhaltendem Fieber hydropathische Behandlung und Chinin. Bei stärkerer Conjunctivis Auswaschen d. Augen mit lauem Wasser, Umschläge mit Bleiwasser od. Boraxlösung.

Bei sehr heftigem Husten:

1084. Pulv. Dower. 0·20.
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Früh, Mittags u. Abends 1 Pulver.

1085. Inf. rad. Ipecac. e 0·30 ad 100·0.
Extr. Op. aq. 0·03.
Liq. Ammon. anis. ytts. 20.
Syr. simpl. 20·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1086. Codein phosph. 0·05—0·20.
Aq. dest. 5·0.
Syr. simpl. ad 100·0.
S. Zustündlich 1 Theelöffel voll.

1087. Extr. Hyoscian. 0·15.
Aq. dest. 70·0.
Syr. simpl. 10·0.
S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.

1088. Morphii mur. 0·01.
Aq. Laurocer. 10·0.
S. Je 5 Tropfen auf Zucker (mehrmals täglich).

1089. Chinin hydrochlor.
Aq. dest.. [0 2—0·5.
Syrup. rub Id. aa. 20·0.
S. Halbstündl. 1 Esslöff voll.

1090. Sol. Natr. biborac. (e 8 0) 200·0.
S. Augenwasser.

Morbus Addisonii.

Symptomatische Behandlung. Roborirende Diät, Landaufenthalt, Eisen- und Arsenpräparate. Gegen das Erbrechen Morphin, Cocain. Gegen die Diarrhoen Adstringentien und Opiate. Gebrauch natürlicher eisen- und arsenhält. Quellen. Bromnatrium in grossen Dosen.

1091. Cocain. mur. 0·1.
Aq. dest. 10·0.
S. 10 Tropfen, eventuell mehrmals täglich.

1092 Tinct. jodinae 0·5.
Aq. dest. 150·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

1093. Kali jodat. 3·0.
Aq. dest. 180·0.
Syr. rub. Id. 20·0.
S. Täglich 3 Esslöffel.

Morbus Basedowii.

Meidung psych. Aufregungen, Reduction geistiger und körperlicher Arbeit, reizlose Diät, Landaufenthalt, Aufenthalt im Mittelgebirge. Eventuell Seeluft. Application kalter Umschläge auf die Herzgegend. Eisen-Arsenpräparate u.-Wässer. Chinin bis etwa 1·0 p. die, auch Digitalis, Jodpräparate. In passend. Fällen Hydrotherapie, Mechanotherapie oder schwache galvanische Ströme auf den Halssympathicus. Als Hypnotica Paraldehyd oder Sulfonal.

Morbus Brightii, Nierenentzündung.

Im Anfangsstadium exspectativ. leicht. Diureticum: Kali aceticum. bei Hydrops heisse Bäder (30° R. durch $^1/_4$ bis $^1/_2$ Stunde) mit nachfolgender Einwickelung in warme Decken durch 2—3 Stund., nebstdem schweisstreibende Mittel (besonders Jaborandi oder Pilocarpin). Die Procedur wird anfangs täglich, später in längeren Intervallen bis zum Schwinden des Eiweissgehaltes des Harns wiederholt. Bei längerer Dauer d. Krankheit Sorge für Ruhe, blande Diät, so lange als möglich ausschliesslich Milchdiät, günstige Beschaffenheit der Wohnung etc. Behandlung d. eventuellen Complicationen. In chronisch. Formen Eisen, Verdauung befördernde Mittel. Grosse Mengen v. Getränk; Giesshübler. Salvator, Sauerbrunn Klösterle, Radeiner, Preblauer, Krondorfer, Vichy, Waldungen; Milchcur $^1/_2$ bis mehrere Liter tägl. Hygienische u. diätetische Massregeln, warme Kleidung, wenig Bewegung, event. causale Therapie (Syphilis, Malaria). Aufenthalt in warmem Klima.

1094. Decoct. Ononid. spin. e 20·0 ad 200·0,
Kali acetici.
Rooh Juniperi aa. 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1095. Inf. bacc. Juniperi e 20·0
Kali acetici, [ad 200·0.
Oxymell. Scill. aa. 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1096. Extr. Scillae 0·30.
Aq. Petroselini 100·0.
Liq. Kali acetici 25·0,
Rooh Juniperi 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1097. Diuretin-Knoll 5·0,
Aq. dest. 100·0.
Syr. simpl. 15·0.
S. Tagsüber löffelweise z. n.

1098. Theobromin. crystallisat. D. tal. dos. Nr. X. [0·5.
S. Tägl. 6—10 Pulver z. n.

1099. Tannini pur. 0·5.
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 3. Stunde 1 Pulver.

Bei Hämaturie:

1100. Plumb. acet. 0·2.
Morph. mur. 0·05.
Elaeos. citri 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 2stündl. 1 Pulv.

1101. Extr. Secale corn. 1·0
Elaeos. Menth. pip. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3stündl. 1 Pulv.

Bei urämischen Erscheinungen warme Bäder u. Einwickelungen, gegen eklamptische Anfälle Eisumschläge auf den Kopf, excitirende Klysmata, Abführmittel; Morphium-Injectionen.

Bei acuter Nephritis d. Kinder: Ausschliessl. Milchdiät. Keine Diuretica! Zum Getränk Giesshübler, Salvator, etwas Marienbader Kreuzbrunn oder Karlsbader Mühlbrunn.

Bei Fieber und Hämaturie:

1102. Chinin. tannic. 1·0—2·0,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos = 10.
S. 2stündl. 1 Pv. in Milch.

Bei Urämie und Eklampsie tägl. Bäder von 27—28° K. Klysmen von Chloralhydrat:

1103. Chloral. hydrat. 2·0-6·0,
Aq. dest. 250·0.
S. Für 2 Klystiere.

Morbus maculosus Werlhofii, Blutfleckenkrankheit.

Regelung der Diät, der Wo
nungsverhältnisse. Bei Nasenbl
Ausspülen mit kaltem Wa

event. Tamponade; bei Bluterbrechen Eispillen. Bei schwachen Individuen Bettruhe.

1104. Elix. ac. Hall. 5·0,
Syr. rub. Idaei 30·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Stündl. je 2 Esslöffel.

1105. Acid. sulf. dil. 5·0,
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. 2stündl. 1 Kaffeelöffel in 1 Glas Wasser.

1106. Decoct. cort. Chinae reg. e 10·0 ad 150·0,
Acid. sulf. dil. 5·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1107. Chinin. ferrocitric. 1·0,
Extr. Secal. corn. 0·3—0·5,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 1.0.
S. Täglich 3—5 Pulver.

1108. Extr. Sec. corn. aq. 2·0,
Aq. dest. 120·0,
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Kinderlöff.

Morphinismus.

Entziehungscur je nach der eingeführten Menge d. Morphins plötzlich oder allmälig, Vorsorge gegen Einschmuggel. v. Morphin, strenge Absonder. des Kranken. In den ersten Tagen der Entziehungscur Opium, Chloralhydrat, Codein, Heroin oder Dionin als Ersatz. Bei eintretendem Collaps starken Wein, Cognac, eventuell interimistisch 1—2 Morphin-Injectionen. Prophylaktisch: Beschränkung d. Morphin-Inject. auf die streng indicirten Fälle und insbesondere des Gebrauches der Spritze von Seite der Krank, selbst oder deren Umgebung.

Morpiones, Filzläuse.

Anwendung des Mittels zur Beseitigung derselben am zweckmässigsten des Abends; am darauffolgenden Tage ein Seifenbad. Allenfalls vorhandene Ekzeme nachträglich zu behandeln.

1109. Ung. Hydrarg. 5·0.
S. Salbe.

1110. Merc. praecip. alb. 1·0
Vaselini 20·0.
S. Salbe.

(Bloss jene Partien einzureiben, wo Morpiones sitzen, und nur wenig Salbe zu verwenden, damit nicht Stomat. od. Ekzem erfolge.)

1111. Naphtoli 1·0,
Ol. olivar. 10
S. Zum Einreiben.

1112. Petrolei 20·0,
Bals. Peruviani 1·0.
S. Zum Bepinseln.

1113. Creolin. 2·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Wiederh. Waschungen der betreffenden Theile.

Mydriasis, Erweiterung d. Pupillen.

Ermittelung der Ursache, womöglich Beseitigung derselben. Palliativ versuche man Calabar und seine Präparate. — Optische Hilfsmittel; — Elektricität.

1114. Eserini sulf. 0·03,
Aq. dest. 3·0.
S. Je 1 Tropfen in d. Bindehautsack einzubringen.

1115. Pilocarp. mur. 0·10.
Aq. dest. 10·0.
S. Wie vorher. (Bei Herzschwäche Vorsicht!)

Myelitis, Rückenmarksentzündung.

Rücksicht auf ein ursächliches Leiden (Syphilis, Blei-Intoxication etc.). Passende Lagerung und möglichst Ruhe, kalte Umschläge und Abreibungen; auch Kaltwassercur; Massage, Moorbäder (Mattoni's Moor-Extr.), Darkauer Jodsalz, bei intensiven Schmerzen

Sinapismus, bei längerer Dauer Sorge für Reinhaltung. Achtung auf Decubitus! Bei Blasenlähmung regelmässige Entleerung der Blase mit sorgf. gereinigtem Katheter. Hebung der Ernährung. Sanatogen.

Myocarditis vide: Endocarditis.

Myringitis, Entzündung d. Trommelfells vide: Otitis.

Myxoedema.

Rationelle Behandlung mittelst Schilddrüsenfütterung. Vorsicht bei der Behandlung wegen eintretenden „Thyreoidismus". Anfangs möglichst kleine Dosen. Von den englischen „Tabloids" à 0·1 Grm., anfangs 1 Stück pro die, vom Thyraden anfangs 6 Tabletten, à 0·15 Grm., allmälig auf 20 Stück zu steigen; vom Thyrojodin Baumann's anfangs 1 Tablette (à 0·3 Grm.) pro die und später vorsichtig zu steigen. Bezügl. der Schilddrüsentherapie vgl. auch Obesitas.

Nasenbluten vide: Epistaxis.

Nephritis vide: Morbus Brightii.

Nephrolithiasis, Nierensteinkolik.

Bez. der Behandlung d. Grundleidens vgl. Diathesis urica. Im Anfalle Bettruhe, Narcotica (Opium, Morphium [innerlich und subcutan], Belladonna, Chloralhydrat, Chloroforminhalationen), *heisse Umschläge*, protrahirte *heisse Bäder*, in Ausnahmsfällen *kalte Umschläge*. Versuch mit *localer Blutentziehung*. Reichlich. *Getränk*, besonders schwache Säuerlinge. (Franzensbader Natalliequelle.) Event. chirurgische Behandlung (Nephrolithotomia, Nephrotomie od. Nephrektomie). Bezüglich der Behandlung der begleitenden Pyelitis s. d.

Neuralgia intercostalis vide: Intercostal-Neuralgie.

Neuralgia trigem., Prosopalgia, Tic douloureux, Gesichtsschmerz.

Womöglich Ermittelung u. Berücksichtigung d. Ursache (Trigeminusneuralgie nach Infectionskrankheiten, wie Malaria, Typhus, Influenza, bei Erkältungen, durch Traumen, Fremdkörper, comprimirende Narb. u. Geschwülste, Syphilis etc.), bei Neuralgia rheumatica Schwitzbäder, Moorbäder (Mattoni's Moor-Extr.), Massage. Elektricität frühzeitig angewendet, Behandlung mit Kälte, Einreibung von Salben; Waschungen mit Aether. sulf. oder Petroleumäther; Chloroforminhalation, Morphium-Injectionen; bei typischen Anfällen Chinin, bei Syphilis Quecksilberbehandlung, bei Bleivergiftung Jodkali. Bei gleichzeitiger habitueller Obstipation entsprechende Behandlung der letzteren (vide: Obstipatio). Tägliche Kaltwasserklystiere, feuchtwarme Einpackungen des Unterleibes und kalte Abwaschungen desselben auch sonst zu versuchen. In hartnäckigen Fällen Nervendehnung, Neurektomie oder Ausreissung des Nervenstammes mit d. Ganglion Gasseri (F. Krause).

1116. Sulf. Chinini 2·0.
Div. in dos. = 5.
S. Vor jedem Anfalle 2 Pulver.

1117. Sol. ars. Fowler. 10·0.
S. Je 5 Tropfen 3. Stunde.

1118. Exalgin. 2·50,
Solve in
Tinct. cort. aurant. 5·0,
Adde
Aq. dest. 120·0,
Syr. c. aur. 30·0.
S. Früh und Abends 1 Essl.
1119. Ungt. Belladonnae,
Ungt. Hydrarg. cin aa. 5·0.
S. Salbe. Zur Einreibung.
1120. Iodopyrin. 12·0.
M. f. pulv. dent. tal. dos. = 12.
MDS. 3mal tägl. 1 Pulver.
1121. Cocain hydrochl. 0·1,
Aq. dest. 10·0.
S. Zur subcut. Injection.
(1/2—1 Spritze.)
1122. Tinct. Gelsemi 5·0.
S. Je 20 Tropfen 3mal in 1/2ständiger Pause. (Nachlass meist nach 3 Dosen.)
1123. Antinervin.,
Sacch. alb. aa. 5·0,
Div. in dos. = 10.
S. 2ständlich 1 Pulver.
1124. Kali bromat.,
Chloral. hydrat. aa. 30·0,
Extr. hyosciam.,
Extr. cannab. ind. aa. 0·25,
Extr. glycyrrhiz liquid. 90·0,
Ol. aurant. cort. gtts. V.
DS. Bromidia. Theelöffelweise zu nehmen.

Ebenso Antipyrin, Salipyrin u. dgl. Durchfrierung der Haut mit dem in kleinen Glasröhren eingeschlo-s. Aethylchlorid.

Neurasthenie.

Genaue Individualisirung, Unterbrechung geistiger Thätigkeit. Reisen. Aufenthalt an der See (bei erethischen Naturen ohne *Seebäder*), *im Gebirge. Allgemeine Faradisation und Massage. Method Heilgymnastik. Fränkelinische Douche. Hydrotherapie Halbbäder v. 25–20° R., leichte Einreibungen).* Strenge Eintheilung des Tages, passende Beschäftigungstherapie, Abwechslung zwischen Arbeit u. Erholung, regelmässige Bewegung i. Freien, pünktliche Einhaltung d. Mahlzeiten. Fleischkost. Einschränkung der Reizmittel (Alkohol, Nicotin, Thee, Kaffee), Regelung der Defacation. Bei habitueller Obstipation Bauchmassage. — Versuch mit Sperminum Poehl. — Psychische Behandlung.

1125. Natr. bromat.,
Kalii bromat.,
Ammon. bromat. aa. 8·0.
M. f. p. div. in dos. = 12.
S. Abends 1—2 Pulver, in Wasser gelöst, zu nehmen.
1126. Bromalin. 1·0. [amyl.
D. tal. dos. Nr. X in caps.
S. Tägl. 2—8 Pulv. zu nehm.
Vide auch Insomnia.

Gleichzeitige Behandlung der Anämie (Eisen u. Chinin, Guberquelle). — Bei ausgesprochen torpider Form der N. Seebäder, Höhenklima, reichliche Ernährung (Fleisch, Milch, Eier), Alkoh. in mässig. Quantit., kühlere Halbbäder u. Abreibungen, systemat. Gymnastik (Apparatotherapie).

Nodi haemorrhoidales

vide: Hämorrhoiden.

Noma, Wasserkrebs.

Locale Behandlung; Aetzmittel, Glüheisen; fleissige Reinigung d. brandig. Flächen; antifeb. Mittel, kräftige Kost, Wein, Cognac. Innerlich Chinin, Eisen.

1127. Calcar. chlor. 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Zum Abspülen.
1128. Kal. chloric. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Mundwasser.
1129. Acid. carbol. 1·0.
Ol. olivarum 20·0.
S. Zum Bepinseln.

1130. Acid. muriat. 1·0,
Glycerin. 20·0.
S. Zum Repinseln.
1131. Decoct. cort. Chinae
e 3·0 : 100·0,
Acid. hydrochlor. 0·5.
Syrup. c. aurant. 30·0.
S. 1—2ständlich 1 Kinderlöffel voll.

Obesitas, Fettleibigkeit.

Dauernde Umänderung der Lebensweise n. physiol. Princip.; Diät, vornehmlich aus Eiweiss u. Fett bestehend, kein Zucker, auch nicht Kartoffeln etc., v. Gemüsen: Spargel, Spinat, Kohl u. Leguminosen. Medicamentöse Behandl. und Mineralwassercuren nur von vorübergehend. Wirkung. Lebensweise im Allgem. ruhig u. gleichmässig thätig; bei intact. Herzen körperliche Bewegung, vermehrte Muskelthätigk. (Heilgymnast.). — Entfettungscuren mit Schilddrüsenpräparaten scheinen bei herz- und nierengesunden Menschen nicht nur erfolgreich, sond. auch gefahrlos zu sein — ständige ärztliche Ueberwachung vorausgesetzt. Zur Verhütung der üblen Folgen der Thyreoid-Medication empfiehlt sich d. gleichzeitige Verordnung von Arsen. Man wählt beispielsweise die engl. »Thyroid gland tabloids«, deren jedes Stück 0·3 Grm. Schilddrüsensubst. entspricht. Man beginnt mit der täglichen Darreichung von 1 bis 3 Pastillen und steigt wöchentlich um je eine Pastille, bis zu 4 Stück pro die. Die Diät bleibt ungeändert. Die genaue Controle des Kranken hat sich besonders auf das Herz (der Puls darf nicht über 100—120 steigen) und den Harn zu beziehen. Bei Erscheinungen beginnenden »Thyreoidismus« (Kopfweh, Schlaflosigkeit, Müdigkeitsgefühl, Zittern, Appetitlosigkeit, Uebelkeiten, Herzklopfen, Pulsbeschleunigung) ist das Mittel sofort auszusetzen. In analoger Weise werden d. übrigen Schilddrüsenpräpar. (Jodothyrin, Thyradën etc.) angewendet.

Obstipatio alvi, Stuhlverstopfung.

Beseitig. d. Ursachen, sowohl bei temporärer als auch bei habitueller Stuhlverstopfung. Anregende Diät, voluminöse Speisen, vorwiegend Pflanzenkost, viel Früchte, reichlich Fett u. Amylacea, wenig Fleisch. Versuch, durch Abänderung d. bisherigen Lebensweise und Diät das Uebel zu beheben. Bei sitzend. Lebensweise methodische, genau regulirte Bewegung. (Spazierengehen, Reiten, Radfahren, Bergsteigen u. dgl.) Morgens bei nüchternem Magen mehrere Glas kalten Wassers zu trinken. Regelmässigkeit und Ausdauer im Defäcationsversuch. Kalte Waschungen des Abdomens und Priessnitz'sche Leibbinde. — Unterleibs-Massage durch 4—6 Wochen in Verbindung mit gymnastischen Widerstandsbewegungen behufs Kräftigung der Bauchmusculatur. Faradisation der Bauchdecken, Marienbad, Bitterwässer (Mattoni's Bitterwässer, Hunyadi János-, Franz Josef-Bitterquelle, Friedrichshall etc.). — Einbringung von 1—3 Grm. wasserfreien Glycerins in den Mastdarm mittelst kleiner Spritze und läng. Darmrohres. Neuerer Zeit werden „grosse Oelklystiere" empfohl. 300—500 Cc reinen Oliven- od. Sesamöls, auf Körpertemperatur erwärmt, langsam und unter niedrigem Druck bei etwas erhöhtem Becken, appliciren; durch mehrere Tage zu wiederholen. Die medicamentöse Behandlung mittelst Abführmittel sollte erst dann eingeleitet

werden, wenn die hygienisch-diätetischen u. die mechanischen Methoden im Stiche gelass. hab. Zur Erzeugung einer 1—2mal. Entleerung eignen sich, abgesehen von der Darmirrigation:

1132. Infus. fol. Sennae e 20·0 ad 150·0,
Magnes. sulf. 30·0,
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. 2ständlich 1 Esslöffel.

1133. Calomel 0·30
Sacch. lact. 3·0,
M. f. p. div. in dos. = 3.
S. 2ständl. 1 Pulver bis zur Wirkung.

1134. Ol. Ricini 50·0.
S. Kaffee- bis esslöffelweise (in Bier, Suppe, Thee etc.).
Ricinusöl auch in Kapseln à 3 bis 5·0 erhältlich.

1135. Ol. Ricini 30·0,
Pulv. Gumm. arab. 10·0
Aq. dest. 150·0.
Syr. mannat. 15·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

1136. Salis amari 20·0,
Aq. dest. 200·0,
Acid. sulf. dil. 2·0.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

1137. Salis amari 10·0.
S. in Wasser aufgelöst auf 1—2mal zu nehmen.

1138. Spec. laxant. St. Germain. 30·0.
S. Thee. (Der 4. Theil als Aufguss in einer Tasse zu nehmen.)

1139. Aq. laxativae Viennensis 50·0,
Syr. rubi Idaei 10·0,
Aq. Laurocerasi 5·0.
S. Lauwarm zu nehmen.

1140. Elect. lenitiv. 50·0.
S. In 2 Portionen z. n.

1141. Tinct. Rhei aqu. 150·0.
S. Esslöffelweise.

1142. Resinae Jalap. 0·5,
Vitelli ovi un.,
Aq. flor. Naphae 30·0,
Syr. emulsiv. 15·0.
S. Stündl. 1 Kaffeelöffel.

1143. Dect. pulp. Tamarind. e 20·0 ad 200·0.
Magnes. citricae,
Syr. mannat. aa. 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1144. Mannae calab. elect. 50·0,
Aq. Menth. pip. 150·0.
S. Esslöffelweise.

Bei habitueller Verstopf. eine Zeit lang regelmässig zu nehmen:

1145. Extr. Aloës aquos.,
Extr. Jalapae,
Sapon. medicin. aa. 5·0,
P. et Extr. Rhei ch. q. s. ut f. pil. Nr. 50.
S. Morgens 4 Stück z. n.

1146. Aloïn 3·0,
Pulv. et. Succ. Liq. aa. q. s. ut. f. pil. Nr. XXV. Consp.
S. Abends 1—2 Pillen.

1147. Cremor. Tart. 15·0,
Pulv. fol. Sennae 1·50,
Sacch. alb. 30·0.
M. f. p.
S. Früh u. Ab. 1 Kaffeelöff.

1148. Extract. aquos. Ipecac. 10·0.
Aq. dest. 50·0.
S. 1 Kaffeelöffel in 150 Grm. Wasser zum Klysma.

1149. Natrii sulf. 15·0,
Pulv. rad. rhei 30·0,
Bicarb. Sod. 10·0.
S. Abds. 1 Messersp. v. zu n.

1150. Extr. Cascar. Sagrad. fluid.
Syr. cort. aurant. aa. 20·0.
S. Früh u. Ab. 1 Kaffeelöff.

1151. Vin. Sagrad. 100·0.
S. 1—2mal täglich 1 Liqueurglas voll.

1152. Extr. Rhamni frangul. fluid. (Rhamnin) 50·0.
DS. 1—3 Esslöffel voll z. n.

1153. Pulv. Liquir. comp. 40·0.
S. Abends 1–2 Kaffeelöffel voll zu nehmen.

1154. Pulv. rad. Rhei.
Pulv. Liquirit. comp.,
Natr. bicarb. aa. 15·0.
S. Wie oben.

1155. Pulv. rad. Rhei,
Extr. Aloës aqu. aa. 5·0,
Extr. Taraxac. q. s.
ut f. pil. Nr. 50.
S. Morgens 4 Stück z. n.

Bei gleichzeitig. Appetitlosigkeit:

1156. Pulv. r. Rhei ch. 5·0,
Extr. Trifol. fibr. q. s.
ut f. pil. Nr. 50.
S. Morgens 5 Stück z. n.

Kräftiger wirken:

1157. Ol. Croton. gtts. 2—5.
Mucil. Gumm. arab. 15·0,
Aq. dest. cer. nigr. 50·0,
Syr. Altheae 10·0.
S. Kaffee- bis esslöffelw.

1158. Pulv. r. Rhei ch. 5·0,
Extr. Aloës 2·0,
Extr. Colocynth. 0·5,
Extr. rad. Rhei q. s.
ut f. pil. Nr. 50.
S. Früh u. Abends je 2 Pill.

1159. Podophyllini,
Saponis med. aa. 0·2,
Mellis dep. q. s.
ut f. pil. Nr. 20.
S. 1—3 Stück täglich.

1160. Podophyll. 0·3,
Extr. Rhei,
Extr. Aloes aa. 3·0,
Extr. Taraxac. q. s. ad pil. Nr. 40.
S. Abds. 1—2 Pillen z. n.

1161. Extr. Colocynthid.,
Pulv. rad. Rhei,
Pulv. Aloës.
Resinae Jalapae,
Gummi gutti aa. 1·0,
Myrrhae 2·0.
F. pill. Nr. 50.
S. 1—4 Stück täglich (sog Pilul. Morissoni).

1162. Natr. sulf. 100·0,
Natr. bicarb. 80·0,
Natr. chlorat. 40·0,
Kali sulf. 5·0.
M. f. p. S. 1—2 Kaffeelöff. auf 1 Glas warmen Wassers.
(Künstl. Karlsbader Salz.)

Bei Kindern event. gleichz. Behandl. d. Rachitis u. Anämie.

1163. Hydrom. infant. 20·0.
S. Kaffeelöffelweise.

1164. Manniti cryst. 10·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Stündl. 1 Kaffeelöffel (für Säuglinge).

1165. Syr. mannat.,
Tinct. Rhei aa. 20·0.
S. Stündl. 1 Kinderlöffel (bis Stuhlgang erfolgt).

1166. Podophyllin. 0·1,
Spir. vin. rectif. 1·0,
Syr. rub. Idaei 50·0.
S. 1—2 Esslöffel.

1167. Aq. laxat. Viennens.,
Syr. rub. id. aa. 3·00,
Aq. Laurocer. 2·0.
S. 1—3 Esslöff. (nach dem Alter des Kindes).

1168. Natr. sulf. cryst. 15·0,
Aq. rub. Idaei 100·0,
Syr. Cich. cum Rheo 15·0.
S. Jede 2. St. 1 Kinderl.

1169. Kal. natr. tart. 2·0,
Aq. carvi 50·0,
Syr. mannat. 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Kinderl. voll.

Bei erwachsenen Kindern und lang andauernder Constipation:

1170. Inf. rad. Rhei e 2·0 ad Syr. mannat. 20·0. [50·0,
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1171. Dect. Pulp. Tamarind. e 15·0 ad 150·0,
Natr. phosphor. 10·0,
Syr. citri 15·0.
S. Jede 2. St. 1—2 Esslöff.

1172. Calomel. laevig.,
Plv. rad. Jalap. aa. 0·20,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. P. div. in dos. = 10.
S. Früh. Mitt. u. Abds. 1 Pulv.

Klyst. m. Kamillenthee, einigen Tropfen Glycerin, Wasser etc., Stuhlzäpfchen aus Cacaobutter, Glycerin, Glycerinseife, Irrigationen d. Mastdarmes.

Oculomotoriuslähmung.

Elektricität. Thermen. Allg. Behandlung.

1173. Strychn. nitr. 0·10,
Aq. dest. 10·0.
S. Zur subcutanen Injection.

Odontalgie, Zahnschmerz.

Bei Caries des Zahnes Ausspritzen der Höhle mit lauem Wasser behufs Beseitigung von Speiseresten etc., sorgfaltige Reinhaltung; Anwendung schmerzstillender Präparate.

Bei Periostitis (Wurzelhautentzündung) Anwendung v. Mundwasser, lauwarm. Thee; Applicat v. 2—3 Blutegeln in d. Umgebung des kranken Zahnes. Bei Insolung mit Jodtinctur oder Senfgeist. Ist es zur Abscedirung gekommen, Eröffnung d. Zahnfleischabscesses. Entfern. d. Zahnes, wenn auf diesem Wege d. Eiter nicht zu entleeren ist.

Bei schwammigem lockerem Zahnfleisch Entfernung des Zahnsteines und Anwendung von adstringirenden Mundwässern.

1174. Tinct. Opii croc.,
Spir. aeth. sulf.,
Ol. Menthae pip. aa. 2·0.
S. Zahntinct. (mittelst Watta in den hohlen Zahn zu bringen oder zum Bepinseln des Zahnfleisches in dessen Umgebung).

1175. Camphorae,
Chloral. hydrat. aa. 5·0.
S. Wie das Vorige.

1176. Nirvanin. 0·2,
Aq. dest. 10·0.
DS Zu subperiostal. Inject.

1177. Camphorae 2·0,
Ol. Cajeputi 5·0,
Ol. Caryophyll. gtts. 2,
Chloroform. 10·0.
S. Zahntropfen.

1178. Thymoli 0·30,
Spir. Cochlear.,
Spir. Melissae aa. 30·0,
Tinct. Ratanh. 10·0,
Ol. Menth. pip. 0·50,
Ol. Caryoph. 1·0.
S. 10 Tropfen in 1 Glas Wasser zu Mundwasser.

1179. Tinct. Jodinae,
Glycerini aa. 20·0.
S. Alle 2 Stunden das Zahnfleisch um den kranken Zahn bepinseln und 10 Minuten darauf mit kaltem Wasser ausspülen.

Empfohlen wird das Einlegen von krystall. Chloralhydrat in Baumwolle eingewickelt.

Zweckmässiger ist d. Verschluss des hohlen Zahnes mittelst eines in eine Harzlösung getauchten Baumwollbäuschchens nach vorausgegang. Ausspritzung mittelst lauwarmen Wassers. Eventuell kann zuvor ein mit Carbolsäure imprägnirtes Baumwollkügelchen und dann erst das Harzpräparat in den hohlen Zahn eingefügt werden.

1180. Sandaracae 5·0,
Aetheris sulf. 10·0.
S. Zahnharz.

Rührt der Schmerz vom Blossliegen der Pulpa her, so erzielt man ein bleibendes Resultat nur durch Zerstörung der Zahnnerven mittelst Causticums.

1181. Arsenici albi. 2·0,
Morph. mur. 1·0,
Creosoti q. s.
ut f. pasta mollis.
S. Arsenikpasta. Ein stecknadelkopfgr. Stück auf Watte nach gründlicher Reinigung der cariösen Höhle behutsam auf die blossliegende Pulpa gelegt und sodann mit in Harz getauchter Baumwolle zu verstopfen.

1182. Calc. carb. praec. 100·0,
Pulv. Rhiz. Ir. fl. 5·0,
Oss. Sepiae pulv. 4·0,
Sacch. alb.,
Myrrhae pulv. aa. 2·0,
Mellis et Glycer. aa. q. s.
ut f. pasta.
S. Zahnpasta.

Als adstringirendes Mundwasser zu empfehlen:

1183. Kino 1·0,
Spir. vin. rectif. 60·0,
Ol. Menth. pip. gtts. 15,
Ol. Cinnamom.,
Ol. Macidis aa. gtts. 5,
Ol. Caryophyll. gtts. 2.
S. Zahntinctur. (30 Tropfen in ein halbes Glas Wasser zum Ausspülen des Mundes.)

1184. Acid. thymic. 0·25,
Acid. benzoic. 3·0,
Tinct. Eucalypt. 15·0,
Alcoh. absol. 100·0,
Ol. Gaultther. gtts. 15.
S. Zahntinctur.

1185. Magnes. carb.,
Rhiz. Ir. fl.,
Talci,
Sap. medic. aa. 5·0,
Ol. Menthae pip. gtts. 10,
Muc. gumm. ur. q. s.
f. Massa.
S. Zahnseife.

1186. Rad. Calami arom.,
Rad. Iridis flor. aa. 15·0,
Corall. rubr. praep.,
Ligni Santali rubr.,
Natr. carb. dep. sicc. aa. 5·0.
M. f. p. subtilissimus.
S. Zahnpulver.

1187. Oss. Sep. pulvp. alb. 25·0,
Pulv. rad. Irros flor.,
Magnes. carb. aa. 3·0.
Ol. Menthae pip. gtts. 3.
S. Zahnpulver.

1188. Carbonis Tiliae 15·0,
Cortic. Chinae 5·0,
Catechu,
Myrrhae,
Cinnamomii,
Caryophyll. aa. 2·0,
Ol. Bergamott. gtts. 20.
M. f. p. subtilissimus.
S. Zahnpulver.

1189. Cretae praepar. alb. 15·0,
Rad. Iridis flor. 5·0,
Ol. Menthae pip. gtts. 5,
S. Zahnpulver.

1190. Calc. carb. praec. 120·0,
Cort. Chin. fusc.,
Conchae praep. aa. 60·0,
Pulv. Myrrh. 30·0,
Pulv. Caryophyll. 15·0,
Ol. Cinnam. gtts. 10–15.
M. f. p.
S. Zahnpulver.

1191. Calc. carb. praec. 120·0,
Rhiz. Ir. fl. 60·0,
Oss. Sep. pulv.,
Sacch. alb. aa. 30·0,
Natr. bicarb. 15·0,
Ol. Rosae gtts. 15.
S. Zahnpulver.

Oedema glottidis.

Eisspillen, Eisumschläge um d. Hals, Blutegel, starke Abführmittel o. Klystiere, kräftige Reizmittel auf die Haut. Aderlass. Scarification der Wülste mit d. Messer auf laryngoskopischem Wege, eventuell Tracheotomie.

Bei profusem Secret in Trachea und Bronchien Brechmittel:

1192. Inf. rad. Ipecacuanh. e 2·0 : 80·0,
Tartar. emetic. 0·2,
Syr. rub. Idaei 20.
S. Viertelstündl. 1 Esslöff. bis zur Wirkung.

1193. Apomorphin. mur. 0·10,
Glycerin. 2·0,
Aq. dest. 8·0.
S. 1 Pravaz'sche Spritze voll zu injiciren.

Oedema pulmonum acutum, Lungenödem.

Berücksichtigung des ursächl. Leidens. Brechmittel, Venaesection, Excitantia (Aether-, Campherölinjectionen, starke Weine), Hautreize (Sinapismen). Klystiere mit Eis- oder Essigwasser.

1194. Apomorph. hydrochl. 0
Aq. dest. 10·0.
S. 1–2 Spritzen subc

1195. Ac id. benzoic. 0·3.
Camphor.,
Stib. sulf. aur. aa. 0·05,
Sacch. alb. 0·5.
Tal. dos. X.
S. 2stündl. 1 Pulver.
1196. Plumb. acet. 0·3.
Sacchar. pulv. 3·0.
Mf pulv. div. in dos. X.
DS. 2stündlich 1 Pulver.

Omphalitis, Nabelentzündung.

Sorgfaltige Reinigung mit lauem Wasser od. Thee; Bestreuung mit Amylum allein oder mit Jodoform-Einlagen von Bruns'scher Baumwolle. Lapis mit Vorsicht zu verwend. Im Falle v. Gangränescenz desinficirende Mittel. Prophylactisch: Nabelschnur kurz abzuschneiden, Trocken- und Reinhaltung, Desinfection d. Verbände und Utensilien.

1197. Aq. Goulardi 200·0.
S. Aeusserlich.
1198. Liqu. Burow. 500·0.
S. Aeusserlich. 5fach verdünnt zu verwenden.
1199. Acid. carbol. 5·0,
Aq. dest. 250·0.
S. Zum Abspülen.
1200. Ac. salicyl. 2·0,
Amyli pur. 30·0.
S. Streupulver.
1201. Oxyd. Zinc. 2·0.
Ung. emoll. 10·0.
S. Salbe.

Oophoritis, Eierstockentzündung.

In acuten Fällen kalte, bei manchen Personen heisse Umschl.; *Bäder mit Zus. v. Mattoni's Moor-Extr., Darkauer Jodsalz;* Ruhe; *innerlich milde saline* Abführmittel; *geg. d. Schmerz Ichthyol-, Morphium- od. Opium-Suppositoren, auch* Application von in Opiate getauchten Baumwollkügelchen an den Cervix. Ständige Priessnitz-Umschläge u. Application von Ichthyolsalbe (Ichthyoli, Lanolini ana part. aeq.) Bei gleichzeitigem Fluor albus vorsichtige milde Injectionen; Coitus zu verbieten, eventuell zu beschränken. Bei chronischer O. gynäkologische Massage.

1202. Extr. cann. Ind. 0·20.
Extr. Laudan. aq. 0·50,
Camphorae 1·0.
M. f. pill. 10.
S. Im Anfalle 1 Stück zu nehmen.
1203. Kal. bromat. 2·0.
Magnes. sulf. 3·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Auf 3mal des Tages zu nehmen.
1204. Codein. p. 1·00.
Extr. Gentian.,
Pulv. r. liquirit. aa. q. s.
f. pill. 30.
S. 2—3 Pillen täglich zu nehmen.

Orchitis, Hodenentzündg.

vide: Epididymitis.

Osteomalacie, Knochenerweichung.

Bei Schwangerschaftsosteomalacie Warnung vor neuerlicher Conception, Hygienische u. diät. Massnahmen. Eisen-, China- u. Kalkpräparate. Gegen die Knochenschmerzen Ruhelagerung. In neuerer Zeit Castration m. Erfolg geübt.

1205. Calc. carb.,
Elaeosacch. foenic. aa. 10·0.
S. Mehrm. tägl. 1 Messerspitze voll zu nehmen.
1206. Phosphori p. 0·01.
Ol. jecor. aselli 100·0.
S. 1—2 Kaffeelöffel täglich

Otitis, Entzündung des Gehörganges.

Bei Otitis externa, Abscessen im Gehörgang: über die Ohrgegend anfänglich kalte, im späteren Stadium lauwarme Umschläge. Drainage, Einreibung von narkotischen Salben; bei sehr heftigen Schmerzen und vollblütigen Individuen Blutegel. Einträufelung in den Gehörgang; Eröffnung d. Abscesse, Inductionsstrom. Bei Otitis med. acuta: Antiphlogose, Gurgelwässer, Lufteintreibung, wenn solche keine Schmerzen hervorruft; keine Einträufelung in den Gehörgang, so lange keine Otorrhoe vorhanden ist. Rücksicht auf den Allgemeinzustand, Inspection d. Nase u. des Rachens. Bei perforirt. Trommelfell hat man d. äusseren Gehörgang jedesmal zum Schutz d. Paukenhöhle m. Wattatamp. zu versehen.

1207. Morph. muriat. 0·2—0·4,
Ung. emoll. 10·0.
S. Salbe, erbsengross um's Ohr einzureiben, eventuell in den Gehörgang einzupinseln.

1208. Aq. dest. 20·0,
Aq. laurocer. 10·0.
S. Stündlich lauwarm in's Ohr zu träufeln.

1209. Ol. Oliv. 10·0,
Morphii acet. 0·20.
S. 10 Tropfen in die Umgebung des Ohres einzureiben, oder 5 Tropfen erwärmt auf Baumwolle in den Gehörgang gesteckt.

1210. Ol. Hyosciam. 10·0,
Extr. Laudan. aq. 0·50.
S. Wie das Vorige.

Bei Otorrhoe u. noch bestehenden Schmerzen:

1211. Morph. mur. 0·20—0·40,
Aq. dest. od. Lauroc. 10·0.
S. 10 Tropfen lauwarm in's Ohr zu träufeln und 10 Min. darin lassen, 3—4mal täglich.

1212. Cocaini mur. 0·20,
Aq. dest. 10·0.
S. Ins Ohr lau einzugiessen und 10 Min. darin zu lassen.

Nach Sistirung der Schmerzen:

1213. Acid. boric. subtiliss. pulv. 10·0.
S. Mittelst Federkiels mehrmals täglich (je nach d. Stärke der Secretion) einzublasen.

1214. Nosophon 5·0
od. Nosophen,
Acid. boric. aa. 2·5.
S. Dünn in das Ohr einzublasen nach Ausspülung des Ohres mit 0·2—0·5% Antinosinlösung.

1215. Plumb. ac. bas. sol. 15·0.
S. Tropfen (anfängl. 1 Tropf. auf ½ Kaffeel. lauen Wassers, später 3 bis 5 Tropfen pur ins Ohr zu träufeln und 3 Minuten darin lassen, 1- bis 2mal täglich nach vorausgegangener Ausspritzung des Ohres).

In Fällen v. serös. Exsudation, ferner bei grosser Perforation n. Ausspülung mit Borsäurelösung und sorgfältiger Abtrocknung:

1216. Aristol. 5·0.
S. Zum Einblasen.

1217. Zinci sulf. 0·50,
Aq. dest. 50·0.
S. 2mal täglich je 10 Tropf. lauwarm ins Ohr zu träufeln.

Bei Myringitis Einträufel. von:

1218. Morph. mur. 0·1,
Cocain. mur. 0·3,
Aq. dest. 10·0.
S. 10 Tropfen in d. Gehörgang zu träufeln und 5 bis 10 Minuten darin zu belassen.

Bei ernsteren Symptomen Kälte, Blutentziehung, Paracentese des Trommelfelles.

Bei Trübung. d. Trommelfelles

1219. Glycerini 10·0,
Jodi p. 0·01,
Kal. jodat. 0·10.
S. Zum Bepinseln d. Trommelfelles.

Bei chronischer Otorrhoe Plumbum od. Zincum; erst spät. z. Beseitig. d. Secret. u. Schwellung:

1220. Arg. nitr. cryst. 0·5—0·7, Aq. dest. 10·0.
S. 10—15 Tropfen in den Gehörgang. (Bei nach vorn und unten seitlich geneigtem Kopfe.) Im Falle dabei keine Schmerzen auftreten, 2—3 Minuten darin lassen, 2—3mal wöchentlich.

Vor und nach der Anwendung dieses Mittels wird das Ohr mit lauwarmem Wasser ausgespritzt. Auch Inspersionen von Alumen crud. pulv., eventuell von purer Borsäure in die Paukenhöhle mittelst Federkiel zu empfehlen.

Bei übelriechendem Ohrenflusse Ausspritz. mit 1—2%ig. Carbolsäure, rosarother hypermangansaurer Kalilösung.

1221. Thymol. 0·50.
Aq. dest. 500·0.
S. Zu Ausspritzungen. (Zur Hälfte mit Wasser verdünnt.)

Einträufelung von

1222. β-Naphtol. 1·5—3·0, Alcohol. 100·0.
S. Ohrtropfen.

Bei diphtheritischen Processen:

1223. Acid. salicyl. 5·0, Acid. boric. 15·0,
M. f. pulv. subt.
S. Ins Ohr eingeblasen nach Bedarf öfter des Tags.

Geg. nervöses Ohrensausen neben allgemeinem Regime elektrische Behandlung, eventuell:

1224. Natr. bromat. 15·0.
Div. in dos. = 15.
S. 3 Pulv. täglich.

Geg. Otalgia nervosa Anwend d. narkotischen Salben (vide oben); *Einspritzung von 2%igem Cocain in die Paukenhöhle mittelst Tubenkatheters; Behandlung mit nductions- und galvanischem rom.*

1225. Ol. Hyosc. coct. 10·0, Tinct. opii simpl. gtts. 10.
S. 10 Tropfen auf Baumwolle ins Ohr.

Bei Labyrintherkrankungen nach Syphilis Jodkali innerl. u. äusserl. und vor Allem Elektricität:

1226. Kal. jodat. 5·0, Jodi pur. 0·05, Camphorae ras. 0·20, Ol. Caryophyll. gtts. 5, Ung. emoll. 50·0.
S. Haselnussgross einzureib.

Bei typisch. Otalgie Chinin, ferner:

1227. Sol. ars. Fowleri 10·0.
S. Je 3—8 Tropfen täglich (zuvor steigen, dann sinken).

Bei gleichzeitiger Dentalgie Inspection wegen cariöser Zähne. Gegen nässendes Ekzem d. Ohrmuschel und des äusseren Gehörganges Berücksichtigung d. ätiologischen Momente:

1228. Ung. Diachyl. 20·0.
S. Salbe.

1229. Florum Zinci 0·50, Ung. emoll. 15·0.
S. Salbe (zum Bepinseln).

1230. Acid. boruc. 1·0, Ung. emoll. 10·0.
S. Salbe (im schmerzhaften Stadium).

1231. Merc. praecip. rubr. 0·10, Ung. emoll. 5·0.
S. Salbe (im schupp. Stad.).

Vide: Cerumenanhäufung.

Oxalurie.

Rigorose Entzieh. aller Kohlenhydrate aus der Kost, also keine grünen Gemüse u. Früchte, keine mehl- und zuckerhältigen Speisen. Essig, Citronensaft, süsser Wein, wenig Fette. Gestattet ist ausschliesslich albuminhältige Diät wie bei Diabetes, daher Fleisch, Fische, Austern, Bouillon. Medicamentös: Salzsaures Pepsin, eine Messerspitze nach der Mahlzeit und noch 2 derartige Dosen nach

je 1 Stunde. Daneben Alkalien durch mehrere Monate in Pulvern oder Mineralwässer: Karlsbad, Vichy, Giesshübler, Krondorfer, Baden-Baden; viel Bewegung, gymnast. Uebung., Hydrotherapie.

1232. Natr. bicarb. 10·0—40·0,
Lith. carb. effervesc. 50·0.
M. f. p. div. in dos. = 20.
S. Morgens und Abends 1 Pulver mit etwas Wasser.

1233. Natr. phosphor. 10·0.
Div. in dos. = 10.
S. 1 P. nach der Mahlzeit, ev. auch Abends.

Oxyuris vermicularis, Madenwurm.

Prophylaktisch peinliche Sauberkeit der Hände, zumal der Nägel. — Oft genügen Klystiere mit kaltem Wasser; in anderen Fällen medicamentöse Mittel zuzufügen. Empfehlenswerth ein Klysma aus Knoblauch in Milch zerrieben. Auch solches mit Kalkwasser, Kochsalzlösung oder Carbolsäure $^1/_2$ bis 1 Procent. Radical wirkt Abführen mittelst Bitterwasser durch einige Tage und gleichzeitige Hegar'sche Irrigationen, am besten mit:

1234. Sapon. medicinal. 5·0,
Aq. dest. 1000·0.
S. Durch 8 Tage tgl. 1mal 1—3 Liter zu irrigiren.

1235. Inf. flor. Tanaceti e 5·0 ad 80·0,
Syr. mannat. 10·0.
S. Jede 2. St. 1 Kinderlöff.

1236. Santonini 0·15,
Ol. Papaceris 50·0.
S. Zum Klystier.

1237. Naphthalin. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zum Klystier.

Kindern:

1238. Naphtulin 1·0,
Ol. olivar. 40·0.
S. Zum Klysma.

Naphthalin auch innerlich: 8—10 Dosen v. 0·015—0·04, 4mal täglich 1 Pulver, nach 8 und 14 Tagen zu wiederholen.

Auch Befettung d. Aftergegend mit Ung. Hydrarg.

Ozaena, chronischer Schnupfen.

Allgemeinbehandl. des Grundleidens (Syphilis, Scrophulose). Bei der hyperplastischen Form Galvanokaustik, Adstringentien, Desinfection methodische Pinselungen mit Tinct. jodi. Bei der atrophischen Form nur ganz leichte Aetzungen auf galvanokaustischem Wege od. mit Höllenstein. Tägl. Entfern. v. Krusten durch Ausspritzung mit 1%iger Kochsalzlös. Gegen die Borkenbildung wird die Einlegung von 3–5 Cm. langen, den Nasengang ausfüllenden Wattetampons empfohlen, welche alle 24 Stunden zu wechseln sind. Daneben Vibrationsmassage.

1239. Alum. crud. pulv. 5·0,
Sacch. alb. 20·0.
M. f. pulv. d. ad scat.
S. Schnupfpulver.

1240. Natr. chlor.,
Natr. bicarbon.,
Natr. salicyl. aa. 15·0.
Mf. pulv.
DS. Täglich 1 Messerspitze in einem Glase lauwarmen Wassers gelöst zur Irrigation der Nase (Nasenschiffchen).

1241. Naphtol. β 6·0,
Tinct. Quillayae 50·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich. Ein mit dieser Lösung getränkter Wattetampon wird in die gereinigte Nase eingeführt und $^1/_4$ Stunde darin belassen.

1242. Borac. 20·0,
Glycerin. 70·0,
Aq. dest. 30·0.
S. Zur Besprühung.

d. Trautmann'schen Nasenspray aus Glas eine kleine Quantität in jede Nasenhälfte einzusprühen, hierauf die Nase zu reinigen u. die Nasenhöhle in gleicher Weise nochmals energ. einzusprühen. 2–3mal täglich.)

Die Röthung und Schwellung der Nasenschleimhaut und die profuse Secretion werden nach Valentin binnen wenigen Stunden wesentlich verringert oder gänzlich behoben durch:

1243. Acid. sulfanilici cryst. 10·0,
Aq. dest. 200·0,
Natr. bicarbon. 8·5,
Fiat saturatio
S. 2mal täglich 2—3 Esslöffel voll zu nehmen.

oder:

1244. Zinci sozojodol. 1·0,
Aq. dest.,
Glycerin. aa. 10·0.
S. Zum Einpinseln (bei starker Schwellung und Secretion).

1245. Ac. thymol. 0·25,
Aq. dest. 1000·0.
S. Zu Einspritzungen.

1246. Kreosot. 5·0,
Alkohol (70%) 10·0,
Glycerin. 40·0,
local zu verwenden, abwechselnd mit Kreosot und Glycerin aa., einmal täglich.

1247. Argent. nitr. cryst. 0·10 bis 0·50.
Gelat. q. s. ut f. bacilli.
Dent. tal. dos. Nr. 10.
S. Nasenbougie. (Ueb. Nacht in die Nase zu schieben.)

1248. Cupr. sulfur. 0·10—0·30.
Gelatini etc. wie vorher.

1249. Aristoli p. 5·0.
S. Zur Einblasung in die Nase.

1250. Menthol-Jodol. 50·0.
S. Zur Einblasung in die Nase.

Zur Beseitigung des üblen Geruches:

1251. Acid. trichloracetic. 2·0.
S. Zur Herstellung 0·5- bis 10%iger Lösungen (anfangs mit den schwächeren, dann mit den stärkeren Lösungen die Nasenschleimhaut zu bepinseln).

Panaritium. Acute Fingerentzündg., Fingerwurm.

Frühzeitige Entspannung der Gewebe durch Incision unter antiseptischen Cautelen. Sorge für unbehinderte Entleerung des Eiters. Ruheschiene. Mitella. Bei tiefliegendem P. Suspension der Extremität, tiefe, ausgiebige Incisionen, antisept. Verband. Bei P. septicum (nach Infection) Incision, Aetzung mit 1proc. Sublimat- oder 5proc. Chlorzinklösung, Verband.

Pannus.

Ermittelung der Ursachen, ob Trachom oder Conj. scroph.; im ersten Falle Cuprum (Nr. 428), im letzten Falle bei starken Reizerscheinungen Atropin, b. Fehlen solcher Calomel etc. (Nr. 447). Bei inveterirt. Pannus und beim Fehlen trachomatös. Wucherung. auf der Conjunctiva, sowie bei narbiger Schrumpfung der Bindehaut Zerstäubung mittelst des Sigle'sch. Zerstäubungsapparates oder Jequirity (Nr. 433), Peritomie, Scarification, Thermokauter.

1252. Tinct. Op. croc.,
Aq. dest. aa. 10·0.
S. Zur Zerstäubung.

1253. Natr. carbon. 1·0,
Aq. dest. 25·0.
S. Wie vorher.

1254. Cupr. sulf. 1·0,
Aq. dest. 20·0.
S. Wie vorher.

1255. Cupr. sulf. 1·0,
Glycerini 20·0.
S. Wie vorher.

Paralysis, Lähmung.

Die allenfalls bekannte Ursache zu berücksichtigen; warme und Dampfbäder; in manchen Fällen dagegen Kälte in Form von Douchen oder die Kaltwassercur; entsprechende Diät; Elektricität (farad. und galvan. Strom). Massage in passenden Fällen. Bäder mit Zusatz von Mattoni's Moor-Extract oder Darkauer Jodsalz.

1256. Extr. Nuc. vom. 0·20,
P. et Extr. r. Acor. q. s.
ut f. pill. Nr. 20.
S. Früh, Mittags u. Abends je 1 Pille.

1257. Strychnini sulf. 0·02,
Sacch. alb. 2·0,
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Täglich 3 Pulver.

1258. Strychn. mur. 0·05,
Aq. dest. 3·0.
S. 10 Tropfen 3mal tgl. (subcut.).

Paralysis agitans, Schüttellähmung.

Causale Behandlung, Kaltwassercur, Elektricität, Massage, protrahirte warme Bäder.

1259. Liq. Kalii arsenicos. 2·0,
Aq. dest. 4·0.
S. Zur subcutanen Injection (tägl. $^1/_2$ Spritze).

1260. Hyosciamin. 0·02,
Pulv. Liquir.,
Succ. Liquir. aa. q. s.
ut f. pill. Nr. 20,
Consp. pulv. Lycopod.
S. 2mal tgl. 1—2 Pillen.

1261. Atropin. sulf. 0·005,
Aq. dest. 10·0.
S. Tägl. 1 Pravaz-Spritze.

1262. Hyoscin. hydrobromici 0·005,
Aq. dest. 10·0.
S. $^1/_4$—1 Pravaz-Spritze zu injiciren.

Paralysis nervi facialis

vide: Facialislähmung.

Paralysis progressiva.

Im Prodromalstadium Untersagung jeder geistigen und körperlichen Anstrengung, namentlich vollständige Entlastung von Geschäften, Vermeidung jeder Aufregung, von Excessen; regelmässige Lebensweise, am besten in entsprechender Heilanstalt Jod und Bromkali, gegen Kopfschmerz kalte Umschläge, Morphium, bei Schlaflosigkeit, Bier, Paraldehyd; prolongirte Bäder, Mattoni's Moor-Extract, Einpackungen. Bei grösserer Aufregung Hyosciamin, Cannabinum tann., Morph.-Inj. Bei epilept. u. apoplectif. Anfällen kalte Umschläge und entsprechende Vorsorge. Bei gehäuften Anfällen Chloralhydr. Bei vorgeschrittenem Lähmungszustand grösste Reinlichkeit; bei Schlingbeschwerden behutsame Ernährung, am besten ausschliesslich flüssige Nahrung. Bei Verdacht auf Syphilis Inunctionscur.

Parametritis vide: Perimetritis.

Paraphimosis, spanischer Kragen.

Bei mässiger Schwellung des eingeklemmten inneren Vorhautblattes sofortige Reposition; bei bedeutender Schwellung Ueberschläge mit kaltem Wasser (Plumbum, Kal. chlor., Kal. hypermang. etc.) durch 1 Stunde in horizontaler Lagerung anzuwenden, worauf die Reposition zu erf

hat. Ist die Einklemmung am Dorsum zu stark, so wird eine Incision der einschnürenden Stelle nöthig sein.

1263. Aq. plumb. 200·0.
S. Zu Umschlägen.

Paresis vesicae vide:

Blasenlähmung.

Parotitis, Entzündung der Ohrspeicheldrüse, Mumps.

Anwendung v. feuchter Wärme (Haarlinsenumschläge). Nur bei heftiger Entzündung u. Schmerzhaftigkeit kalte Umschläge; säuerliches Getränk und Abführmittel. Falls Eiterung erfolgt, ist die Incision am Platze mit darauffolgenden warmen Umschlägen. Jodvasogen.

1264. Kali jodat. 1·0.
Jodi pur. 0·10,
Ung. emoll. 20·0.
S. Salbe.

1265. Ung. Hydrarg. Lanolin 10·0.
S. Zum Einreiben.

1266. Empl. sapon. 10·0
S. Pflaster.

Gegen zurückbleib. Induration:

1267. Jodoform. 1·0,
Vaselin. 30·0.
Ol. Menth. pip. gtts. 3.
S. Salbe.

Pediculi capitis, Kopfläuse.

Mechan. Entfernung der Nisse bei kurzgeschnittenem Haare. Bei Frauen durch häufige Waschungen mit einer gesättigten Sodalösung. Die Parasiten werden durch mehrmaliges Einsalben des Kopfes mit

1268. Ol. petrae 20·0,
Ol. olivar.
Balsam. Peruv. aa. 10·0.
S. Aeusserlich.

ertödtet, worauf man den Kopf t einem wollenen Tuche einen Tag bedeckt hält. Hierauf wäscht man mit Spirit. saponat. kalin.

Pediculi pubis vide:

Morpiones.

Pediculi vestimentorum, Kleiderläuse.

Reinigung der Kleider durch Einwirkung hoher Temperaturen. Die artificiellen Ekzeme schwinden nach Seifenwaschungen u. öligen Einreibungen.

Peliosis vide: Morbus maculosus Werlhofii.

Pemphigus, Blasenausschlag.

Bei zerstreut stehenden Blasen Streupulver (vide Ekzem); dicht gedr. Blasen zu eröffnen. Mit Krusten belegte, der Epidermis beraubte Stellen mit indiff. Salben zu bedecken. Bei entzündeter Haut kalte Umschläge. Bei P. vulgaris Bäder zu versuch. Bei P. foliaceus continuirl. Bad; bei P. pruriginosus protrahirte Theerbäder.

Pericarditis, Herzbeutelentzündung.

Absolute Ruhe, symptom. Behdl. des Fiebers; kalte Umschläge auf die Herzgegend, eventuell Blutegel; bei vermehrt. Herzaction Digitalis, Strophantus (s Vitium cordis), Regelung d. Stuhlgangs; bei heftigen Schmerzen subcutane Morphin-Injection, roborirende Diät. Gegen das Fieber Chinin, Tonica, Eisen, Bettruhe, so lange Exsudat besteht. Bei Lebensgefahr infolge rasch wachsenden Exsudates Punction des Pericardium.

Perimetritis.

Im acuten Stadium strenge Antiphlogose; ruhige Bettlage, Blutegel an die Inguinalgegend; Eisbeutel auf den Leib; Narcotica, m. Ausschl. d. subcut. Morphin-Injectionen; Suppositorien. Bei Stuhlverstopfung milde Laxantien.

Nach Abfall des Fiebers milde Abführmittel (v. Obstipatio alvi). Klystiere. — Bei chron. Perimetritis Priessnitz'sche Umschläge, Sitzbäder (Zusatz von Mattoni's Moor-Extr.), Darkauer Jodsalz, Vaginalirrigationen. Soolu. Moorbäder (Ischl, Marienbad, Franzensbad). Gynäk. Massage.

1269. Jodoform. 3·0,
Balsam. peruv. 6·0.
Ungt. Glycerin. 24·0.
S. Aeusserlich (mittelst Tampons 2mal wöchentl. zu appliciren).

1270. Jodoform. 0·25,
Ol. Cacao q. s. ut f. globulus vaginalis.
D. tal. dos. V.
S. Aeusserl. (in d. Zwischentagen zu verwenden).

1271. Ichthyoli 20·0,
Glycerini 200·0.
S. Aeusserlich. (Mit dieser Lösung befeuchtete Wattetampons sind täglich in die Vagina einzuführen.)

1272. Ichthyol. p. 10·0,
Vaselin. 100·0.
S. Salbe. (Zur Einreibung der Bauchdecken.) Siehe auch Metritis.

In gleich. Weise wird Thiol verwendet.

Periostitis, Beinhautentzündung.

Einpinselungen mit Jodtinctur, Dunstumschläge. Bei Suppuration Incision, antiseptisch. Verband. Zweckmässige Lagerung und Fixirung der Extremität. In chronischen Fällen Massage.

Peritonitis, Bauchfellentzündung.

Absolute Ruhe, Eisumschläge auf den Unterleib, Opium; später warme Umschl.; im Beginne der Erkrankung und bei theilweise localisirten Schmerzen Blutegel (10—12 Stück) oft von Nutzen. Strenge Diät. Gegen das Fieber Chinin od. Salicylsäure; ernähr. Klystiere mit Pepton oder Fleischpancreas (vide Carc. ventr.). Bei chron. Peritonitis kräftige Ernährung m. Milch und Eiern. Einreibungen v. Ung. ciner. etc., b. Herabgekommenen rob. Mittel, Moorbäder (Mattoni's Moorsalz).

1273. Extr. opii aq. 0·30,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Jede 2. Stunde 1 Pulv.

1274. Emuls. comm. 200·0,
Aq. Laurocer. 10·0.
Mur. Morphii 0·10.
S. Stündl. 1 Esslöffel.

1275. Resorcinum resublimat.
Aq. dest. 180·0, [2·0,
Tinct. opii simpl. gtt. XV.
Syr. simpl. 20·0,
D. in vitr. nigro.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Gegen Erbrechen Eispillen, Giesshübler, Salvator.

1276. Aq. Lauroc. 15·0,
Mur. Morph. 0·10.
S. Tropfen.

1277. Cocain. mur. 0·3,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2—3stündl. 1 Pulver.

Gegen Singultus neb. Morphium innerlich od. als Injection in hartnäckigen Fällen leichte Chloroformnarkose. Gegen hochgradigen Meteorismus Aufträufeln von Aether auf das A domen, innerlich Magnes. u Aq. Calcis, Einführung langen Drainrohrs in den darm. Bei Stuhlverstopfun

Ablauf der entzündlichen Erscheinungen Klysmen, milde salinische Abführmittel. — Gegen Collaps Analeptica, Wein, Cognac, Aetherinjection, Campher und Moschus.

Bei zurückgebliebenem Exsudate Einreibung des Abdomen mit Schmierseife u. Trockenverband, ferner

1278. Kali jodat. 2·0,
Aq. font. 120·0,
Syr. cort. Aurant. 20·0.
S. 2stündl. 1 Essl.

1279. Kali jodat. 2·0,
Jodi pur. 0·50,
Glycerini 50·0.
S. Zum Einreiben.

Perityphlitis vide: Typhlitis.

Perniones, Frostbeulen.

Möglichste Schonung der erkrankt. Stelle durch entsprechende Fussbekleidung, wenig Bewegung; bei gross. Ausdehnung u. Schmerzhaftigkeit Ruhe durch einige Tage und Umschläge.

1280. Merc. praecip. alb. 5·0
Ung. emoll. 50·0.
S. Salbe (messerrückendick auf Leinwand aufzustreichen)

1281. Ary. nitr. cryst. 0·20,
Vaselini 10·0.
S. Salbe.

1282. Oxyd. Zinc. 5·0,
Ung. emoll. 30·0.
S. Salbe.

1283. Ac. carbol. 1·0,
Ung. Plumbi.,
Lanolini aa. 20·0,
Ol. amygdal. 10·0,
Ol. lavandul. gtts. 15.
S. Frostsalbe. (Lassar.)

1284. Collodii pur. 20·0,
Jodi pur. 0·20.
S. Zum Bepinseln.

1285. Collodii 50·0,
Ol. Ricini 2·0,
Terebinth. 7·50.
S. Zum Bepinseln.

1286. Cutoli,
Camphor. trit. aa. 3·0.
Resorbini,
Lanolini aa. 15·0.
S. Frostsalbe.

Nach Aufbruch der Frostbeulen antiseptischer Verband, später Zinksalbe u. ähnl.

Pertussis vide: Tussis convulsiva.

Pharyngitis vide: Catarrhus pharyngis.

Phimosis, Verengerung der Vorhaut.

In mässigen Formen Injection von einfachem oder mit Medicamenten gemengtem Wasser bis zur Eichelfurche ringsumher; bei intensiveren Entzündungen auch Eisumschläge und Bettruhe; Incision oder Circumcision der Vorhaut bei drohender Gangrän, bei längerem Gleichbleiben der Erscheinungen, sowie bei hochgradiger angeborener Phimose. In manchen Fällen reicht Einführung von Pressschwamm aus.

1287. Kal. hypermang. 1·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Aeusserlich.

1288. Liq. Burowi 500·0.
S. Aeusserlich (kann auch zu Umschlägen auf das Glied verwendet werden).

Bei sphacelöser oder gangränöser Beschaffenheit der Vorhaut Injection und Umschläge mit:

1289. Calcar. chlorat. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.

Phlebitis, Venenentzündung.

Bei acuter P. vollständige Ruhe, Hochlagerung d. Theiles

Eisblase, später vorsichtige Einreibungen mit Ung. cinereum. Nach Ablauf der Schmerzhaftigkeit Einwickelung mit Flanellbinden. Bei chron. P. unterer Extremitäten Bindeneinwickelungen, elastische Strümpfe.

Phlegmone, Zellgewebsentzündung.

Im Beginne der Erkrankung Ruhe, Kälte, Hochlagerung des Gliedes. Umschläge mit essigsaurer Thonerde.

1290. Alumin. crud. 5·0.
Plumb. acet. 25·0.
Aq. font. 500·0.
S. Aeusserlich.

Bei Fluctuation oder — falls selbe auch nicht nachweisbar — bei allgem. Erscheinungen der Suppuration (Fieber, Schmerzhaftigkeit etc.) Incision, Aufsuchen des Eiters in der Tiefe, antiseptische Behandlung. Zur Nachbehandl. warme Localbäder, passive Bewegungen, Massage.

Phthisis laryngis vide: Tuberculosis.

Phthisis pulm. vide: Tuberculosis.

Pityriasis versicolor, Kleienflechte.

Therapie dieselbe wie bei Herpes tonsurans, s. d. Epicarin.

Ausserdem:

1291. Tinct. Benzoës.
Spirit. vini rect. aa. 50·0,
Acid. salicyl. 10·0.
S. Zum Einpinseln.

Pleuritis, Brustfellentzündung.

Milderung der Fiebersymptome durch Antiphlogose, säuerliche Getränke etc. Application von Eisumschlägen auf die erkrankte Seite. Gegen die heftigen Schmerzen Chloroformeinreibungen, subcutane Morphininject., event Senfpapier (bei kräft. Individ.) 10 bis 12 Stück Blutegel etc.; später resorptionsbefördernde Mittel, kräftige Nahrung, Eisen etc. Bei hochgradiger Athemnoth und Stationärbleiben des pleurit. Exsudates, b. Exsudaten, welche eine Brustseite ganz oder fast gänzlich ausfüllen, endlich bei Empyem ist die operative Entleerung des Exsudats vorzunehmen. Zur Entfernung v. Exsudatresten Aufenthalt in Höhenluft.

1292. Chinini mur. 1·0,
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Tagsüber zu nehmen.

1293. Natr. salicyl. 2—4·0.
Div. in dos. = 4.
S. Wie das Vorige.

1294. Inf. fol. Digit. e 1·50
Liq. Kal. acetic., [ad 120·0,
Oxymell. Scill. aa. 30·0.
S. 2stündl. 1 Essl.

1295. Tct. Stroph. hisp. 20·0,
S. 3mal tgl. 5—15 Tr.

1296. Ol. Hyosciami coct.,
Chloroform. aa. 20·0.
S. Zum Einreiben.

Zur Resorption des Exsudates Jodpräparate:

1297. Kal. hydrojod. 2·0,
Jodi pur. 0·50,
Glycerini 20·0.
S. Zum Einreiben.

1298. Kal. jodat. 2·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. simpl. 10·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei heftigeren Schmerzen subcut. Morphininjection. — Behufs Ableitung d. Exsud. eignet sich auch:

1299. Rad. Ononid.,
Ligni Junip.,
Fruct. Junip.,
Fruct. Petroselin. aa.
M. f. Species. S.

In neuester Zeit wird empfohlen: Bepinselung d. befallenen Thoraxpartie mit:

1300. Guajacol 3·0,
Glycerin..
Tinct. jodi aa. 20·0

Bei Kindern in acuten Fällen:

1301. Tinct. Scillae,
Tinct. Digital. aa. gtts. 10,
Oxymell. Scillae 20·0,
Aq. Tiliae 100·0.
S. Stündlich 1 Theelöffel.

Zur Nachbehandlung kräftige Kost, Aufenthalt am Lande, im Gebirge, an der See.

Pneumonia crouposa,

Lungenentzündung.

Bettruhe, gleichmäss. Temperat d. Zimmers (18—19°), strenge Diät. In leichteren Fällen exspectatives Verfahren; in schwe eren Fällen Antipyrese und Alcoholica. Als Antipyretica Chinin, Digitalis, methodische kalte Bäder, die übrigen Antipyretica, wie Antipyrin, Phenacetin wegen ihrer deprimirenden Wirkung auf das Herz mit Vorsicht anzuwenden. Durststillende Mittel. Im Bedurfsfalle Abführmittel. Bei kräftigen jugendl. Individuen mit starker Dyspnoe ein Aderlass (250 bis 400 Grm.) zu versuchen. Gegen heftige Schmerzen warme Umschläge oder einige Blutegel. Bei Collaps Analeptica (starken Wein Camph-, Moschus, Aether). Zur Erhaltung der Herzkraft Rothwein, Cognac, Thee, Champagner. Bei alten Individuen Alkohol-Behandlung gleich im Beginne. In der Reconvalescenz reichliche Ernährung, eventuell *Eisen.*

1302. Natr. salicyl. 5·0,
Aq. dest. 200·0,
Syr. simpl. 15·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1303. Chinin. sulfuric. 2·0.
Morph. mur. 0·05,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3—4 Pulver tägl.

1304. Dect. r. Alth. 200·0,
Syr. rub. Id. 20·0.
S. Zum Getränke.

1305. Dect. Hordei 200·0,
Aq. Lauroc. 5·0,
Oxymell. simpl. 50·0.
S. Zum Getränke.

1306. Acid. phosph. 10·0,
Syr. rub. Id. 50·0.
S. Zusatz zum Getränke.

1307. Infus. fol. Digital.
e 2·0 : 170·0,
Syrup. Diacod. 30·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel voll.

Bei geschwächter Herzthätigkeit und Adynamie:

1308. Camphorae 0·20.
Acid. benzoic. 1·0,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3stündlich 1 Pulver.

1309. Amm. pur. liq. gtts. 5.
Aq. dest. 150·0,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1310. Liqu. Amm. anis. 5·0.
S. Je 5 Tropfen ½stündlich auf Zucker.

Als Expectorans im Stadium der Lösung:

1311. Apomorph. mur. 0·03.
Aq. dest. 100·0,
Syr. simpl. 20·0.
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1312. Inf. rad. Ipecac.
e 1·0 : 180·0,
Syr. Seneg. 15·0,
Vin. Antimon. 10·0.
S. 1—2stündl. 1 Essl.

Bei Ausgang in Gangrän oder Abscess Terpentin innerlich.

Bei chronischen Pneumonien feuchtwarme oder Dunstumschläge.

Als Kräftigungsmittel in der Reconvalescenz:

1313. Ferr. hydrog. reduct. 8·0,
Extr. Chin. 2·0.
M. f. pil. Nr. C.
S. 3mal täglich 1—3 Pillen nach dem Essen.

1314. Chinin. sulfur. 1·5,
Ferr. reduct. 5·0,
Rad. gentian. 0·5,
Extr. gentian. 2·5,
M. f. pil. Nr. LX.
S. 3mal täglich 2 Pillen.

B. Kindern eignen sich kalte Umschläge auf die Brust; im Stadium d. Lösung Wein, Kaffee, Excitantia; b. Collapsus Campher.

Bei sehr frequentem Puls:

1315. Inf. fol. digital. e 0·25 ad 90·0.
Syr. rub. Idaei 10·0.
S. In 4 Portionen im Laufe des Tages zu nehmen.

1316. Coffein. natr. benzoic. 0·4,
Sacch. pulver. 3·0.
Mf. pulv. div. in dos. X.
DS. Täglich 4 Pulver.

Im Stadium der Lösung:

1317. Inf. rad. Polygal. Seneg. e 10·0 ad 100·0.
Liq. Ammon. anis. 1·0,
Syr. cort. Aurant. 10·0.
S. 2stündl. 1 Kinderl.

Gegen Collaps:

1318. Camphor. 1·0,
Ol. olivar. 10·0.
S. Injection.

1319. Moschi in pulv. 0·3,
Sacch. pulv. 2·0.
M. div. in dos. VI.
S. Stündlich 1 Pulver.

Podagra vide: Arthritis.

Poliomyelitis acuta anterior, spinale Kinderlähmung.

Im Beginn der Lähmungen am Rücken in entsprechender Höhe Eisbeutel, Chapman'schen Schlauch, eventuell Blutegel, später Einpinselung mit Jodtinctur. Symptomatische Behandlung des Fiebers, der Darmstörungen, der Inappetenz. Zur medicamentös. Behandlung wird Salicylsäure u. Natr. salicyl. empf. 2—3 Wochen nach dem Auftreten der Lähmungen Beginn der galv. Behandlung der gelähmten und atrophischen Musculatur (Anode an der Hals-, resp. Lendenanschwellung, Kathode an die Muskeln). Nach einigen Wochen daneben auch Behandlung der peripheren Nerven. (Kathode am Nerven, Anode am Muskel; Stromwenden.) Später Bäder von 26—28° R. Orthopäd. Behandl. Zu Beginn der Erkrankung:

1320. Inf. secal. corn. e 5·0.
c. Aq. dest. 150·0.
Addle Acid. sulf. dil. 3·0,
Syr. rub. Id. 30·0.
S. 1—2stündlich 1 Esslöffel.

Pollutionen, unwillkürlicher Samenabgang.

Prophylaktisch: Ueberwachung der Knaben bezüglich Onanie. Regelung der Lebensweise, der Diät, namentlich der Abendkost, hartes Bett, leichte Decke, frühes Aufstehen; Meidung geschlechtlicher Erregungen, sowie körperlicher und geistiger Anstrengungen. Land- oder Gebirgsaufenthalt, Milch- oder Kaltwassercur, Fluss- oder Seebäder. Innerlich Tonica etc., elektrische Behandlung mit dem constanten Strom. Locale Behandlung mit Sondencur, Kühlsonden, Aetzungen der Pars prost. Vide auch Spermatorrhoe.

1321. Kalii bromat. 10·0.
Div. in dos. = 10.
S. 3 Pulver täglich
Oblaten.

1322. Ergotini Bomb. 1·0,
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3—5 Pulver täglich.

Vide auch: Chorda.

Processus puerperalis, Puerperalfieber.

Prophylactisch: Keine Infection der Gebärenden oder Wöchnerinnen von Seiten der Umgebung; strenge Desinfection. Bei constatirter Erkrankung antifebrile Behandlung, Chinin, Salicylsäure, Eisumschläge, eventuell Priessnitz- oder feuchtwarme Umschläge auf den Unterleib. Behandlung der localen Erkrankung (Wunden, Geschwüre). Irrigation mit Carbol- oder Chlorwasser, Kalium hypermangan. etc. Bepinselung von Wunden mit Jodtinctur u. dgl. Berücksichtigung der Entzündung innerer Organe; eventuell chirurgischer Eingriff. Bei Endometritis Ausspülung des Uterus mit 2%iger Carbolsäure oder Sublimat 1 : 2000. Innerlich: Rum, Opiate; subcut. Morphininjection. Sorge f. leichten Stuhlgang. Vgl. Peritonitis.

1323. Acidi phosph. 10·0,
Syr. rub. Idaei 50·0.
S. Zusatz zum Getränke (bei Diarrhöe zu unterlassen).

Bei Fieber, besonders bei Schüttelfrösten:

1324. Chinini sulf. 3·0.
F. pulv. div. in dos. = 5.
D. ad caps. amylac.
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

1325. Antipyrini 2—5·0.
Div. in dos. = 10.
S. Stündlich 1 Pulver in Oblaten.

1326. Acid. salicyl. 5·0,
Div. in dos. = 10.
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

Bei Collaps:

1327. Camphor. ras. 0·50,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

Proctitis. Mastdarmentzündung, Mastdarmcatarrh.

Entfernung etwaiger hart. Kothmassen oder Fremdkörper a. d. Mastdarm (warme Klystiere). In acuten Fällen Bettruhe, Diät, temperirte Sitzbäder, Priessnitz-Umschläge auf das Perineum; bei lebhafter Schmerzhaftigkeit Eisumschläge.

1328. Decoct. Salep. e 5·0 ad
Tinct. Opii simpl., [500·0,
Acid. tannic. aa. 2·0.
S. Zu 2 Klystieren.

1329. Decoct. Althaeae 300·0,
Tinct. Opii simpl. 2·0.
S. Zusatz zu 2 Klystieren.

Gegen Tenesmus:

1330. Cocain. mur. 0·5,
Ung. emoll. 25·0.
S. Erbsengross in d. Afteröffnung einzureiben.

Bei chronischem Mastdarmcatarrh kalte Sitzbäder und Klysmen:

1331. Decoct. Quercus e 20·0 ad
Alum. crud. 2·0. [200·0,
S. Auf 2 Klystiere.

Bei gleichzeitiger Periproctitis chirurg. Behandlung.

Prosopalgia vide: Neuralgia trigemini.

Prostatitis.

Bettruhe, warme Sitzbäder, restringirte Diät, leichte Abführmittel, Narcotica, Ung. Hydr. cin.-Salbe auf das Perineum, Umschl.; bei Fluctuation Incision.

Prurigo, Juckblattern.

Bei Kindern lauwarme Bäder und gleichzeitige Abreibung mit Schmierseife, nach d. Abtrocknung Einreibung mit Fett oder Leberthran; auch Sodabäder. Rücksicht auf den Allgemeinzustand. Bei Erwachsenen kalte Bäd., Douchen, Schmierseife, Solut. Vlemmingkx (vide Nr. 1768). Bestehende Ekzeme vorher zu beseitigen.

1332. Bals. Peruvian.,
Glycerin. aa. 25·0.
S. Mittelst Pinsels aufzutrag.
1333. Ol. Rusci 5·0,
Saponis pulc. 100·0,
M. f sapo.
S. Seife (bei Kindern in leichten Fällen ausreichend).
1334. Naphtoli 10·0,
Axung. Porc. 100·0.
S. Salbe. (Ung. Naphtol. simplex.)
1335. Acid. carbol. 1·0,
Glycerin. 10·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Zu Waschungen.
1336. Kali carb. 1·0,
Kali sulfur. 2·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Zu Waschungen.
1337. Gallanol. 10·0,
Alcohol. (95%) 80·0,
Liq. Ammon. caust. 1·0.
S. Zum Einpinseln.
Empfohlen *Pilocarpin subcut.*

Pruritus, Hautjucken.

Behandlung d. eventuell. Grundleidens. Kühle Bäder (Fluss-, See-, Douchebäder) mit oder ohne medicamentöse Zusätze (Sublimat, Alaun, Soda, Sol. Vlemmingkx etc.). Betupfen mit leicht verdunstenden Medicamenten (vide *Urticaria*). Bei Pr. vulvae et *vaginae* und Pr. ani Localbäder, *Cocaineinpinsel.*, Einspritzungen oder *Tampons* mit adstringirend. Lösungen (1%ige Alaun-, Arg. nitr.-, Tannin- od. Zinklösungen). Bei excessivem Jucken Narcotica. Ferner zu versuch.: Bromnatrium, Pilocarpin, Sol. Fowleri, Guberquelle, Atropin, Chinin. — Bei Pr. senilis Waschungen des Körpers mit Wasser von 40° R., dem 2 Esslöffel folgender Lösung hinzugefügt werden:

1338. Acid. carbol. 4·0.
Acet. aromat. 200·0.
S. Aeusserlich.

Hierauf Bestreuung mit

1339. Bismuth. salicyl. 20·0,
Amyli p. 80·0.
S. Puder.
1340. Spir. vini gallic. 200·0,
Acid. carbol. (s. salic.) 1·5.
S. Zum Betupfen.
1341. Aether sulf.,
Aq. coloniens. aa. 50·0.
S. Wie das Vorige.
1342. Extr. Belladonnae 0·5,
Vaselini 10·0,
Lanolini 5·0.
S. Salbe.
1343. Cocain. mur. 1·0.
Vaselin. 15·0.
S. Salbe.
1344. Eucaini hydrochlor. 1·0,
Menthol. 0·2,
Ol. olivar. 2·0,
Lanolin ad 10·0.
M. f. ungt.
1345. Tumenol. 5·0,
Aether. sulf.,
Spir. vin. rectificatiss.,
Aq. dest. (od. Glycerin.)
S. Aeusserlich. [*aa. 15·0.*
1346. Ol. Fagi,
Ol. Rusci aa. 40·0,
Ol. olivar.
Spirit. dilut. aa. 10·0.
S. Im Bade mit Oel verdünnt einzureiben.

Bei Pruritus ani:

1347. Creolini 5·0—10·0,
Vaselini 100·0.
S. Zum Einreiben.

1348. Eucain A. 1·0,
Menthol. 0·2.
Ol. olivar. 2·0.
Lanolin. ad 10·0.
M. f. ungt.
D.S. Salbe.

G. Singer empfiehlt für gewisse Fälle von P. senilis (solche mit gesteigerter Darmfäulniss) Menthol in Gaben von 0·6 bis 1·0 pro die in Gelatinekapseln.

Ferner innerlich zu versuchen:

1349. Ichthalbin 1·0—2·0.
D. tal. dos. Nr. 10.
S. 2—3mal täglich 1 Pulver vor den Mahlzeiten.

Pruritus vulvae.

Ermittelung der Ursache (Blennorrhoe, Carcinoma uteri, Diabetes!), Behandl. etwaiger Ekzeme der Genitalien. Ichthyoltampons. Sorge für Stuhlentleerung. Bei Anämie Eisenpräparate (Radlauer's Eisenalbumin-Peptonatessenz), Guberquelle. Innerlich Brom. Local:

1350. Acid. carbol. cr. 1·0—3·0,
Aq. font. 50·0.
S. Die afficirten Stellen zu bepinseln.
1351. Arg. nitr. cr. 1·0,
Aq. dest. 30·0.
S. Wie das Vorige.

Bei hartnäckigem Pruritus Bepinselung d. Vulva in Zwischenräumen von 6—10 Tagen mit

1352. Acid. carbol. cr.,
Alcohol. absol. aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln.

In der Zwischenzeit Anwend. von Salben:

1353. Cocain. mur. 0·2,
Ung. emoll. 20·0.
S. Salbe.

Pseudoleukaemia vide: *Lymphoma malignum.*

Psoriasis, Schuppenflechte.

Warme Bäder u. Einpackunge systematische Einreibungen m Schmierseife: zweimal tägl. durc 6 Tage, einmal täglich durc 3 Tage, sodann nach fünftägig Pause am 14. Tage ein Ba (Schmierseifencyclus); d. behaarte Kopfhaut Spir. sapo

1354. Saponis virid. 100·0.
S. Schmierseife.
1355. Spir. sap. kal. 100·0.
S. Mitt. Flanells einzurei

Bei excoriirter Haut:

1356. Ichthyoli 5—20·0,
Glycerini 50·0.
S. Zum Einreiben.

Für kleinere Flächen eignen si Salben:

1357. Naphtoli 15·0,
Axung. Porc. 100·0.
S. Salbe.

Auch Theerpräp., namentlich b Psoriasis d behaarten Kopfhau

1358. Olei Cadini 100·0.
S. Mitt. Flanelllap. einzu
1359. Olei Cadini.
Sapon. viridis aa. 50·0,
Spir. vini dil. 100·0.
S. Zum Einreiben. (Flüssi Theerseife.)
1360. Ol. Rusci 50·0,
Spir. vini,
Aetheris sulf. aa. 5·0.
Olei Lavandul.,
Olei Rutae aa. gtts. 30.
S. Mittelst Pinsels einzurei
(Wegen Verbesserung d. Thee geruchs zu empfehlen.)
1361. Hydrarg. praecip. al
Sap. Kalin. 40·0, [10
Lanolin. anhydr. 50·0.
S. Salbe (für den behaart Kopf).
1362. Naphtoli 5·0,
Ungt. emoll. 50·0.
S. Salbe.

1363. Naphtoli 1·0—5·0,
Spir. vini 100·0.
S. Zum Einreiben.

1364. Acid. pyrogall. 5·0,
Vaselini 50·0.
S. Salbe.

1365. Eugallol.,
Aceton aa. 10·0.
DS. Zum Aufpinseln.
(Kromayer.)

1366. Saligallol. 5·0—10·0,
Eurobin. 10·0—20·0,
Aceton ad 100·0.
DS. Zum Aufpinseln.
(Kromayer.)

1367. Chrysarobini 10·0,
Vaselini 40·0,
Ol. Bergamott. gtts. 10.
S. Salbe. (Mittelst Charpiepinsels auf d. psoriatische Stelle einzureiben, nachdem zuvor die Schuppen mit Spir. sapon. beseitigt wurden. Schutz der Umgebung gegen Erythem. Im Gesichte unverwendbar!)

1368. Gelatin. alb. sicc. 50·0
Aq. dest. 100·0,
M. in baln. vap. et sub assid. agit. adde: Chrysarobini q. l.
D. ad chart. cer.
S. Chrysarobine-Gelatine.
(In der Wärme aufzulösen und mittt. Borstenpinsels einzureib.) Ebenso Pyrogallus-Gelatine.

1369. Chrysarobini 0·20,
Aetheris sulf. 100·0.
Cerae flav. 0·3.
S. Als Spray zu verwenden (besonders am behaarten Theil des Kopfes).

1370. Chrysarobini 2·0,
Traumaticini 20·0.
S. Mittelst Borstenpinsels anzuwenden.
Chrysarobin auch mit Collodium 1:6 gemischt.

1371. Gallanol. 10·0,
Spiritus 50·0,
Liq. ammon. caust. 1·0.
S. Zum Aufpinseln.

1372. Alumnol.
Aq. dest. aa. 1·0,
Glycerin 3·0,
Ungt. lanolinat. 15·0.
M. S. Salbe.
Bei inveterirter Psoriasis auch die modificirte Solutio Vlemingkx.

Sehr wirksam ist *Ung. Wilkinsonii* nach Hebra's Modificat.:

1373. Sulf. citrin.,
Ol. Fagi aa. 50·0,
Sapon virid.,
Axung. porci aa. 100·0,
Pulv. cret. alb. 10·0.
S. Durch 6 Tage täglich 2mal mittelst Borstenpinsels einzureiben, am 10.—12. Tage ein Bad.

1374. Anthrarobin. 10·0.
Alcohol. 90·0.
S. Zum Einpinseln. (Auch im Gesichte anwendbar.)

Innerlich geg. Psoriasis gebräuchliche Mittel:

1375. Sol. ars. Fowl. gtts. 6,
Aq. dest. 50·0.
S. In einem Tage z. n.
Alle 4 Tage um je 1 Tropfen mehr; bei 30 Tropfen angelangt, alle 4 Tage je 1 Tropfen weniger, bis die ursprünglichen 6 Tropfen täglich erreicht sind. Kindern weniger!

1376. Sol. ars. Fowl. gtts. 60,
Aq. Menth. pip. 200·0.
S. Früh u. Abds. 1 Esslöff.
(so dass das Ganze für 10 Tage reicht; auch hier kann man bis 30 Tropfen täglich steigen und dann wieder herabgehen).

1377. Acid. arsenicos. 0·10,
Mucil. Gummi arab.
Aq. dest. aa. q. s.
ut f. pill. Nr. 15.
S. Täglich 1 Stück.

1378. Natri arsenic. 0·40,
Aq. dest. 200·0.,
S. 3mal tägl. je 15 Tro
(Solutio Pearsoni.)

1379. Acid. arsenic. subt. trit. 0·50
Piper. nigr. pulv. 5·0,
Gumm. arab. 1·0,
Aq. dest. q. s.
ut f. pil. Nr. 100.
S. 1—2—10 Pillen täglich.
(Pilulae asiaticae.)

Nach Haslund u. A. gibt die interne Behandlung m. grossen Jodkalidosen (bis 30*g* pro die) gute Resultate. — Auch mit Schilddrüsenfütterung werden Besserungen erzielt.

Purpura haemorrhagica

vide: Morbus maculosus.

Pustula malig., Carbunkel, Milzbrand.

Cauterisation d. Infectionsstelle mit Kali caust., Salpetersäure od. Paquelin's Thermocauter. Auch Excision mit darauffolgend. Cauterisation, tiefe Kreuzschnitte. Antiseptische Wundbehandlung. Umschläge von Carbolgaze in 2½%ige warme Carbollösung getaucht. Von anderer Seite wird ein möglichst conservatives Verfahren (Bettruhe, Ruhigstellung, Chlorwasser oder Bleiumschläge, graue Salbe, kräftige Diät. Alkoholica) empfohlen u. die Aetzung der gerittten Stelle nur in der allerersten Zeit als statthaft erklärt. Als Abortivbehandlung gelten subcutane Injectionen von 2%iger Carbolsäure oder 1%ig. Chinosol und Umschläge mit diesen Lösungen. Gegen Milzbrand, sowie zur Verkleinerung d. Indurationszone beim Carbunkel wird Jod int. u. subcut. empfohlen.

1380. Tinct. Jodinae 1·0.
Aq. dest. 50·0,
S. 10 Tropf. subcut. zu injic.

1381. Jod. 1·0.
Kal. jodat. 2·0.
Aq. dest. 3000·0.
S. 1 Liter tägl. als Getränk.

Pyämie, Wundfieber.

Beseitigung des ursächlichen Momentes (operat. Eingriffe), sorgfältige Desinficirung, antifebrile Therapie; starke Weine, Cognac. Kühlende Getränke, Wärme.

1382. Chinini sulfur. 2·0,
Natr. bicarb.,
Sacch. alb. aa. 1·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 3. St. 1 Pulver.

1383. Antipyrini 15·0.
Div. in dos. = 10.
S. Jede 2. St. 1 Stück (bis zur Abnahme der Temperatur).

Bei septischen Erkrankungen empfiehlt Credé sein Argentum colloïdale:

1384. Unguentum Credé 3·0.
D. tal. dos. Nr. V.
S. Salbe (In frischen Fällen zwei Abende hintereinander, in chron. Fällen 5mal jeden 2. Abend je eine Dosis (bei Kind. 1·0) einzureiben. Jede Einreibung soll 20—30 Min. dauern.

1385. Argent. colloidal. 0·5.
Sacch. lact 5·0.
Glycerin. quant. sat. ut f. pill. Nr. 50
S. Bei nüchternem Magen zu nehmen. (In acuten Fällen 2—3mal tägl. je 2 Pillen unter Nachtrinken von 100·0—200·0 abgekochten Wassers zu nehmen, in chronischen Fällen Früh und Abends je eine 1 Pille.)

Pyelitis, Entzündung der Nierenbecken.

Berücksichtigung des Causalmoments. Nur im Anfangsstadium kalte, später warme Umschläge, warme Bäder. Gegen d. Schmerzen Morphium innerlich od. in Stuhlzäpfchen (vide Nr. 356). Meidung reizender Speisen und Getränke, reizlose Flüssigk. (Milch, Mandelmilch, Salvator, Franzensbad, Nataliequelle, Giesshübler,

dörfer), in reichlicher Quantität empfehlenswerth; Sorge für leichten Stuhlgang. Bei acuter Pyelitis Bettruhe, bei Fieber Chinin, event. mit Morphium; bei chron. Pyelitis Milchcur, lauwarme Bäder

1386. Foliorum uvae Ursi.
Herb. herniar. aa. 20·0.
S. Thee. Fr. u. Ab. 1 Tasse.

1387. Tannini puri,
Lupulini puri aa. 0·50,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Fr. Mtgs. u. Abds. 1 Pulv.

1388. Bals. Copaiv. 15·0.
Div. in dos. = 30.
Exhibe in capsul. gelatin.
S. Früh, Mitt. u. Abds. je 3 St.

1389. Salol 5·0,
div. in dos. X.
D. ad caps. amyl.
S. 2stündlich 1 Pulver.

Rachitis, englische Krankheit.

Rationelle Anordnung bezügl. der Nahrung und Wohnung, bezüglich der Reinlichkeit und des Aufenthaltes in frischer Luft etc., Bäder mit Zusatz von Steinsalz od. Mattoni's Moorsalz. Besond. Aufmerksamkeit ist einer etwaigen Diarrhoe od. Obstipat. z. widmen.

1390. Ol. Jecor. Aselli. 20·0.
S. Früh, Mittags u. Abends 1 Kaffeelöffel.

1391. Phosphori 0·01,
Ol. amygd. dulc. 70·0,
Sacch. alb. pulv. 30·0,
Aetheris fragorum gtts. 20.
S. 1 Kaffeelöffel pro Tag zu nehmen.

1392. Phosphori 0·01,
Ol. Jecor. aselli. 100·0.
S. Täglich 1 Kaffeelöffel.

1393. Phosphori 0·01,
Lipanin. 30·0,
Pulv. gumm. arab.,
Sacch. alb. aa. 15·0,
Aq. dest. 40·0,
S. 1 Kaffeelöffel täglich.

Bei vorhandener Anämie:

1394. Pyrophosphor. ferri et natr. 1·0,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2—3 Pulver täglich.

Zudem auch andere Eisenpräparate und Sanatogen.

Ranula.

Spaltung der Cyste, partielle Excision der Cystenwand. Ausfüllung der Höhle mit Jodoformgaze. Nach spontaner Abstossung derselben ein antiseptisch. Mundwasser. — Verchère empfiehlt Punction der Cyste mittelst Pravaz'scher Spritze. Nach Aspiration des Cysteninhaltes wird die Canüle in situ belassen, durch dieselbe ½ Spritze einer 10% Cocainlösung und hierauf 10—12 Tropf. einer 0·1% Chlorzinklösung injicirt.

Ren mobilis, Wanderniere.

Berücksichtigung der ätiologischen Momente (allzu starkes Schnüren, habituelle Obstipation, rasche Fettabn. etc.). — Kunstgerechte Massage nach Thure-Brandt im Vereine mit entsprechender Gymnastik, Tragen einer gut sitzenden Bauchbinde. — Nephrorrhaphie.

Rheumatismus articulorum, Gelenksrheumatismus.

Ruhelage, Eisumschl. in Fällen von grosser Schmerzhaftigkeit, Einwickelung mit Watta, Flachs, Werg. In mässig intensiv. Fällen; Einreibungen mit Chloroform oder Aether; Einreibung von Ichthyol; antifebrile Mittel (säuerliche Getränke); Blutegel, Venaesection; bei längerer Dauer [illegible] Schmerzen in einem Gel[enke] zunächst Ruhigstellung

selben durch 1—2 Wochen Einpinselung mit Jodtinctur, nach Ablauf der acuten Erscheinungen Massage, passive Bewegungen, warme Localbäder. Bei chron. fieberlosen Formen systematisch, Gebrauch von lauen oder Dampfbädern, Moorbädern (Mattoni's Moor-Extract), feuchte Einwickelung., Douchen, auch Kaltwassercuren; Behandlung mit überhitzter trockener Luft von 120 bis 140° C. (Apparate von Tallermann und von Fedor Krause). Badecuren in Aachen, Teplitz, Wildbad.

1395. Natr. salicyl. 10·0,
F. pulv. dtc. in dos. = 10.
S. 1—2stündlich 1 Pulver
(Die halbe Dose als Nachcur.)

Auch d. Darreichung im Klysma wird empfohlen, wenn per os unmöglich. Nach einem entleerenden Klystier:

1396. Natr. salicyl. 6·0—8·0,
Laudan. p. 1·50,
Aq. dest. 100·0.
M. D. S. Für ein Klystier.
1397 Aspirin. 5·0.
F. pulv. dtc. in dos. X.
S. 1—2stündlich 1 Pulver
1398. Lithii salicyl. 4·0,
Syr. cort. aur. 125·0,
S. In 24 Stund. zu verbr.
1399. Saloli puriss.,
Sacch. alb. aa. 1·0,
M. f. p. drnt. tal. dos. = 10.
S. 3—4 Pulver täglich.
1400. Jodopyrin 12·0.
M. f. p. d. tal. dos. Nr. 12.
S. 3—4 Pulver täglich.
1401. Salipyrin 6·0,
Glycerin. 14·0,
Syr. rub. id. 30·0,
Aq. dest. 50·0.
S. ½—½stündl. 1 Kaffeel.
1402. Antinervin (Radlauer),
Sacch. alb. aa. 0·5.
M. f. p. da tal. dos. Nr. 10.
S. 2stündlich 1 Pulver.
1403. Euphorin. 1·0—1·5.
Dtc. in dos. = 5.
S. Tagsüber z. n.
1404. Phenocoll hydrochl. 5·0,
Dtv. in dos. = 5.
S. 3–5 Pulv. tägl. zu nehmen.
1405. Salophen. 5·0,
Dtv. in dos. = 5.
S. 2stündl. 1 Pulver bis zur Wirkung z. n.
1406. Saligenin 0·5—1·0.
S. Mehrmals tägl. 1 Pulver.
1407. Salicini 0·25—0·50,
Elaeosacch. Fornicul. 0·5,
D. tal. dos. Nr. XV ad chart. cerat.
S. 5—10 Pulver täglich.
1408. Salacetol. 2·0.
S. 2—3mal tägl. 1 solches Pulver.
1409. Salocolli 1·0—2·0.
S. Wie d. Vorige.
1410. Asaprol. 2·0—4·0,
Aq. Anis.,
Syrup. simpl. aa. 30·0.
S. Kaffeelöffelw. in Thee, Kaffee, Zuckerwasser od. Bier binnen 24 Stunden z. n.
1411. Methylii salicyl. (Olei Gaultheriae artificial.) 50·0.
DS. Aeusserlich. (Unter den behandelnden gut gereinigten Körpertheil wird Guttaperchapapier gebreitet und das Mittel tropfenweise [50—120 Tropfen] auf die Haut des kranken Gelenkes applicirt, worauf das letztere sofort mit dem Guttaperchapapier eingehüllt, das ganze mit einer Lage Watte umgeben und mit einer Flanellbinde befestigt wird.)

Bei starken Fieber-Paroxysmen:
1412. Sulf. Chinini 1·0,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. dtv. in dos. = 1·0.
S. Jede 3. St. 1 Pulv.
1413. Antipyrini 5·0.
Dtv. in dos. = 5.
D. ad caps. amyl.
S. Jede Stunde 1 Pulv.

1414. Ptesin s. Cosaprin
0·15—0·50.
D. tal. dos. Nr. X.
DS. Tägl. 3 Pulv. zu nehm.

Gegen bedeutende Schmerzen Morphium-Inject.; gegen Schlaflosigkeit:

1415. Chloral. hydr. 4·0,
Aq. dest. 50·0.
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Die Hälfte auf einmal zu nehmen.
1416. Chloralamid. 3·0,
Aq. dest. 120·0,
Acid. mur. dil. gtts. 4,
Syr. simpl. 15·0.
S. Auf einmal zu nehmen.
1417. Amylenhydrat. 7·0,
Mixt. gummos. 80·0.
S. Abends die Hälfte z. n
1418. Sulfonal. 2·0.
D. tal. dos. = 4.
S. Abds. 1 Pulv. in Obl.
Ebenso Trional.

1419. Extr. cann. Ind. 0·50.
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 2stündlich 1 Pulver.

Bei fixen Schmerzen:

1420. Ol. Sinapis aeth. gtts. 10,
Ol. Terebinthinae,
Spir. sapon. aa. 20·0.
S. 3mal tägl. einzupinseln.
1421. Chloroform,
Olei Hyosciami aa. 20·0,
Glycerini pur. 50·0.
S. Zum Einreiben.
1422. Tinct. Jodinae,
Tinct. Gallar. aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln (namentl. auch bei chronischem Gelenksrheumatismus).
1423. Ichthyol 5·0.
Ung. emoll. 50·0.
S. An die schmerzhaften Stellen einzureiben.
1424. Ung. Hydr. 10·0.
S. Bohnengross 2mal tägl. einzureiben.
1425. Kal. jodat. 2·0,
Vaselini 15·0.
S. 3mal tägl. einzureiben.

Bei frequentem Puls und hoher Temperatur.

1426. Inf. fol. Digit. purp. e 1·0 ad 150,
Syr. rub. Idaei 15·0.
S. jede 2. St. 1 Essloffel.
1427. Tr. Strophant.,
Tr. Chin. compos. aa. 10·0.
S. 3mal täglich 15 Tropfen.

Auch bei Arthritis deformans Massage nebst activen u. passiven Bewegungen zu versuchen.

Rheumatismus musculorum, Muskelrheumatismus.

Locale Behandlung durch Einreibung von Salben. Abreibungen. Massage. In frischen Fällen warmer Thee, warme Einhüllung des Körpers, Dampfbad. Moorbäder (Mattoni's Moor-Extract).

1428. Ol. Hyosc. coct. 20·0,
Chloroform. 5·0.
S. Zum Einreiben.
1429. Extr. Bellad. 2·0.
Ung. emoll. 20·0.
S. Salbe.

Rhinitis, Nasencatarrh,

vide: Coryza und Ozaena.

Salivatio

vide: Stomatitis mercurialis.

Sarcomphalus, Nabelschwamm der Kinder.

Ein- bis zweimalige Touchirung mit Lapis od. Anwendung von:

1430. Acid. salicyl. 1·0,
Pulv. Oryzae 10·0.
S. Streupulver.

Bei stärkerer Entwickelung Abbinden mit einem Seidenfaden, am nächsten Tage kein Bad.

ıbies, Krätze.

ach einem halbstünd. Seifen- e Einreibung mit einer der genden Salben Früh u. Abends ch 2 Tage nebst Einhüllung wollene Decken; hierauf ein einigungsbad. Allenfalls zurück- eibende Ekzeme nachträglich zu handeln. Bei Verhind. während . Tag. Einr. d. Salb. an 3—4 Ab.

431. Calcis vivae 25·0,
Sulf. citrini 50·0,
Coq. cum Aq. font. 500·0
Ad remanent. 300·0,
S. Zum Einreiben. (Solutio Vlemmingkx, modificirt von Hebra.)

1432. Florum sulf.,
Olei Cadini aa. 20·0,
Cretae albae 2·0,
Saponis viridis,
Axung. Porci aa. 40·0.
S. Zum Einreib. (Wilkinson'sche S. mod. v. Hebra.)

1433. Naphtoli 15·0,
Axung. Porc. 100·0,
Sapon. virid. 50·0,
Cretae alb. p. 10·0.
S. Zum Einreiben. (Ung. Naphtoli comp., eine einmalige Einreibung genügt.)

Epicarinsalbe:

1434. Epicarin. 10·0,
Ung. simpl. 100·0.

1435. Napht. pur. cryst. 10·0,
Ol. Lini 100·0.
S. 3—4mal in 24—36 Stund. einzureiben.

1436. Styracis liquidi,
Florum sulf.,
Cretae albae aa. 15·0,
Saponis viridis,
Axung. Porci aa. 30·0.
S. Zum Einreiben (Weinberg's Salbe).

1437. Styrac. 10·0,
Sapon. Kal. 90·0,
f. ungt.
S. 3mal tägl. einzureiben.

1438. Flor. sulf.,
Kali carbon. aa. 10·0.
Lanolin. 60·0,
Vaselin. 20·0.
S. Salbe.

1439. Sapo medic. 100·0,
Ol. petr.,
Alcohol. aa. 50·0,
Cerae alb. 40·0.
S. Seife. 3—4mal tgl. den Körper einzuseifen.

1440. Eudermol 0·1,
Ungt. simpl. 100·0,
DS. Salbe (2 Einreibungen genügen).

Bei Kindern oder bei geringer Ausdehnung der Krankheit genügt:

1441. Styracis liquidi,
Balsami Peruv. aa. 50·0.
S. Zum Einreib. (Zuweilen genügt auch die Einreibung von *Bals. Peruv.* allein.)

Für Wohlhabende empfehlenswerth: Bourguignon's Salbe, modificirt von Hebra:

1442. Olei Lavandulae,
Olei Caryophyll. aa. 1·0,
Kal. carbon. 25·0,
Lactis sulf. 75·0,
Axung. Porc. q. s.
ut f. Ung.
S. Salbe.

Scarlatina, Scharlach.

Prophylakt. strenge Isolirung des Kranken durch 5—6 Wochen auch bei ganz leichten Fällen Behandl. symptomatisch. Unter allen Umständen Bettruhe nach Ablauf des Desquamations processes, Lüftung des Krankenzimmers, Zimmertemperat. 15° Speckeinreibungen des ganzen Körpers vom Halse bis zu den Füssen (in den ersten 3 Wochen vom Auftreten des Exanthems täglich 2mal, in der 4.—6. Woche tägl. 1mal) sollen sich bewähren, da sie die Hitze und die lästige Spannung der Haut [illegible]

Gegen intensives Fieber hydriatische Proceduren (bei kleineren, schwächlichen Kindern kalte Einpackungen, 3mal tägl. je 10 Min. lang, bei älteren, kräft. Kindern u. b. Erwachs. kalte [25°] od. allmälig abgekühlte Bäder), Chinin, Salicylsäure, säuerliche Getränke. Dem Fieber anpassende Diät (Fleisch erst Ende der 4. Woche). Sorge für Stuhlgang, häufige Besichtigung des Halses, tägl. Untersuchung des Harns auf Albumen. Bezügl. der Behandl. der complicirenden Nephritis, Hydrops, Urämie s. d.

1443. Chin. sulf. 0·30—1·0,
Succh. alb. 1·0.
M. f. pulv.
S. Abends zu nehmen.

1444. Chinin. tannic. 1·0,
Sacch. 2·0.
D. in dos. V.
S. 2ständl. 1 Pulver.

1445. Nutr. salicyl. 10·0.
Div. in dos. = 10.
S. Jede 2. St. 1 P. (bis zur Herabsetzung der Temperatur).

1446. Acidi sulf. dil. 2·0,
Aq. dest. 150·0.
Syr. rub. Id. 20·0.
S. Zum Getränk.

1447. Elix. acid. Hall. 5·0,
Syr. rub. Idaei 50·0.
S. Zusatz zum Getränk.

1448. Mixt. oleos. 100·0,
Tinct. Belladonn. gtts. 5.
S. Jede 2. St. 1 Kaffeelöff.

Schanker vide: Ulcus contagiosum und Sklerosis.

Scorbutus, Scorbut.

Berücksichtigung der ursächl. Momente. Sorge für reine Luft, trockene Wohnung, entsprechend. *Ernähr.* (Obst, grüne Gemüse), *Säuren, Wein.* In schweren Fällen *absolute* Milchdiät empfohlen. Gegen Ecchymosen, Infiltrationen *Umschläge m. Essig od. Bleilösung.*

1449. Kal. acet. 4·0,
Aq. dest. 180·0,
Syr. rub. idaei 20·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.
oder

1450. Spirit. cochleariae 4·0,
Aq. font. 180·0,
Syr. cap. Vener. 20·0.
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

1451. Tct. Chin. comp. 40·0,
Tinct. Aurant. 10·0.
S. 4mal täglich 1 Esslöffel.
(Als Roborans.)

1452. Kal. hypermang. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Mundwasser (zu verdünn.).

1453. Tinct. Ratanh. 20·0.
Aq. dest. 200·0,
S. Mundwasser.

1454. Tinct. Ratanh.,
Tinct. Gallar. aa. 15·0.
S. Zum Bepinseln des Zahnfleisches.

1455. Fol. Salviae 50·0.
S. Thee (Aufguss als Mundwasser).

Scrophulosis.

Vor Allem zweckmässige Anordnungen betreffs der Nahrung. Strenge Einhaltung von regelmässigen Mahlzeiten, Milch, Eier, Suppe, Fleisch, am besten gebraten, leichtes grünes Gemüse; keine schwer verdaulichen Speisen, keine Hülsenfrüchte, keine Kartoffel, wenig Brot etc. — Sorge für frische Luft im Wohn- und Schlafzimmer, Bewegung im Freien, am besten Landaufenthalt; Bäder mit Zusatz von Steinsalz oder Mattoni's Moorsalz, Lipik, Kreuznach. Abscesse, Caries, Augenkrankheiten, Hautausschläge sind neb innerlichen Medicamenten nach speciellen Regeln zu behan

1456. Ol. jecor. Asell. 5
S. Kaffee-b. esslöffel

1457. Ferr. carb. sacch.,
Sacch. alb. aa. 5·0.
S. Messerspitzw. Früh u. Abd.
1458. Ferr. lactici,
Pulv. rad. Rhei ch. aa. 1·0,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.
1459. Syr. Ferri jodat. 5·0,
Syr. cort. Aur. 15·0.
S. Früh u. Abds. 1 Kaffeelöff.
1460. Tinct. amar. 15·0.
Tinct. mal. Ferr. 5·0.
S. 15 Tropfen vor jeder Mahlzeit.

Bei örtlich. Formen (Ozaena u. dgl.) sorgfältige Pflege der Theile nach stricten Belehrungen.

Seborrhoea, Schmeerfluss.

Entfernung der Borken nach hinlänglicher Erweichung derselben mit Oel etc.; Waschung mit flüssiger Glycerinseife, Seifenwasser oder Spir. sapon. kalinus; Befettung und Waschung mit nachfolgenden Mitteln später fortzusetzen, bis zur Sistirung d. Borkenbildung. Berücksichtigung des Allgemeinzustandes. Eisenpräparate, Solut. ars. Fowleri.

1461. Spermat. ceti,
Ol. Olivarum aa. 25·0.
S. Salbe.
1462. Oxyd. Zinci 10·0,
Vaselini 50·0.
S. Salbe.
1463. Plumb. carbon. 10·0,
Ung. emoll. 50·0.
S. Salbe.
1464 Acid. carbol. 3·0,
Spir. vini Gallici 100·0.
S. Zu Waschungen.
1465. Sapon. viridis 50·0,
Spir. vini conc. 20·0,
Spir. Lavandul. 5·0.
S. Zum Einreiben. (Spir. saponis kalinus.)
1466. Acid. salicyl. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Waschungen.
1467. Tinct. Benzoës 5·0,
Spir. vini Gall. 100·0.
S. Zu Waschungen.

Bei reichl. kleienart. Schuppen:

1468. Acidi carbol.,
Balsam. Peruviani,
Spir. Lavandulae aa. 5·0.
Spir. vini Gallici 200·0.
S. Zu Waschungen.
1469. Ac. pyrogall. 2·0,
Ung. simpl. 20·0.
S. Salbe (bei inveter. Leiden im Beginne der Behandlung tägl. durch 1 Woche).
1470. Resorcin 5·0 10·0,
Ol. Ricini 5·0—45·0,
Spiritus 150·0,
Balsam. peruvian. 0·5.
S. Mit Flanell tägl. auf die Kopfhaut einzureiben.
1471. Captol.,
Chloral. hydrat.,
Acid. tartar. aa. 1·0,
Ol. picini 0·5,
Spir. vin. 65% 100·0,
Essent flor. aeth. q. s.
DS Haarwasser (mit der flachen Hand einzureiben).

Vgl. auch Defluvium capillorum.

Sepsis vide: Pyämie.

Singultus, Schluchzen.

Bei typischem Auftreten Chinin, sonst Narcotica; Eispillen zu versuchen. Einreibungen von Spir. camph. in die Magengrube. Auch Schwefeläther mittelst Zerstäubungsapparates durch 10 Min. auf das Epigastrium und dann 5 Minuten lang auf beide Seiten d. Halses applicirt. Faradisat. des Epigastrium; Galvanisation des Phrenicus. Subcutane Injection von Morphium oder Atropin; Inhalation v. Amylnitrit 1–2 Tropf.; auch Chloroform innerl. Zu versuchen wäre auch Pilocarpin oder Chloralhydrat in geringer Menge

1472. Aq. Lauroc. 5·0,
Muriat. Morph. 0·05
S. 5 Tropfen jede 2. St.
1473. Tinct. Valerian. aether. 20·0.
S. 5—10 Tropfen auf einem Stück Zucker zu nehmen.
1474. Extr. Belladonnae 1·0,
Pulv. fol. Belladonnae,
Extr. Taraxac. q. s. ut f. pill. 100.
Consp. pulv. rhizom Irid.
S. 2—3 Pillen täglich.
1475. Creosoti gtt. 1—2,
Mixt. oleos. 500·0,
Ol. Menthae gtts. 2.
S. Jede ½ Stunde 1 Esslöff.
1476. Dect. fol. Jaborandi e 4·0 ad 150·0.
S. Auf 1—2mal z. n.

Sklerodermie = Pachydermie

vide: Elephantiasis.

Sklerosis, harter Schanker.

Aetzung bis zur Erlangung einer rein eiternden Wundfläche, hierauf Anwendung von Verbandwasser, Salben oder Pflaster behufs Ueberhäutung; entsprechende Reinigung vor dem Verbande. Bei Entzündung u. ödematöser Schwellung oder Infiltration der Umgebung kalte Umschläge. Gleichzeitige Behandl. der Complicat. Vide: Syphilis.

1477. Cupri sulfur. 1·0,
Aq. dest. 10·0.
S. Z. Bepins. (stark eiternder, missfärbiger oder diphtheritischer Sklerose).

1478. M. subl. corr. 0·50,
Aq. dest.,
Spir. vin. conc. aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln.
1479. Cupri sulf. 0·50,
Lanolin. p. 10·0,
Ung. emoll. 5·0.
S. Salbe.

Zum Abspülen der exulcerirten oder excoriirten Flächen:
1480. Kali chlorici 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1481. Zinci muriat. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.

Bei rein eiternder Sklerose oder bei verdächtigen Excoriationen:
1482. M. subl. corr. 0·20,
Aq. dest. simpl. 100·0.
S. Verbandwasser.
1483. Acid. carbol. 1·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Verbandwasser.
1484. Thymol. 0·50,
Aq. dest. fere. 500·0.
S. Aeusserlich.
1485. Jodoformi pulv. 10·0,
Ol. Bergamott. gtt. 1
S. Zum Bestreuen.

Bedeckung mit Bruns'scher Wolle, hydrophil. Verbandstoff oder Jodoformgaze.
1486. Empl. Hydrarg.,
Empl. sapon. aa. 5·0,
M. Tend. s. linteum.
S. Pflaster (Graues Pfl.).

Ebenso: Unna's Quecksilber-Pflastermull.
1487. M. praec. rubr. 0·10,
Vaselini 20·0.
S. Salbe (direct aufzutragen u. mit Leinwand z. bedecken).

Bei Gangrän:
1488. Gypsi pur. 25·0,
Picis liq. 5·0.
S. Streupulver.

Sonnenstich, Insolation.

Entfernung der beengenden Kleidungsstücke, Lagerung auf kühlem Platze, kühlende Getränke, allenfalls Bier, Wein. In höherem Grade Blutentziehung.

Soor, Schwämmchen.

Häufige Reinigung der ga
Mundhöhle durch vorsichtig

wischen m. einem nassen Tuche oder mit nassen Charpiepinseln, besonders nach dem Trinken. Vorsicht wegen Uebertragung!

1489. Kal. hypermang. 0·05,
Aq. dest. 200·0.
S. Mundwasser.

1490. Borac. venet. 2·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Z. Bepins. u. Ausspülen.

1491. Acid. boric. 4·0,
Aq. 200.
S. Z. Auswasch. d. Mundes.

1492. Aq. phaged. nigr.,
Glycerin. aa. 15·0.
S. Zum Bepinseln.

Vide: Aphthae.

Spasmus glottidis, Laryngismus stridulus, Stimmritzenkrampf, vide: Laryngospasmus.

Spermatorrhoe, Samenfluss.

Ermittelung und womöglich Beseitigung d. Ursache (Neurasthenie, Onanie, Reconvalescenz, örtliche entzündliche Processe, Urethritis posterior, Prostatitis), Vermeidung alles dessen, was die Genitalien reizt; Hydrotherapie, Winternitz' Psychrophor, Elektricität; reizlose Diät, des Abends wenig Nahrung. Luftveränderung, entsprechend. Beschäftigung, Berücksichtigung d. Allgemeinzustandes durch Verabreichung roborirender Mittel, Ferrum, Chinin etc.

1493. Lupulini pur. 1·0,
Camphorae rasae 0·10.
Sacchari albi 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

1494. Gland. Lupuli,
Extr. Lupuli aa. 1·5,
Camphor. 0·07—0·15.
M. f. pil. Nr. XV. Consp. p. Lycopod.
S. 2—3stündl. 1—2 Pillen.

1495. Camphor. monobromat. 3·0.
Div. in dos. = 10.
D. ad caps. amyl.
S. 3—4 Kapseln täglich.

Auch Atropin (0·10 : 10·0) Abds. 1 Tropfen innerlich empfohlen.

1496. Natr. bromat. 40·0.
Div. in dos. = 20.
S. Früh u. Abds. 1 Pulver.

1497. Ergotin. Bonjeun 1·0,
Sacch. alb. 3·0.
Div. in dos. = 10.
S. 3—4 Pulver täglich.

1498. Cornutini citr. 0·15,
Argillae 7·0,
Mucilag. g. tragacanthi,
q. s. ut f. pil. Nr. 50.
S. 2mal täglich 1 Pille zu nehmen.

Locale Behandl. durch Aetzung d. Pars prostat. mitt. Endoskops oder d. Irrigationskatheters (vide Catarrhus vesicae). Auch Sondencur zuweilen erfolgreich.

Spina bifida.

Empfohlen wird d. Entfernung d. Flüssigkeit aus den an defecten Stellen d. Wirbelsäule befindlichen hernienartig. Geschwülsten durch Aspiration mit einer Pravaz'schen od. einer andern ähnlichen kleinen Spritze; hierauf Anlegung einer Binde. Injection v. Tinctura Jodi neuestens empfohlen. Exstirpation unter antiseptischen Cautelen.

Stenocardia, Angina pectoris, Herzkrampf.

Berücksichtigung des ursächlichen Leidens (Sklerose der Coronararterien) und Behandlung desselben. Während des Anfalles Frottirungen der Herzgegend der ob. Extremitäten mit Senfspiritus, Senföl, überhaupt Hautreize, ferner subcutane Morphium- oder Codeininjection, Exalgin

Amylnitrit, ein Antispasmodicum innerlich, in den Pausen kalte Abwaschungen, Luftveränderung. Regelung der Beschäftigung, der Nahrungsverhältnisse, des Stuhlganges. Jodkali innerlich (1 bis 2 Grm. pro die).

1499. Amyl. nitric. 5·0,
Ol. Foeniculi 10·0.
S. 3—6—9 Tropfen zu Beginn des Anfalles zu inhaliren.

1500. Codein. phosphoric. 0·50,
Aq. dest. 10·0,
Acid. carbol. 0·01.
S. 1—2 Spritzen zu injiciren.

1501. Aq. Laurocer. 10·0.
Mur. Morph. 0·05.
S. Tropfen.

1502. Aetheris sulf. 15·0.
S. Zum Einathmen (je einige Tropfen auf einen Teller gegossen, während des Verdunstens nächst der Nase zu halten).

1503. Aq. Laurocer. 10·0,
Tinct. Ipecac. 2·5,
Liq. Ammon. anis. 1·0.
S. Alle 10 Minuten je 10 bis 12 Tropfen.

Während der Pause:

1504. Sol. alcohol. Nitro-Glyc. 1% gtts. 20,
Aq. dest. 200·0.
S. 3mal tägl. 1 Esslöffel. (Vorsicht!)

1505. Nitroglycerin. 0·2,
Tinct. capsici 2·5,
Spirit. rectificatiss., Aq. menth. pip. aa. 12·5.
S. 2—5—10 Tropfen nach Bericht (Th. Schott).

1506. Natr. nitros. 0·50,
Aq. dest. 150·0.
S. 3—4 Esslöffel täglich. (Sodium-Nitrit.)

1507. Erythroltetranitrat. 0·50,
Pulv. et Extr. liquirit. q. s. u. f. pill. Nr. L.
S. Täglich 1—3 Pillen.

Stomatitis aphthosa vide:

Aphthae.

Stomatitis ulcerosa, mercurialis, Stomakace, Mundfäule, Ptyalismus, Speichelfluss.

Sehr häufige u. gründl. Reinigung des Mundes durch Ausspülen, besser aber durch Irrigation mit Hilfe eines einfachen passenden Apparats. Desinfection d. Mundes mit antisept. Lösungen; Radlauer's antisept. Mundperlen, flüssige, kühle Nahrung. Weiche Speisen; Wein, Milch. Bei Stomatitis mercurialis Beseitigung der Mercurialpräparate, prophylact. Massnahmen bei gewissen Gewerben (Spiegelbelegen, Hutmachen u. dgl.).

1508. Kal. chlorici 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Mundwasser.

1509. Kal. hyperm. 2·0.
Aq. dest. 500·0.
S. Mundwasser.

Auch diverse Decocte od. Infuse mit den adstringirenden Mitteln verwendbar.

1510. Tinct. Ratanhiae,
Tinct. Gallarum aa. 5·0.
S. Zum Bepinseln des Zahnfleisches.

1511. Ac. thymol. 0·10.
Aq. dest. 300·0.
S. Zur Bepinselung.
Vide: Odontalgie.

Ausserdem:

1512. Kali hypermang. 0·25,
Aq. dest. 30·0.
S. Zum Bepinseln der afficirten Schleimhautstellen.

In hartnäckigen Fällen:

1513. Argent. nitr. 0·25,
Aq. dest. 30·0.
S. Wie das Vorige.

Struma, Kropf.

Bei parenchymatöser Struma Einpinselungen mit reiner oder verdünnter Jodtinctur oder mit Jodglycerin, Einreibungen von Jodkalisalbe oder Ung. ciner.; Haller oder Lipiker Jodwasser innerlich und in Form von Umschlägen; Jodkali innerlich, parenchymat. Inject. v. Jodtinctur (1 bis 5 Tropfen 2mal wöchentlich) oder Jodoform-Lösung (Moseti g), Jodoformkataplasmen (Gussenbauer).

Die Behandlung mit Schilddrüsenpräparaten liefert bei einfachen hyperplastischen Kröpfen namentlich junger Individuen unzweifelhaft günstige Resultate; über die Technik der Schilddrüsenfütterung vergl. bei »Obesitas«.

1514. Jodoform. 1·0,
Aether.
Ol. olivar. aa. 7·0.
Dtr. ad vitr. charta nigra obduct.
S. Jeden 5.—8. Tag 1 bis 2 Pravaz'sche Spritzen in d. Struma zu injiciren.

1515. Jodoform. p. Faba Tonca desodorat. 10·0,
Vaselin. 150·0.
S. Messerrückendick auf eine Compresse aufzustreichen. (Die Compresse wird um den Hals gelegt. Darüber Einwickelung mit in essigsaure Thonerde getauchten Compressen, hierauf luftdichter Abschluss mit Guttaperchapapier.) *Früh u. Abends d. 3—8 Woch. zu wiederholen.* Bei Cystenkropf Punction mit nachfolgender Jodinject.; hierauf Collodiumverband.

1516. Jodi p. 0·3,
Kali jodat. 3·0,
Vaselin. 20·0,
Lanolin. 10·0.
S. Salbe.

1517. Tinct. Jodinae,
Tinct. Gallarum aa. 10·0.
S. Zum Bepinseln.

1518. Tinct. Jodinae 15·0.
S. Zum Einpinseln (eventuell zu parenchymatösen Inject.).

1519. Jodi 5·0,
Alcohol. absol. 40·0.
S. Stärkere Jodtinctur. (Diese nach der engl. Pharm. bereitete Jodtinctur ist 2mal so stark als die der österreich. Letztere enthält nämlich reines Jod 1:16 Alkohol.)

1520. Aristol. 0·30.
Sapon. kalin. 30·0,
Aether. sulf.,
Alcohol. aa. 5·0.
S. Salbe.

Abends auf die Haut zu streichen, darüber einen Priessnitz-Umschlag. Morgens Abwaschung der Salbe und Einreibung von Borvaselin.

Sudamina.

Bestreuung mit Amylum, Semen Lycopodii oder Alumen plumosum pulver.; jede andere Medication überflüssig, Reizmittel schädlich.

Sykosis, Bartfinne.

Erweichung allenfalls vorhand. Borken mit Fett und Beseitigung derselb.; Waschungen m. Schmierseife u. Spiritus saponatus. Täglich Rasiren und Epiliren. Bedeckung der Haut mit Salbe. Abschaben mit d. scharfen Löffel empfohlen.

1521. Ung. Diachyl. 30·0.
S. Messerrückendick auf Leinwand aufzustreichen und über Nacht aufzulegen.

1522. *M. praec. albi 2·0,*
Lanolin. 15·0,
Vaselin. 5·0.
S. Salbe. (Wie das Vorige

1523. M. praec. rubr. 0·50.
Ung. emollient. 20·0.
S. Salbe (bei Sykosis der Nasenschleimhaut).
Auch Wilkinson'sche Salbe (Nr. 1432).

1524. Oxydi Zinci 2·0,
Vaselini 30·0.
S. Salbe (gegen die restirende Röthe).

1525. Resorc. puriss. 10·0.
Vaselini alb. 50·0.
Amyl. oryzae,
Zinci oxydat. aa. 25·0.
M. f. pasta.
S. 2–3mal wöchentlich einzureiben.

1526. Chrysarobin 2·5,
Sapon. virid. 25·0.
S. Mit Borstenpinsel aufzutragen (Vorsicht!)

1527. Naphtholi β 1·0—3·0.
Lanolin. 30·0.
S. Salbe.

1528. Losophan. 1·0—2·0.
Spiritus 100·0.
S. Zum Pinseln.

1529. Liantrol. 5·0—10·0,
Sapon. virid. 5·0,
Adipis 45·0.
Auch Cupr. oleatum 2:8 Fett bei mehrtäg. Verband u. Naftalan.

Eröffnung und Cauterisation od. Stichelung d. Pusteln.

Syphilis congenita, angeborne Syphilis.

Womöglich Muttermilch, eventuell Ammenmilch (Amme auf die Gefahr der Infection aufmerksam zu machen!); sonst kräftige Nahrung; sorgfält. Reinhaltung, besonders der Mundhöhle, der Genitalien und der Aftergegend. *Locale Behandlung ebenso dringend wie die allgemeine. Gefahr der Infection für die Umgebung! Eventuelle Behandlung der Eltern.*

1530. Calomel. 0·20,
Sacch. alb. 10·0.
M. f. p. dic. in dos. = 15.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

1531. Protojod. Hydrarg. 0·20,
Sacch. alb. 10·0.
M. f. p. dic. in dos. = 15.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

1532. Calomel. 0·20,
Ferr. carb. sacch. 0·50,
Sacch. alb. 10·0.
M. f. p. dic. in dos. = 15.
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

Bei Kindern von 1 bis 2 Jahren die Einreibungscur mit entsprechender Vorsicht in öfteren Pausen:

1533. Ung. Hydrarg.,
Ung. emoll. aa. 2·0.
Dic. in dos. = 10.
S. Für 5 Tage (jeden Tag sind je 2 Zeltchen zu verwend.).

1534. Hydr. bichl. corr. 5·0,
Salis ammoniac. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zusatz zu 3 Bädern.

Bei excoriirten oder exulcerirten Papeln in der Genito-Analgegend:

1535. Merc. praecip. alb. 0·1,
Vaselin 10·0.
DS. Salbe.

Gegen Papeln an d. Mundschleimhaut oder Rhagaden am Mundwinkel oder Nasenflügel graues Pflaster oder:

1536. M. praec. rubr. 0·50,
Ung. emoll. 10·0.
S. Salbe.

Syphilis universalis, allgemeine Syphilis.

A. Erstes Jahr.

1. Primäres Stadium. a) Die verdächtige Erosion. Von Grundsatze ausgehend, dass j bei unehelichem Coitus acqui Erosion der Genitalien verdä

ist, umsomehr, wenn auch andere Verdachtsmomente für einen Coitus impurus vorliegen, empfiehlt es sich, jede solche Erosion, falls sie innerhalb der ersten 48 Stunden post coitum zur Beobachtung des Arztes gelangt, energisch zu cauterisiren mit Pacquelin, concentrirten Mineralsäuren, concentrirten Sublimatlösungen (1:10 Alkohol), worauf rein chirurgische Behandlung d. Schorfes folgt.

b) Das Geschwür. Nachdem Induration und multiple Drüsenschwellung erst circa 3 Wochen post coitum sich entwickeln, ist Diagnose d. syphilitischen Initialaffectes erst um diese Zeit möglich. Rasch nach dem Coitus auftretende Geschwüre sind rein local zu behandeln, wegen Seltenheit des weichen Schankers stets die Möglichkeit der Syphilis dem Patienten zu betonen. Localbehandlung: Jodoform als Pulver, Salbe (1 : 10 Vaselin), Lösung (1 : 10 Aeth. sulf.) 1—2mal täglich, siehe auch: Ulcus contagiosum.

c) Syphilitischer Initialaffect. Excision, wo ausführbar, zu empfehlen, doch ohne dem Patienten zu versprechen, dass selbe den Ausbruch secundärer Erscheinungen verhindert. Oertliche Behandlung hat zwei Indicationen zu erfüllen: 1. Geschwür, wenn bedeutend zerfallend, zu reinigen, Zerfall zu sistiren, 2. Induration z. Resorption zu bringen. Ad 1 Jodoform, Salben von Merc. praecip. rubr. (0·5 : 10 Vaselin), Cuprum sulfuricum (1 : 20 Vas.), Jodkali-Jodverband (1 : 0·1 : 50 *Aqua*). *Ad 2 graues Pflaster, grauer Pflastermull, graue Salbe, siehe auch Sclerosis.*

Allgemeinbehandlung. Im primären Stadium antisyphilitische Therapie einzuleiten nicht indicirt, da dies den Ausbruch secundärer Erscheinungen nur verschleppt, nicht verhindert. Ausnahmsweise indicirt: 1. Mercurielle Behandlung, Frictionscur oder intramusculäre Calomelinjectionen (0·1 : 1·0 Ol. olivar. einmal die Woche in die Glutaei) bei ausgebreiteten, gangränösen und phagedänischen, durch Phimose oder Paraphimose complicirten Initialaffecten. 2. Jodbehandlung, b. bedeutender pastöser Skleradenitis. Da es sich hier meist um Complication mit Scrophulose handelt, statt Jodkali besser Jodeisensyrup (50·0 : 150·0 Aqua, 3 Esslöffel tägl.), Jodleberthran (0·1 : 50 Ol. jecoris aselli, 2 bis 8 Kaffeel. tägl.), daneben Ruhe, Einreibung von Jodsalben, Jodtinctur, grauer Salbe auf die Drüsen, kräftige Ernährung.

e) Hygiene. Behandlung und Beseitigung aller krankhaften Loci minoris resistentiae, die im secundaren Stadium intensiver v. Efflorescenzen heimgesucht würden, so Stomatitis, Seborrhoea u. Defluvium capillorum capitis, Ekzeme, besonders an Genitalien und After, Hyperhidrosis pedum, Beseitigung cariöser Zähne, roborirendes Regime und Beseitigung aller Verdauungsstörungen, Gastritis, habituelle Obstipation, bei Anämischen Eisen, Chinin, Eisenwässer und Eisenbäder, bei Nervösen milde hydriat. Therapie.

II. **Eruptionsstadium.** Gegen d. nervösen Störungen desselben, Algien in Nerven, Gelenken, Periost, Schlaflosigkeit: Jodpräparate; Jodkali 1·0—2·0, Jodnatrium 2·0—3·0 pro die, am zweckmässigsten in Lösung 2 bis 4 Essl. tgl. in je einem Deciliter Milch oder in Pillen mit Extr Belladonnae:

1537. Kali jod. 5·0—10·0,
Extr. bellad. 0·25—0·50.
Pulv. ac. q. s. pill. 50.
S. 5 Pillen täglich.

Zusatz von Milch oder Extr. Belladonnae hindert oder mildert Jodismus.

Zur Beförderung der Eruption des Exanthems und der Hautpflege fleissige Dampfbäder, feuchtwarme Einpackungen.

III. Secundäres Stadium. Mit Beginn der Allgemeinbehandlung bis zur reichlichen Eruption zu warten. An Stelle der früheren symptomatischen ist Fournier's chronische intermittirende Behandlung zu empfehlen. Princip: länger dauernde abwechselnde Darreichung von Quecksilber u. Jod mit je mehrwöchentlichen Ruhepausen. Eine Schablone derselben ist beiläufig die folgende:

a) **Das erste Exanthem** wird mit Quecksilber behandelt.

1. Leichte Formen. Maculöse od. papulöse Syphilide, begleitet von Schleimpapeln an Mund, Genitale oder After. Hier genügt interne Darreichung:

1538. Hydrarg. tann. oxydul., Sacch. alb. aa. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 30.
S. 3 Pulver täglich.
1539. Protojod. hydr. 0·20, Extr. opii 0·05.
Pulv. et extr. acori q. s. pill. Nr. 20.
S. 4 Pillen täglich.
1540. Jodquecksilberhaemol. 15·0,
Extr. et pulv. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 150.
S. 4 Pillen täglich, ansteigend bis zu 10 Pillen.
1541. Merc. sublim. corr. 0·1,
Spir. vini conc. 100·0.
S. 2 Kaffeel. tgl. mit Milch oder Rothwein.

2. Schwerere Formen.

Maculöse und papulöse, aber nicht von Schleimpapeln oder gleichzeitig mit diesen von Psoriasis palmae et plantae gefolgt, sind hartnäckiger, widerstehen interner Behandlung lange. Hier ist energische Quecksilberbehandlung, Frictionscur, Calomelinjection indicirt.

1542. Ung. hydrarg. cin. 30·0 bis 50·0.
Div. in dos. aeq. 20. Da ad chart. cerat.

Je 2 Dosen sind am 1. Morgen (am Abend einzureiben nicht gut, da Patient durch die Transpiration im Bette wieder zu viel Salbe ausschwitzt) auf die beiden Unterschenkel, am zweiten die Oberschenkel, am dritten die Seitentheile des Thorax, am vierten den Rücken, am fünften die Arme, in kleine Partien vertheilt, einzureiben. Am sechsten Morgen ein warmes Seifenbad, am folgenden beginnt die Tour von Neuem.

1543. Acid. salicyl. 1·20,
Ichthyol. 2·0,
Gold-cream 30·0.
S. Salbe.
oder
1544. Calomel. vapor. parat. 2·0,
Gold-cream 30·0.
S. Abends einzureiben und über Nacht Handschuhe zu tragen.
1545. Calomel. vap. par. 5·0,
Ol. olivar. 50·0.
1546. Hydrarg. salicyl. 5·0,
Ol. Paraffini 50·0.
S. 1mal wöchentl. 1 Ccm. mittelst Pravaz'scher Spritze mit langer Canüle tief in die Musculatur d. Glutaei z. inj. (Wirkung rasch, Nebenerscheinungen gering.)

Inhalationsbehandlung . . . klin. Wochenschr., 1900, N

Sowohl bei der internen als cutanen und subcutanen Einverleibung von Quecksilber ist der Mundpflege besondere Sorgfalt zuzuwenden, alle die Mundschleimhaut reizenden scharfen Speisen u. Getränke, d. Rauchen zu meiden. Daneben fleissig Mundwässer (Kali chloricum oder hypermanganicum, Carbol- und Salicylsäure), Zahnpulver und Tincturen anzuwenden (Tct. gallarum, ratanhiae), siehe auch: Stomatitis.

Regelung von Hygiene und Diät, Aufenthalt im Freien in milder, nicht zu kalter oder scharfer Luft, mässige Bewegung, Ruhe des Geistes, nahrhafte, aber reizlose Kost.

Diese erste Cur kann auch ganz wohl, wenn Zeit und Verhältnisse danach sind, in einem Badeorte: Hall, Luhatschowitz, Darkau, Wiesbaden, Kreuznach, Iwonicz, Rabka, Rymanov vorgenommen werden. Man combinirt dann die interne, percutane oder subcutane Quecksilberdarreichung mit dem Gebrauche von Jodbädern.

Diese erste mercurielle Behandlung wird bis zum Schwunde aller Syphiliserscheinungen und etwas darüber, also circa 4—6 Wochen fortgeführt.

Hierauf folgt d. etwa 4 Wochen dauernde Darreichung von Jodkali, Jodnatrium, eventuell einem jodhältigen Mineralwasser u. Jodbädern. Die Dosen Jod seien nicht zu gross. Im Mittel genügt 0·5—1·0 Jodkali pro die.

Hierauf folgt eine Ruhepause von etwa 4 Wochen. Diese kann, *wenn nöthig*, ganz wohl zu *roborirender Behandlung*, Landaufenthalt, *Eisen intern* oder Eisenbäder, *milder* hydriatischer Behandlung verwendet werden.

b) Ohne jede Rücksicht auf das Auftreten oder Nichtauftreten von Recidiven beginnt man **nach vierwöchentlicher Pause**, also etwa um den 6. Monat nach der Infection — einem Zeitpunkt, wo sich gerne die erste Recidive einstellt — wieder, diesesmal aber mit einer milden, mercuriellen Behandlung, der internen Darreichung von Hg tannicum, Sublimat oder Protojoduret, durch etwa 4 Wochen, worauf 1 Woch. Jodgebrauch, 4 Woch. Pause, dann wieder derselbe Turnus eintritt. Am Ende des ersten Jahres, insbesondere wenn mehrere Recidiven kamen, wird eine energische Hg-Cur, also Frictionen od. intramusculäre Injectionen, denen wieder durch vier Wochen Jodgebrauch folgt, empfohlen.

Das Schema der Therapie im ersten Jahre ist also:

1. Monat		Localbehandlung
2.	„	des Initialaffectes.
3.	„	Hg-Hauptcur (Frictionen, Injection.).
4.	„	Jod.
5.	„	Pause.
6.	„	Hg (intern). Nebencur.
7.	„	Jod.
8.	„	Pause.
9.	„	Hg (intern). Nebencur.
10.	„	Jod.
11.	„	Pause.
12.	„	Hg-Hauptcur (Frictionen, Injection.).

c) **Recidiven.** Sowohl die sich zum ersten Exanthem gesellenden, als die als Recidiven mit Vorliebe auftretenden localisirten Erscheinungen, Schleimpapeln od. Psoriasis palmae et plantae unterliegen örtlicher Behandlung. Erstere werden mit Lapis oder Sublimatlösung (1:20 Alkohol) touchirt, letztere mit grauem Pflaster, grauer Salbe bedeckt und ein gerieben.

Leichte Recidiven, die sich während d. Ruhemonate d. ersten Jahres vielleicht einstellen, werden örtlich behandelt und indiciren keine Unterbrechung d. Turnus. Schwere Recidiven, wie Iritis, Chorioiditis, cerebrale Erschein., indiciren sofortige energische mercurielle Behandlung, meist Frictionen. Sind Fieber, Schmerz vorhanden, wie bei syphilitischer Arthritis, Periostitis, dann gegen letztere gleichzeitig grössere Dos. Jodkali od. Natr. 3·0—6·0 pro die oder

1547. Hydrargyr. bijodat. 0·1.
Kal. jodat. 5·0.
Aq. dest. 180·0.
Vin. Xerens. 20·0.
MDS. 2mal tägl. 1 Esslöffel.

B. Zweites Jahr.

War die Syphilis schwerer, die Recidiven im Verlaufe des Jahres häufig, dann bleibt man bei dem für das erste Jahr angegebenen Turnus. Im entgegengesetzten Falle tritt eine Erleichterung in d. Therapie in d. Weise ein, dass Behandlung mit Pause abwechselt. Das Schema wäre dann:

13. Monat Jod, als Abschluss der Therapie des 12. Monates.
14. „ Pause.
15. „ Hg (intern). Nebencur
16. „ Pause.
17. „ Jod.
18. „ Pause.
19. „ Hg (intern). Nebencur.
20. „ Pause.
21. „ Jod.
22. „ Pause.
23. „ Hg-Hauptcur (Frictionen, Injectionen).
24. „ Jod.

Die gleiche Behandlung wird *eventuell im dritten oder vierten Jahre fortgesetzt. Als Grundsatz für Sistirung der Therapie hat zu gelten, dass mindestens 6 Monate oder 1 Jahr keine Recidive auf-*getreten sein darf. Bezüglich der Behandlung der Recidiven gilt das oben Gesagte.

Dass, wo es nothwendig und Zeit und Verhältnisse darnach sind, ein Ruhemonat im zweiten Jahre zu roborirender Behandlung, Erholung (Luftcur, hydriatische Behandlung) verwendet werden kann, ist ebenso selbstverständlich, als dass die Hauptcur oder eine der Jodcuren in einem geeigneten Bade vorgenommen werden können. Stets schliesst die Behandlung mit einer Hg-Hauptcur mit nachfolgendem Jodgebrauch ab.

d) Die **Ehe** ist dem Patienten erst dann gestattet, wenn seit der Infection mindestens 3 Jahre verflossen sind und derselbe mindestens 1 Jahr lang keine Syphiliserscheinungen mehr darbot. Doch fordere man ziemlich knapp vor Eheschliessung die nochmalige Einleitung einer Hg-Hauptcur (Frictionen, Injectionen) mit nachfolgendem Jodgebrauch.

3. Sehr schwere Formen. Pustulöse und frühzeitige ulceröse Exantheme, galoppirende Formen. Vorwiegend roborirendes Regime, Arsen, Eisen, Guberquelle, Roncegno-, Levicowasser, Decoctum Zittmanni. Allgemeinbehandlung wie bei den schweren Formen zu leiten, Hg nur vorsichtig in kleineren Dosen zu reichen, dabei stets roborirendes Regime. In gefahrdrohenden Fällen statt hintereinander, das Hg und Jod gleichzeitig zu reichen. Wegen Gefahr einer den Verlauf complicirenden Gastritis auf interne Hg-Darreichung von internem Hg-Gebrauch abzusehen, also lieber in ersten und zweiten Jahre in Distanzen von 4—6 Monaten je eine Hg-Hauptcur mit gleichzeitigem oder darauffolgendem Jodgebrauch durchführen.

IV. Tertiäre Formen. Symptomatische Behandlung. Leichtere Formen mit Jod, schwerere mit Hg-Hauptcur, gefahrdrohende mit gleichzeitiger Darreichung von Hg und Jod. Nicht zu grosse Dosen, lieber die Cur mehr protrahiren, nach 2—3monatlicher Pause, auch ohne neue Symptome, ein- oder zweimal zu wiederholen. Bei ulcerösen Formen Decoctum Zittmanni; sind im secundären und tertiaren Stadium mehrere Hg - Curen vorausgegangen, Schwefelbader, Baden, Aachen.

Localbehandlung chirurgisch oder mit Hg- und Jodpräparate, roborirendes Regime.

(Nach Finger.)

Tabes dorsalis, Rückenmarksschwund.

Da ein causaler Zusammenhang zwischen Tabes und Syphilis mit grosser Wahrscheinlichkeit besteht, ist in jedem Falle von T der Versuch einer antisyphilitischen Cur indicirt. Verbot grösserer Anstrengungen und Arbeiten, ebenso von Aufregungen; ferner Bäder, Kaltwassercur, Chapman'scher Rückenschlauch, Elektricität, gegen Schmerzen Narcotica; Suspension mittelst des Sayre'schen Apparat. Uebungstherapie nach Frenkel. Unblutige Nervendehnung nach Benedikt. Medicamentöse Behandlung. Poehl empfiehlt sein Spermin subcutan.

1548. Kal. bromat. 5·0,
Aq. dest. 150·0,
Syr. cort. aur. 15·0.
S. Früh. Mittags u. Abds. 1 Esslöff. (besonders bei nervösen Zuständen).

1549. Arg. phosph. 0·50.
P. et Extr. r. acor. q. s. ut f. pill. Nr. 20—25.
S. Täglich 1—2 Pillen.

1550. Argent. nitr. 1·0,
Argillae alb. q. s.
u. f. pill. Nr. 100.
S. 1—2 Pillen täglich.

1551. Argent. chlorat. 0·10,
Natr subsulf. 0·60.
Aq. dest. 20·0.
S. Zu subc. Inject. (½ bis 1 Spritze).

1552. Sol. arsen. Fowleri 5·0,
Aq. Cinnamomi 25·0.
S. Früh und Abds. 10 bis 20 Tropfen.

1553. Strychnin. nitr. 0·1,
Aq. dest. 10·0.
S. Zur subcut. Injection. (4—6 Theilstriche zu injiciren.

1554. Ferri lact. 3·0—5·0,
Extr. Chin. aq. 4·0—5·0,
Extr. nuc. vom. 0·4—0·8,
Extr. Gentian q. s. ut f. pil. Nr. C. Consp.
S. 3mal täglich 1—2 Pillen nach dem Essen. (Erb.)

1555. Secal. cornut.
Elaeosucch. foenicul,
M. f. p. Dt. tal. dos. Nr. XX.
S. 3 Pulver täglich.

Taenia, Bandwurm.

Am Vorabende der Cur ein leichtes Purgans und eine Tasse Thee oder Suppe. Ueblich ein Häring. Des Morgens, nachdem etwas schwarzer Kaffee od. Thee genossen wurde, wird das verordnete Medicament verabreicht. Etwa zwei Stunden nach Gebrauch desselben noch Oleum Ricini und dergl., sofern bis dahin kein Stuhlgang erfolgte.

Bei Kindern, wenn ganz klein oder herabgekommen, die Behandlung des Bandwurmes nicht einzuleiten. Bei grösseren Kindern, deren Allgemeinbefind. befriedig., und bei denen keine Disposition zu Diarrhoen vorhanden ist, eines der folgenden Medicamente. An dem der Cur vorhergehenden Abende für breiigen Stuhl sorge

u. bloss klare Supp. verabreichen. Letztere muss auch am Morgen nach dem Gebrauche des Medicamentes gegeben werden. Wird dieses erbrochen, so ist eine zweite, jedenfalls bereit zu haltende Dose desselben zu nehmen.

1556. Cort. rad. Pun. Gran. 50·0—100·0.
Macera per horas 24 in
Aq. dest. 400·0.
Coque ad reman. 200·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Auf 3mal zu nehmen, in dem Zeitraume von 1 bis 1½ Stunden.

1557. Decoct. cort. Granat. e 30·0 : 180·0,
Extr. fil. mar. aeth. 2·0—3·0,
Syrup. cort. aur. 20·0.
S. Innerhalb ½ Stunde in 3 Port. zu nehmen (bei Kindern Vorsicht!).

Die Granatwurzeldecocte empfiehlt man zur Vermeidung des widerlich. Geschmacks etc. durch eine in den Oesophagus eingeführte Schlundröhre (od. Gummischlauch) auf einmal einzugiessen, nachdem Patient einen Tag gefastet und den Darm entleert hat. Empfehlenswerther ist die Darreichung in Kapsel- und Pillenform:

1558. Extr. cort. rad. pun. granat. 18·0,
Extr. filic. mar. aeth. 9·0,
M. exhibe in caps. gelatin. Nr. 30.
S. Morgens nüchtern acht Stück zu nehmen, hierauf 1 Tasse russ. Thee. Weiters ¼stündlich je 2 Kapseln mit Thee, Suppe oder Wasser, so dass nach 2½ Stunden alle Kapseln genommen sind. Ist der Wurm 6 Stunden nach Beginn der Cur nicht abgegangen, so werden 20·0 Ol. Ricini oder 40·0 Aq. laxat. Vien. gereicht.

1559. Pelletierin. sulf. 0·3.
Tannin. 0·5.
D. ad caps. amyl.

1560. Extract. Aspidii spinulos. aeth. 4·0.
Detur. in caps. gelatin.
S. Auf nüchternem Magen zu nehmen. 2 Stunden darauf Oleum ricini.

1561. Extr. filic. mar. aeth.
Extr. Punic. Gran. aa. 10·0,
Pulv. Jalapp. 3·0.
M. f. pill. keratinisat. Nr. 70.
S. Pillen. 15—20 Pillen an dem dem Curtage vorangehend. Fasttage, am Curtage selbst innerhalb 2—3 Stund. der Rest zu geben (Bettelheim).

Falls ein Abführmittel nöthig:

1562. Aq. laxat. Vienens. 200·0.
S. Klysma.

1563. Pulv. Kamalae 20·0,
Extr. Fil. mar. aeth. 5·0.
Div. in dos. = 30.
D. ad capsul. gelatinosas.
S. Je 4 Kaps. ¼st. zu nehm.

1564. Pulv. flor. Kusso. 25·0,
Mellis despumat. q. s.
ut f. Electuarium.
S. Je 1 Hälfte im Zwischenraume von 1 Stunde zu nehmen.

1565. Pulv. Kamalae 20·0.
Div. in dos. = 5.
S. Jede ¼ Stunde 1 Pulv.

1566. Extr. fil. mar. aeth. 5·0—10·0,
Aq. Menthae 150·0,
Ol. Ricin. 30·0,
Sacch. alb. 20·0.
F. Emulsio.
S. Morg. u. Mitt. je d. Hälfte.

1567. Extr. filic. mar. aeth. 30·0.
Div. in dos. aequ. Nr. 30.
Exhibe in caps. gelat.
S. Je 4 St. ¼stündl.

1568. Extr. filic. mar. aeth.
Pulv. filicis mar. aa. 2·0
Consere. rosar. q. s.
u. f. pil. Nr. 15.
S. Jede Stunde 3—4 P

1569. Chloroform.,
Extr. Filic. mar. aa. 3·0,
Em. Ol. Ric. 100·0.
S. Nach 24stünd. Fasten auf 2mal innerhalb 1 Stunde z. n. (Vorsicht!)

1570. Ol. Terebinth. 10·0.
Ol. ricini 50·0.
S. Früh auf einmal zu nehm.

Bei Kindern:

1571. Extr. fl. mar. aeth. rec. par. 5·0.
S. 1/2stündl. auf 2—3mal zu nehmen. (Das Medicament auf dem Kaffeelöffel m. Zucker zu bestreuen u. einige Tropfen Citronensaft hinzuzufügen.)

1572. Extr. Pun. Gran. 2·0.
Syr. Menthae pip. 10·0.
Mellis despum. q. s.
ut f. Electuarium.
S. Je 1/3 Früh, Mittags u. Abends zu nehmen.

1573. Pulv. flor. et fol. Brayerae 30·0,
Mellis desp. q. s.
ut f. Electuarium.
S. Je 1/3 Früh, Mittags und Abends zu nehmen.

1574. Extr. Filic. mar. aeth. 1·0.
Mellis desp. q. s.
ut f. l. a. Electuar.
S. Je 1/3 Früh, Mittags und Abends zu nehmen.

Auch die anderen oben angeführten Medicam. in etw. kleinerer Dosis eignen sich bei Kindern.

Tetanus, Starrkrampf.

Möglichste Ruhe in der Umgebung des Kranken. Gleichmässige Temperatur, zumeist eine kühlere erwünscht; Narcotica gegen die Schmerzen, am *besten subcutan*; Chloroform-Inhalationen; auch Chloroform-Zerstäubung neben dem innerlichen Gebrauch von Chloralhydrat u. Morphium (constanter leichter Schlummer); möglichste Schonung von Wunden bei deren Pflege. Bei Trismus Narkose u. während derselben künstl. Ernährung. In neuerer Zeit auch Pilocarpin m. Erfolg angewandt. Heisswasser-Compressen (50 bis 55° C.) aufs Hinterhaupt u. längs d. Wirbelsäule; bei Manchen Kaltwassercompr. Tetanusantitoxin.

1575. Chlorali hydr. 5·0,
Aq. dest. 100·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Jede 1/4 Stunde 1 Essl.

1576. Inf. fol. Nicotian. e 1·0
S. Z. Klysma. [ad 100·0.

Auch subcutane Injection von Calabarextract 1—2 Spritz. 0·20: Aq. 10·0 zu versuchen.

Empfohlen wird ferner Sol. Fowleri, auch Tinct. Moschi tropfenweise.

Tic douloureux vide: Neuralgia trigemini.

Tonsillitis vide: Angina.

Trachom vide: Conjunctivitis blennorrh. chron.

Tremor vide: Paral. agit.

Trichinosis, Trichinenkrankheit.

Sind die Trichinen noch im Magen oder Darme Ausspülung des Magens oder Abführmittel; spätere Behandlung symptomat.: milde Laxantien (Oleum Ricini, Calomel). In schwereren Fällen, besond. bei remittirendem Fieber und gestörter Nachtruhe nach vorausgegangenem warmen Bade Morphium d. Abends. Möglichste absolute Ruhe b. Tag u. Nacht. Antipyretisch auch Salicylsäure. Prophylaktisch Vermeidung von rohem Schweinefleisch.

1577. Kalii picro-nitric. 4·0.
Pulv. Liquir., [pil. Nr. 60.
Succ. Liq. aa. q. s. ut f.
S. 3mal tägl. 4—6 Pille

Kräftige Abführmittel. Behandl. d. Fiebers. Gegen Muskelschmerz. kalte Waschungen. Einreibungen mit Chloroform. Eisbeutel.

Tuberculosis pulmonum et laryngis, Tuberculose d. Lungen u. d. Kehlkopfes.

Aufenthalt in gesunder Luft, im Winter in einem südlichen Klima. Hygienisch-diätetische Behandlung in geschlossenen Anstalten. Fieber keine Contraindication für Reisen; dagegen Besuch von Curorten bei Vorhandensein von Cavernen zu widerrathen. Empfehlensw. sind: a) bei geringem Fieber u. reichl. Auswurf Lussinpiccolo, Gardasee, San Remo, Mentone, Cannes, Hyères, Nizza, St. Moritz; Cairo; b) bei Neigung zu Haemoptoë, Fieber, trock. Husten: Venedig, Palermo, Pisa, Madeira, vorher intermediärer Aufenthalt in Meran, Arco, Montreux. Im Sommer Land, Mittelgebirge, Gleichenberg, Giesshübl, Radein, Ems, Selters, Homburg. Ueberhaupt Sorge für stets frische staubfreie Luft. Gute Nahrung, womöglich Leberthran, Lipanin, Selters, Giesshübl, Krondorfer, Salvator, Radeiner, Emser Wasser mit Milch. Behandlung d. Fiebers. Mittel gegen d. Hustenreiz. Im afebrilen Stadium kräftige Nahrung, Lungengymn. Abhärtung d. Haut durch kühle morgendliche Abreibungen. Patient soll stets durch die Nase athmen und stets (auch im Winter) bei offenem Fenster schlafen. Molkencur, Kumys, Kefir, Traubencur.

Bei suspecten Laryxcatarrhen Phthisischer Schonung des Kehlkopfs, Warnung vor schlechter Luft, Tabakrauch, rauhem Wind, Anwendung mild. Adstringentien und reizstillender Mittel, Priessnitz'sche Umschläge.

Bei tuberculösen Geschwüren im Kehlkopfe, die als solche durch exacte Untersuchung der Lunge constatirt sind, absolut keine Aetzung, Hustenreiz und Schlingbeschwerden, selbst Athembeschwerden mässigen Grades hier durch Einblasungen von Morphium, besser durch Bepinselung mit Cocain, mit Hilfe des Kehlkopfspiegels erfolgreich zu bekämpfen. Bei milderen Erscheinungen Einblasung von Alaun, Tannin etc. Symptomatische Behandlung des Grundleidens. Bei zunehmender, von einer Stenose des Kehlkopfes herrührender Athemnoth Tracheotomie. — Die Behandlung mit dem Koch'schen Tuberculin ist nach dem gegenwärtigen Stande der viel discutirten Frage den Praktikern nicht zu empfehlen.

Bei Kindern: Ammenmilch, später passende Nahrung, wenig Amylacea.

1578. Guajacol. 2·0.
Ol. jecoris Aselli 200·0.
S. Täglich 3 Esslöffel.

1579. Guajacol. 2·0.
Ol. amygdal. 20·0.
Gummi arab. pulv. 10·0.
F. emulsio, cui adde:
Aq. dest. 950·0.
S. Für 4 Klystiere.

1580. Guajacol. carbon.
(Guajacolcarbonat = Duotal) 20·0.
Div. in dos. XX.
S. Morgens und Abends je 1 Pulver z. n. (eventuell bis 6 Grm. pro die zu steigen).

1581. Thiocol. 20·0.
Div. in dos. XX.
S. Täglich 3—4 Pulver.

1582. Sirolin. 100·0.
S. Täglich 5—6 Kaffeelöffel.

1583. Creosoti 15·0,
Tinct. Gentian. 30·0.
Spir. vin. rectificat. 250·0.
Vini malac. q. s. ad 1000·0.
S. 2—3mal tägl. bei der Mahlzeit 1 Esslöffel voll in einem Weinglase Wasser zu nehmen.

1584. Creosot. 0·05.
Bals. tolutan. 0·2.
D. tal. dos. Nr. 100 ad caps. gelatinos.
S. Am 1. Tage eine, am 2. zwei, dann 8 Tage je drei, 2. Woche vier, 4. Woche sechs Kapseln. (Diese Dosis 2 Monate lang und darüber direct nach der Mahlzeit.)

1585. Creosoti 4·0.
Ol. jecor. Aselli 200·0,
Saccharin. 0·10.
S. 2—3mal täglich 1 Essl.

1586. Creosot. 2·0—3·0,
Natr. arsenicos. 0·04,
Vin. malac. 500·0.
S. 2 Liqueurgläschen tägl. während der Mahlzeit.

1587. Creosotal (Creosot. carbon.) 100·0.
S 1—6 Grm. täglich (bei Kindern), *4—15 Grm täglich* (bei Erwachsenen) *theelöffelweise rein oder in Milch, Wein u. dgl.*

1588. Creosot. valerianic. (Eosot) 0·2,
exhib. in caps. gelat.
D. tal. dos. Nr. L.
S. 3, später 6—9 Kaps. tägl.

1589. Pastilli Guajacetini à 0·5.
S. 3mal täglich je eine Pastille nach dem Essen.

1590. Guaethol. 0·1,
exh. in caps. gelatin.
D. tal. dos. Nr. L.
S. 3mal tägl. 2—3 Stück zu nehmen.

1591. Thiocol. 0·3—2·0.
D. tal. dos. Nr. L.
S. 2—3 Pulver täglich.

1592. Menthol. 0·1,
Exh. in caps. gelat.
D. tal. dos. Nr. XXX.
S. Bis 6 Stück täglich mit Cognac u. Wasser oder Milch zu nehmen.

1593. Acid. arsenicos. 0·1.
Rad. Liq. 4·0.
Mell. q. s. ut f. pil. Nr. C.
S. Täglich 5—10 Stück.

1594. Natr. cinnamylic. puriss. solve in [1·0.
Aq. dest. 20·0.
S. Zu intravenösen Inject. (Landerer.)

1595. Hetol. oder Hetokresol. Aq. dest. 10·0. [0·01.
S. Zu intravenösen oder glutäalen Injectionen; steigend bis 0·05 pro die.

1596. Acid. cinnamyl. subt. pulv. 5·0,
Ol. amygd. dulc. 10·0,
Vitell. ovi Nr. I
Solut. natr. chlorat. 0·7% quant. sat. ut f. emulsio ad 100·0.
DS. Zur intravenösen Inject. (Landerer.)

1597. Natr. cacodyl. 0·4,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu rectalen Injectionen. 2mal täglich 5 Ccm. durch 6 Tage, dann 3mal täglich durch weitere 6 Tage, 3 bis 5 Tage aussetzen und sodann einen neuen Turnus beginnen.

1598. Sulfosotsyrup. 100·0.
S. Kaffeelöffelweise täglich 3mal zu nehmen.

Bei Fieber:

1599. Phenacetin (oder *Lactophenin*) *0·5,*
D. tal. dos. Nr. X ad caps. amyl.
S. Täglich 2—4 Pillen z. nehm.

1600. Chinin sulfur. 1·0,
Sacch. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pul

Gegen den Hustenreiz:

1601. Extr. Hyosc. 0·50,
Succh. alb. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 15.
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.

1602. Peronin. 1·0,
Aq. dest. 150·0.
S. 3mal täglich 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Mittel gegen den Hustenreiz siehe auch bei Bronchitis.

Bei erschwerter Expectoration, wenn keine Neigung zu Lungenblutungen besteht:

1603. Apomorphin. mur.
Morph. mur. aa. 0·05,
Succh. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 12.
S. 3—4mal tgl. 1 Pulv.

1604. Kal. jodat. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 2—3mal täglich 1 Esslöffel voll.

1605. Liq. ammon. anis.
Tr. opii benz. aa. 15·0.
S. 3—4mal tägl. 20 Tropf.

Bei sehr reichlicher Secretion:

1606. Balsam. peruvian. 20·0,
Ol. Terebinth. rectif. 2·0.
S. 3mal tägl. 10 Tr. in Wasser.

Bei Schlaflosigkeit:

1607. Paraldehyd. 2·0—4·0,
Mixt. gumm. 60·0,
Syr. cort. aur. 30·0.
S. Auf 1mal zu nehmen (Schlafmittel).

1608. Sulfonal. p. 1·5—2·0.
Dentr. tal. dos. Nr. 10.
S. 2—3 Stunden vor dem Schlafengehen 1 Pulver zu nehmen.

Ebenso Trional und Somnal.

1609. Chloralamid. 2·0,
Aq. dest. 100·0,
Acid. mur. dil. gtts. 3,
Syr. c. aurant. 15·0.
S. Abends zu nehmen.

Bei Anämischen und Chlorotischen:

Guberquelle (täglich 1 Essl., allmälig bis auf 4 Essl. steigend, in Rothwein).

1610. Syr. Ferr. jod. 10·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Früh u. Abends 1 Kaffeelöffel.

1611. Ol. Jecor. Asell. 100·0.
S. Früh u. Abends 1 Esslöffel.

Statt des Leberthrans empfiehlt man Lipanin.

Bei nächtlichen Schweissen abendliche kalte Waschungen mit Essigwasser, ferner:

1612. Acid. salicyl. 3·0,
Amyli pur. 10·0,
Talci 87·0.
S. Streupulver.

1613. Acid. agaric. p. 0·50.
Plv. Acor. q. s. ut f. p.
N. 50.
S. 1—3 Pillen vor dem Schlafengehen.

1614. Atropini sulf. 0·05,
Aq. dest. 20·0.
S. 10—20 Tropf. vor Eintritt der Schweisssecretion zu nehmen. Auch subcutan (1/4 Spritze).

1615. Atropini sulf. 0·02.
Pulv. et Extr. Liqu. q. s. ut f. pil. Nr. 20.
S. Des Abends je 1 Pille (event. 2—3 Pillen je 2 Stund.).

1616. Hyosc. hydrojod. 0·01,
Argill. q. s.
F. pil. Nr. 20.
S. Abends 1 Pille.

1617. Agaricin. 0·10.
Pulv. Dower. 2·0.
Rad. Altheae
Mucilag. aa. 1·0.
M. f. pil. Nr. 20.
S. 1—2 Pillen zu nehmen.

1618. Fol. salviae 100·0.
S. Thee. (Täglich 15·0 zum Thee, kalt getrunken.)
1619. Tinct. Salviae 30·0.
S. 30—50 Tropfen ungefähr 2 Stunden vor Eintritt des Schweisses zu nehmen.

Zur localen Behandlung der Larynxgeschwüre:

1620. Cocain. mur. 0·2—0·5,
Glycerini,
Aq. dest. aa. 5·0,
Morf. mur. 0·20.
S. Zum Bepinseln.
1621. Cocaini mur. 0·20—0·50,
Sacch. alb. 8·0.
S. Zu Insufflationen.
1622. Coc. mur. 0·20—0·5,
Bism. subnitr.,
Sacch. alb. aa. 5·0.
M. f. Pulv.
S. Zur Insufflation.
1623. Aq. Picis 20·0.
S. Zu Inhalationen.
Vide auch Ulcera laryngis.

Auch Inhalation warmer Dämpfe empfehlenswerth, bei Hämoptoe zu meiden.

Bei Diarrhoe:

1624. Laudan. pur. 0·20,
Tannini pur. 1·0,
Pulv. rad. Colomb. 2·0.
M. f. p. dic. in dos. = 10.
S. 4stündlich 1 Pulver.
1625. Dect. rad. Colombo e 10·0 ad 200·0,
Mucilag. Salep 10·0,
Extr. op. aq. 0·10,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.
1626. Bismuth. loretinic. 0·5,
D. tal. dos. Nr. 6 in caps. amyl.
S. Täglich 1—3 Stück z. n.
1627. Dermatol. 5·0,
dic. in dos. X.
S. Tägl. 4—8 Pulver z. n. —
Vgl. a. Catarrhus intestin.

Gegen das Erbrechen der Phthisiker Eispillen oder:
1628. Aq. chloroform.
Aq. dest. aa. 100·0.
S. In Pausen von 10 Min. je 1 Esslöffel voll zu nehmen.
1629. Menthol. 0·20,
Mixt. gummos. 150·0.
S. 3—4 Esslöffel voll zu nehmen.

Tumor albus, fungöse Gelenksentzündung.

Möglichste Ruhe des Gelenkes; womöglich starrer Verband (Gyps oder Wasserglas, blaue Organtinbinde), kalte Compress. i. Beginne, locale Anwendung resorbirender Mittel, 1%iges Formalinglycerin, bei jungen Individuen Landaufenthalt, Gebirgsluft, kräftige Kost, Leberthran, Lipiker Jodwasser, Jodsalzbäder oder mit Zusatz von Mattoni's Moor-Extr.; bei Anämischen Eisen (Radlauer's Eisenalbumin-Peptonat-Essenz). Bei älteren Individuen (nach der Pubertät) rechtzeitige Operation.

Tussis convuls., Pertussis, Keuchhusten.

Im Beginne die gegen Husten gerichteten Mittel gewöhnlich ausreichend. Im entgegengesetzten Falle Bromkali oder Codein etc. Aufenthalt in frischer Luft, am besten Luftveränderung (mässige Entfernung [1—2 Stund.] genügend). Gesunde Kinder streng zu isoliren und vor Erkältungen zu schützen. Während d. Anfalles die Kinder zu unterstützen und bei der Herausbeförderung des Schleimes behilflich sein; gleichmässige warme Zimmertemperat.; Nase zu untersuchen!
1630. Pulv. r. Bellad. 0·10,
Sacch. alb. 5·0,
M. f. p. dic. in dos. = 10
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv

1631. Tct. Bellad. gtts. 5,
Aq. dest. 50·0,
Syr. rub. Idaei 10·0.
S. Alle 3 Stunden je 1 Kaffeelöffel.

1632. Extr. Belladonn.,
Zinc. oxydat. aa. 0·20,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh, Mittags u. Abends 1 Pulver

Belladonnapräparat. im Stadium convulsiv. anzuwenden; b. starker Erweiterung d. Pupillen zu sistiren.

Im Stadium blennorrhoicum Einathmung von Dämpfen des Latschenkieferöls, durch 1 Stunde 5—10 Tropf. verdunstet.

1633. Aq. picis,
Aq. dest. aa. 50·0.
S. Zu Inhalationen (3—4mal je 2—5 Minuten; auch prophylaktisch bei den Geschwistern).

Chin. hydrochlor., u. zw. 2mal so viel Decigramm, als das Kind Jahre alt ist; am besten in warmer Milch.

1634. Chinini tann.,
Sodae bicarb.,
Sacch. albi aa. 1·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 2stündl. 1 Pulver.

Von Chinin. mur. 3mal tägl. soviel Decigr., als das Kind Jahre zählt, b. z. Maxim. v. 2 Grm. pro die.

1635. Chinin mur. 0·1,
ad cavs. gelat.
D. tal. dos. Nr. X.
S. Nach Bericht.

Dasselbe auch in Suppositorien (à 0·05—0·5) m. vollkommen säurefreier Cacaobutter.

1636. Chinin. bimuriat. 2·0,
Aq. dest. 8·0.
S. Zur subcutanen Inject.

1637. Euchinin. 0·2.
dent. tal. dos. Nr. X.
S. Nach Bericht.

In Suppe, Milch oder Cacao (v. Noorden).

1638. Antipyrini 1·0,
Vini Tokayens.,
Aq. dest. aa. 25·0,
Syr. cort. aur. 50·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Im Allgemeinen so viel Decigramm Antipyrin p. die, als das Kind Jahre zählt.

1639. Kal. bromat. 1·0,
Aq. dest. 100·0.
Syr. rub. Id. 15·0.
S. Ständlich 1 Kinderlöffel.

1640. Bromoform. gtts. XX,
Alcohol. 10·0,
Gumm. trag.
Syr. tol. aa. 60·0,
S. Ständlich 1 Kaffeelöffel.

1641. Chlorali hydrat. 1·0,
Aq. dest. 100·0.
Syr. simpl. 20·0.
S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.

1642. Terpinhydrat. 0·5—1·0.
D. tal. dos. Nr. 10.
S. 3mal tägl. 1 Pulver.

1643. Tussol (Antipyrin. amygdalic.) 2·5,
Aq. dest. 80·0,
Syr. cort. aur. 20·0.
S. 1—2 Kaffeelöffel v. tgl. z. n.

1644. Pertussin (Extract. thym. saccharat.) 100·0.
DS. Ständl. 1 Theelöffel.

1645. Antispasmin. 0·5—1.0,
Aq. lauroceras. 10·0.
S. 3mal tgl. 2—20 Tropfen je nach dem Alter des Kindes.

Auch Pilocarpinum muriaticum subcutan empfohlen.

Inhalation von 1—2%, Carbolsäure direct od. d. Aufhängen von in Carbolsäure getaucht. Tüchern um das Bettchen des Kindes.

1646. Naphthalin 20·0.
S. Auf glühenden Kohlen 1mal tägl. zu verdampfen.

Tyloma, Schwielen, Clavus, Hühneraugen.

Abtragen der harten Epidermis und Ausschneiden des Hühneraug[es] mit darauffolgender

wendung von Pflasterstreifen oder Salben. Bei papillomartig. Formen Pacquelin. Wollringe empfehlenswerth. In neuester Zeit wurde von Roesen folgendes Verfahren empfohlen: „Das zu entfernende Gebilde wird mit einer aseptischen Lösung (Bor oder Salicyl) etwas befeuchtet, dann mit einer ziemlich dicken (0·4—0·5 Cm.) Lage reiner, krystallinischer Salicylsäure bedeckt; darauf gibt man als reizlosestes Verbandmittel feuchten Borlint, vierfach zusammengelegt, darüber ein gut deckendes Stück Guttapercha, so dass das Object nach allen Seiten gehörig abgeschlossen ist, u. verbindet. Dieser Verb. bleibt bei nicht zu dicken Hühneraugen, Schwielen, nicht zu gross. Warzen nur 5 Tge. liegen."

1647. Merc. praec. alb. 2·0,
Ung. emollient. 20·0.
S. Salbe (mit Guttaperchapapier u. dgl. bedeckt).

1648. Merc. praecip. alb.,
Oxyd. Zinci aa. 2·0,
Ung. simpl. 20·0.
S. Salbe.

1649. Ung. Diachyl. 20·0.
S. Salbe.

1650. Acid. nitr. conc. 10·0.
S. Mit Glasstab aufzutr.

1651. Empl. Hydrarg.
Empl. sapon. aa. 5·0.
Tend. supr. lint.
S. Pflaster. (Täglich frisch aufzulegen, bis die erweichte Epidermis sich abtragen lässt.)

1652. Acid. salicyl.,
Acid lact. aa. 1·0,
Ung. cerei 8·0.
S. Salbe.

Typhlitis et Perityphlitis,

Entzündung des Blinddarmes und seiner Umgebung.

Absolute Bettruhe, in d. ersten Tagen möglichst gänzliche Entziehung der Nahrung, dann Milch in kleinen Dosen. Erst allmäliger Uebergang zu breiiger und consistenterer Kost. Zur Stillung des Durstes Eispillen. Nur zu Beginn der Erkrank. bei Nachweis grösserer Fäcalmassen im Coecum leichte Abführmittel (Ricinus, Calomel etc.) oder Hegar'sche Irrigation. Gegen die Schmerzen kalte Umschläge, bei sehr kräftigen Individuen Blutegel; Opium. Nach Ablauf der Entzündungserscheinungen und bei fortbestehender Obstipation Abführmittel wie oben. Operative Behandlung in geeigneten Fällen. Gegen etwa zurückbleibende Exsudate Einpinselung der Haut mit Jodtinctur.

1653. Opii pur. 0·5,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. 3stündl. 1 Pulver.

1654. Tct. opii simpl. gutt. 20,
Emuls. amygdal. 50·0.
S. 3stündl. 1 Essl.

Bei Kindern: Bei Anhäufung v. Kothmassen im Coecum vorsichtige Darmirrigation mit Wasser oder Aq. laxativ. Vienn. Sodann vollst. Ruhe, flüssige Nahrung, innerl. Opiate, gegen die Schmerzen Kälte auf das Abdomen.

1655. Aq. laxat. Viennens.
Aq. dest. aa. 250·0.
S. Zur Irrigation.

1656. Acid. tartaric. 1·0,
Aq. dest. 100·0.
Tct. opii simpl. gtts. 2—5,
Syr. simpl. 10·0.
S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.

Typhus.

Bekämpfung der gefährlichen Symptome, besonders d. Fiebers; Wärmeentziehung durch directe Abkühlung des Körpers, durch verschiedene medicamentöse und diätetische Verordnung.; flüssige Reinigung des Mundes. Am besten ausschliesslich Milchdi

neben Alkoholicis. Eier, Eier mit Cognac in Form der Stokesschen Brandy-egg-Mixtur

1657. Vitelli ovor. Nr. 2,
Cognac 50·0,
Aq. cinnamom. 150·0,
Syr. simpl. 25·0.
S. Löffelweise.

Feste Speisen erst nach der 3. Woche. Gute Ventilation des Krankenzimmers. Bei einer Temperatur von 39·5 hydrotherapeut. Cur: Bäder m. Uebergiessungen, Einpackungen. Kalte Abwaschungen, Umschläge, kalte Essigwaschungen; Darreichung kalten Getränkes. Man beginnt mit Bädern von 30° C. und geht durch Zufliessenlassen von kaltem Wasser um einige Grade herunter. Kühle Uebergiessungen auf den Nacken. Sind Bäder nicht ausführbar, dann Einpackungen oder Waschungen mit Essigwasser (1 Essig : 4 Wasser). Bei Meteorismus kalte Umschl. auf den Bauch (jede 1/4 Stunde erneuert) und Kaltwasserklystiere; bei Stuhlverstopf. Warmwasserklystiere; bei Darmperforation absol. Ruhelage, keine Nahrungs- und Getränkezufuhr, nur Eispillen u. Tinct. opii simpl. 4—10 Tropfen 1—4stündl.; ebenso bei acuter Peritonitis. Gegen übermässige Kopfschmerzen Eisblase auf d. Kopf, Chinin in grossen Dos.

1658. Chinini hydrochlor.
Syrup. rub. id.. [1·0—2·0,
Aq. dest. aa. 30·0.
D. S. Alle 10 Minuten 1 Esslöffel voll.

1659. Natr. salicyl. 4—6·0.
Div. in dos. = 3.
S. In den Abendstund. rasch hinter einander zu nehmen.

1660. Phenacetin.
Sacch. alb. aa. 0·3,
M. f. p. d. tal. dos. = 5.
D. ad caps. amyl.
S. In den Nachmittagsstunden 1—2 Pulv. zu nehm.

1661. Antipyrin. 5·0.
Div. in dos. = 5.
D. ad caps. amyl.
S. In den Nachmittagsstunden 1—3 Pulver.

1662. Lactophenin. 5·0.
Div. in dos. X.
Ad caps. amyl.
S. 2stündlich 1 Pulver zu nehmen.

1663. Citrophen 0·5—1·0.
D. tal. dos. Nr. X.
S. 3—4 Pulver täglich.

1664. Thallini sulf. 0·04—0·10,
Sacch. pulv. 0·3.
D. tal. dos. X.
S. Stündlich 1 Pulver in Oblaten.

1665. Pyramidon. 0·3—0·75.
Detr. tal. dos. Nr. X.
S. Bei Bedarf 1 Pulver in Wasser gelöst zu nehmen.

1666. Magnes. salicyl. p. 10·0.
Div. in dos. = 10.
S. 3ständl. 1 Pulver.

1667. Bismut. subsalicyl. 1·0—2·0.
D. tal. dos. ad caps. amyl. Nr. X.
S. Mehrmals tägl. 1 Pulver.

Um die Entwickelung der Typhusbacillen zu hemmen, resp. letztere zu vernichten, ist die Darreichung von Naphthalin od. Calomel (letzteres zumal im Anfange der Erkrankung) zu versuchen.

1668. Naphthalin.
Sacch. alb. aa. 5·0,
Ol. Bergamott. gtts. duas.
M. f. p. div. in dos.= 20.
S. Stündlich 1 Pulver.

1669. Naphtol. α 0·5—0·75,
Bismuth. salicyl. 0·3.
M.f.p.dntr.tal.dos. Nr.XX.
S. 4—6 Pulver täglich zu nehmen.

1670. Calomelan.,
Sacch. alb. aa. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10
S. 3—4 Pulver tägl.

Bei vorwaltender Diarrhoe:

1671. Dect. r. Salep 200·0,
Tinct. Laud. simpl. gtts. 5,
Syr. rub. Idaei 20·0.
S. Zum Getränk (eventuell stündlich 1 Esslöffel voll).

1672. Mixt. gumm. 200·0,
Extr. Laudan. aq. 0·10.
S. Ständlich 1 Esslöffel.

1673. Dect. r. Salep 200·0,
Tinct. Laudan. spl. 2·0.
S. Zum Klysma.

Bei Aufregungszuständen Eisbeutel auf den Kopf, Morphin subc. (0·01) od. Duboisin (0·001).

Bei blutigen Diarrhoen:

1674. Alumin. crud. 0·50,
Laudan. pur. 0·10,
Camphor. ras. 0·30,
Succh. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 2. Stunde 1 Pulver

1675. Plumbi acet.,
Laudani pur. aa. 0·30,
Amyli pur. 5·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Jede 2. Stund. 1 Pulver.
Vide auch Darmblutung.

Bei zunehm. Schwäche (Collaps) Aether. Ol. camphorat. subcutan injiciren, Champagner; Wein esslöffelweise, Fleischbrühe.

1676. Camphorae tritae 1·0,
Muc. gumm. ar. 20·0,
Aq. dest. 200·0.
S. $^1/_2$*—2ständlich 1 Esslöffel voll.* (Dasselbe auch f. 3 Klyst.)

1677. Inf. rad. Valerian. e 10·0 : 150·0,
Liq ammon. anisat. 3·0,
Syr. cort. aurant. 20·0.
S. 1ständlich 1 Esslöffel.

1678. Moschi 0·50,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3ständl. 1 Pulver.

Geg. Stuhlverstopfung: Warmwasserklystiere.

Bei T. exanthematicus frühzeitige Anwendung v. Excitantien und Stimulantien.

Ulcera, Geschwüre.

Bei starker Röthung und Schwellung des Theiles Umschläge m. kaltem Wasser o. Bleiwasser. Bei Fussgeschwüren Application von Säuren; Jodoformverband; bei stark granulirenden Geschwürsflächen Cauterisation mit Lapis oder Paquelin, Bepinselung mit Kali caust., Auskratzen mit dem scharfen Löffel; bei reinen Geschwüren Einwickelung mit Heftpflasterstreifen (nach Baynton) oder Flanellbinden oder Gummibinden des Tags, Nachts feuchtwarme Umschläge. Transplantation von Hautstückchen.

1679. Plumb. ac. b. sol. 20·0.
Aq. dest. simpl. 200·0.
S. Zu Umschlägen.

1680. Alum. crud. p. 10·0.
Plumb. acet. bas. sol. 20·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zu Umschlägen.

1681. Oxyd. Zinci 5·0,
Vaselini,
Lanolini aa. 15·0.
S. Salbe.

1682. Kal. caust. 0·50,
Aq. dest. 200·0.
S. Verband.

1683. M. praec. rubr. 0·20,
Lanolin. 15·0,
Vaselin. 5·0.
S. Salbe.

1684. Europhen 2·0,
Ol. olivar. 10·0,
Lanolin. 88·0.
S. Salbe.

1685. Dermatol. 20·0,
Talc. ven. 70·0,
Amyl. 10·0.
S. Streupulver.

1686. Airol. 10·0.
S. Streupulver.

Airol auch als Salbe (10%), Gaze, Emulsion und mit Collodium.

1687. Sanoform 20·0.
S. Streupulver.
1688. Acid. arsenicos., Orthoform aa. 0·2, Alkohol, Aq. dest. aa. 10·0—15·0.
S. Aetzpasta.

Bei Ulcus cruris die Unnasche Zinkleimbehandlung mit:

1689. Zinci oxydati, Gelatin. puriss. aa. 10·0, Glycerini, Aq. dest. aa. 40·0.
S. Erwärmt aufzupinseln.
1690. Ichthyoli puri 100·0.
S. Salbe. (Geschwür und Unterschenkel damit zu bestreichen, darüber Watte. Verband anfangs täglich, dann seltener zu wechseln.)
1691. Bismuth. loretin. 2·0, Adipis benzoat. 20·0.
S. Austrocknende Salbe.

Die Therapie nach Cipriani: 1. Waschen des Ulcus mit heissem Wasser; 2. Abtupfen mit Jodoformwatte; 3. Aufstreuen von Eka-Jodoform in dünner Schichte; 4. Verband bis über das Knie hinauf mit 4—5 Lagen von in 1—2%ige Formaldehydlösung getauchten Leinwandstreifen; 5. Verband mit in 2—4%ige Formaldehydlösung getauchten, ausgedrückten Leinwandstreifen; 6. Compressionsverband. Täglich zu erneuern.

Bei gangränösen Geschwüren desinficirendes Wundwasser und Gypstheerpulver.

1692. Calcar. chlor. 5·0, Aq. dest. 200·0.
S. Wundwasser.
1693. Kal. hyperm. 2·0, Aq. dest. 200·0.
S. Wundwasser.
1694. Calcar. sulf. 50·0, Picis liquid. 10·0, M. exactiss. f. P.
S. Streupulver (Gypstheerpulver).
1695. Magist. Bism. pulv. 30·0.
S. Streupulv. (Nach Reinig. d. Wunde zu appliciren u. durch eine Binde zu befestigen.)
1696. Acid. pyrolign. 2·0, Aq. dest. 200·0.
S. Wundwasser.

Bei tuberculösen und scrophulösen Geschwüren: Abtragung d. unterminirt. Ränder, Evidement, Jodoformgazeverbnd. Bei besond. torpiden Geschwüren Bedeckung mit in wässerige Jodlösung getauchter Gaze, darüber Guttaperchaverband.

1697. Kalii hydrojodic. 2·0, Jodi pur. 1·0, Aq. dest. 200·00.
S. Aeusserlich.

Bei Kindern Bäder mit Halleiner Mutterlaugensalz. Innerlich Leberthran.

Bei luetischen Geschwüren entsprechende locale Behandlung und Jodkali innerlich.

Ulcera laryngis.

Berücksichtigung d. ursächlich. Leidens, ob Syphilis, ob Tuberculose, u. Behandl. dieser. Local Inhalationen od. Inspersionen und Bepinselungen. Bei tuberculösen Geschwüren, allenfalls auch bei typhösen, Meidung jedweden energischen Aetzens. Hier hat man sich auf Einblasung oder Inhalation von Alaun, Tannin etc. zu beschränken. Inspersionen von Jodoformpulver 3—4mal täglich allein oder nach Inhalation von Carbollösung sollen sehr erfolgreich sein.

1698. Alum. crud. p. 20·0, Aq. dest. 200·0.
S. Zur Inhalation.

1699. Tannini pur., Sacch. alb. aa. 5·0. S. Zum Einblasen.

1700. Morph. mur. 0·20, Pulv. gummos. 10·0. S. Zum Einblasen.

1701. Arg. nitr. cr. 0·50, Aq. dest. 10·00. S. Zum Bepinseln.

1702. Phenol. monochlorat. 5·0, Glycerin. 50·0. S. Mit Wattesonde z. bepins.

1703. Creosot. puriss. 1·0, Spirit. rect. 40·0, Glycerini ad 100·0. S. Zum Einspritzen in den Kehlkopf.

1704. Acid. bor. subt. pulv. 10·0, Morph. mur. 0·1. S. Zum Einblasen.

1705. Resorcin. 2·0 Aq. dest. ad 100 0. S. Zum Inhaliren.

Siehe auch Tuberculosis pulmonum et laryngis.

Bei constatirter Syphilis: Allgemeinbehandlung neben der energischesten Localbehandlung etc.

1706. Kal. jodat. 1·0, Jodi pur. 0·10, Glycerin. 20·0. S. Zum Bepinseln.

Ulcera intestini tuberculosa, tuberc. Darmgeschwüre.

Behandlung gleichzeit. Lungentuberculose. Vermeidung darmreizender Mittel. Leberthran, Molken, eisenhaltige Mineralwässer. Guberquelle. Diät: Milch, Eier, Fleisch, eventuell Fleischsolution.

Gegen die Diarrhoe:

1707. Magist. Bismuth. 3·0, Opii pur. 0·2, Sacch. alb. 4·0. M. f. p. div. in dos. = 10. S. 3—4mal tgl. 1 Pulv.

Vide: *Cat. intest. chron.*

1708. Bismuth. subsalicyl., Saloli (od Benzonaphtholi) Calcar. carb. praec. aa. 10·0 M. f. p. div. in dos. XXX. S. 3—4 Pulver täglich in Oblaten.

Bei Localisation im Dickdarm etc. Amylum-, Salepklysmen mit Zusatz von Opiumtinctur oder:

1709. Argent. nitr. 0·5, Aq. dest. 200·0. S. Zu 2 Klystieren.

Ulcus contagiosum, weicher Schanker.

Vorgäng. Reinig. d. Geschwüre u. deren Umgebung mit einfachem Wasser, dem eventuell ein schwach desinficirend wirkend. Medicament beigegeben ist. Nach vorsichtig geübter Abtrocknung Bepinselung mit Kupfersolution oder Aetzung mit dem Lapisstifte, Kal. caust., concentrirter Carbolsäure u. dgl. Nach Abstossung d. Aetzschorfes Bestreuen mit entsprechenden Streupulvern (Jodoform, Airol, Europhen u. dgl.). Ebenso wenn das Geschwür schon spontan gereinigt zur Behandlung kommt. Bei vermehrter Entzündung in d. Umgebung (Oedeme, Infiltration etc.) kalte Umschläge.

1710. Cupri sulfur. 1·0, Aq. dest. 10·0. S. Zum Bepinseln (2mal täglich).

1711. Resorcin 10·0, Glycerin 20·0. S. Zum Aetzen.

1712. Jodol. 3·0. Spir. vin. 35·0, Glycerini 65·0. S. Zum Bepinseln.

1713. Jodol. 5·0, Sacch. alb. 10·0. M. f. p. S. Streupulver.

1714. Actol. 30·0. S. Streupulver.

1715. Tinct. Jodinae 5·0,
Jodi pur. 0·05.
S. Zum Bepinseln.
1716. Jodoformi pur. od. Airol.
S. Zum Bestreuen. [*5·0.*
1717. Jodof. bituminat. 5·0.
S. Zum Bestreuen.
1718. Acid. salicyl. p. 5·0.
S. Streupulver.
1719. Europhen oder Nosophen 10·0.
S. Streupulver. Darüber eine Lage Watte leicht zu fixiren. Europhen auch in 5- bis 10%iger Salbe.
1720. Bismuth. loretinic. 20·0.
S. Streupulver.

Bei rein eiternden Wundflächen:

1721. Sulf. Cupri 0·50,
Aq. dest. 50·0.
S. Verbandwasser.
1722. Kal. jodat. 1·0,
Jodi pur. 0·10,
Aq. dest. 50·0.
S. Aeusserlich.
1723. Acid. carbol. 1·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Verbandwasser.
1724. Kali caust. 0·10,
Aq. dest. 50·0.
S. Aeusserlich.

Statt der Verbandwässer auch Salben verwendbar:

1725. Cupr. sulf. 0·50,
Vaselini 20·0.
S. Salbe.
1726. M. praec. rubr. 0·50,
Ung. emoll. 20·0.
S. Salbe.
1727. Acidi carbol. 1·0,
Olei olivar. 10·0,
Cretae alb. q. s.
ut f. pasta mollis.
S. Pasta (auf Stanniol etc. aufgestrichen).
1728. Jodoformi pur. 2·0,
Ol. Menthae pip. gtts. 2.
Lanolin. 8·0,
Vaselin. 2·0.
S. Salbe.

Bei gangränösen (phagedänischen) Geschwüren prolongirte warme Bäder, ferner:

1729. Calcur. chlor. 2·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1730. Gypsi pur. 50·0,
Picis liquidae 5·0.
M. f. p. S. Streupulver.

Ulcus corneae, Hornhautgeschwür, Hornhautabscess.

Ausspülen d. Conjunctivalsackes mit Borsäure etc. Bestreuung mit Jodoform, Aristol; Schutzverband, Cauterisation der infiltrirten Corneapartie mit Paquelin oder Galvanokaustik, eventuell bes. bei Hypopyon Spaltung der Cornea, Paracentesis. Bei starken Schmerzen od. torpiden Geschwüren feuchtwarme Umschläge mit Wasser oder Kamillenthee. Lineare Cauterisation der Uebergangsfalte mit Lapis.

1731. Acid. boracici 3·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Zur Ausspülung des Conjunctivalsackes.
1732. Acid. borac. 1·0,
Acid. salicyl. 2·0,
Aq. dest. 100·0.
S. Wie vorher.
1733. Aq. chlori,
Aq. dest. aa. 50·0.
S. Wie vorher.
1734. Jodoform pulv. 5·0.
S. Streupulver.
1735. Atropin. sulf. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

Bei peripher sitzenden, tiefen Geschwüren, ebenso bei ausgedehnten Geschwüren, bei Erweichung, bei periph. Prolapsus iridis Meidung von Atropin, dagegen.

1736. Eserini sulf. 0·05,
Aq. dest. 10·0.
S. Augentropfen.

Ulcus cruris vide: Ulcera.

Ulcus ventriculi, rundes Magengeschwür.

Symptomatische Behandlung d. Magenblutungen (vide: Haematemesis), dabei ist jedwede Nahrung zu verbieten. Nach Sistirung der Magenblutungen kalte Milch in kleinen, häufig zu wiederholenden Quantitäten, welche successive zu steigern sind. Später durch Woch. nur flüss. Nahrung. Ausschaltung der Magenernährung und Ersatz derselb. durch Nährklysmen. Hiezu wird ein Gemenge von 125 Grm. Milch, 125 Grm. Wein, 1—2 Eidottern, einer Messerspitze Kochsalz, 1 Kaffeelöffel Pepton. siccum verwendet, welchem ein kleines Stückchen Traubenzucker und 8—10 Tropfen Tinct. opii spl. zugefügt werden. 3—4 Nährklystiere mittelst gewöhnlicher Klystierspritze u. weichen Darmrohrs in Pausen von 4—5 Stunden p. die. Vorher stets ein Reinigungsklystier. Narcotica gegen die cardialgischen Anfälle und gegen d. hartnäckige Erbrechen; gegen letzteres auch Eispillen; gegen Flatulenz Carminativa; später leichte Kost, weiche Eier, gehacktes Fleisch. Karlsbad, Marienbad, Giesshübler; zur Heilung d. Geschwürs Bismuth oder Chloralhydrat zu empfehlen.

1737. Magist. Bism. 1·0,
Laudan. pur. 0·10,
Sacch. alb. 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh, Mittags u. Abends 1 Pulver.

1738. Magist. Bism. 1·0,
Extr. Belladonn. 0·10,
Elaeosacch. Anisi 3·0.
M. f. p. div. in dos. = 10.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

In neuerer Zeit wird die Behandl. mit grossen Bismuthdosen (10 Grm. pro die u. mehr) empfohl.

Sind gleichzeitig heftige Schmerzen zugegen: subcutane Morphium-Injectionen oder:

1739. Mur. Morphii 0·10,
Aq. Laurocer. 10·0.
S. 5—10 Tropfen.

1740. Codeïn pur. 0·15,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. 3—4mal tägl. 1 Pulver.

1741. Cocain. hydrochl. 0·1,
Aq. amygd. amar. 10·0.
S. 10 Tropfen mehrm. tägl.

1742. Orthoform 0·5—1·0.
D. tal. dos. Nr. VI.
S. 1—2 Pulver zu nehmen.

1743. Argent. nitr. 0·2,
Mucilag. Salep. 160·0,
Extr. op. aq. 0·1,
Syrup. Diacod. 30·0.
D. ad vitr. nigr.
S. 4mal tgl. 1 Esslöff. voll.

Gegen heftige Diarrhoen:

1744. Tannini pur. 0·50,
Opii pur. 0·15,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. div. in dos. = 5.
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

Uraemia, Harnvergiftung.

Steigerung d. Diurese u. Ableitungen geg. d. Haut (vide: Morbus Brightii), äuss. Diaphorese (heiss. Bäder od. Einpackungen, subcut. Injection von Pilocarpin); bei ausbleibender Wirkung Laxantien (Calomel, Fol. Sennae, Coloquinthen). Bei urämischen Convulsionen, besonders bei kräftigen Erwachsenen, Venaesection, bei weniger Kräftigen warmes Bad mit kaltem Uebergiessen des Kopfes. Klysmen m. Chloralhydrat (3 Gr.)

Urticaria, Nesselausschl.

Berücksichtigung des Causalmomentes, Sodabäder, Alaunbad

kalte Bäder u. Douchen, zuweilen Amylum. Bei hartnäckig. Formen Atropin innerlich.

1745. Menthol. 0·4,
Solve in
Spirit. vin. Cognac. 25·0,
adde Tr. Chin. compos. 15·0.
MDS. 3maltägl. 15 Tropfen (in Rothwein).

1746. Solut. Natr. phosph. concentrat. 30·0.
S. 3stündlich 4—5 Grm. in Zuckerwasser.

Ausserdem Essigwaschungen, Einpudern der Haut mit Amylum.

Gegen d. Jucken Abwaschung mit kaltem Wasser, spirituösen Flüssigkeiten. Hernach Einstreuen mit Puder.

1747. Spir. vin. Gall. 100·0.
S. Zum Betupfen der juckenden Theile.

1748. Acid. acet. 5·0,
Spir. vin. 200·0.
S. Aeusserlich.

1749. Natr. salicyl. 5·0,
Pulv. Oryzae 20·0.
S. Streupulver.

Bei U. chronica empfiehlt G. Singer den internen Gebrauch von Menthol (0·6—1·0 pro die in Gelatinekapseln).

Uterusblutungen vide: Metrorrhagie.

Vaginismus.

Beseitigung localer Erkrankungsformen (anatomische Anomalien oder patholog. Processe), method. Erweiterung v. Stenosen. Behandl. von Entzündungs- oder Geschwürsformen, lauwarme Sitzbäder, Eisen, Bromkali etc.

1750. Cocaini mur. 1·0,
Aq. dest. 3·0,
Spir. vini rect. 2·0.
S. Zum Bepinseln.

Zuweilen Bepinselung m. schwacher Lapislösung (1 : 50), Carbolsäurelösung od. Jodoformin-persion erfolgreich.

Vaginitis vide: Fluor albus.

Varices, Krampfadern.

Einwickelung mit Flanell- oder elast. Gummibinden, Tragen von elast. Strümpfen. Bei Ekzembildung siehe Ekzem.

Variola, Blattern.

Prophylaktisch Vaccination u. Revaccination. Isolirung des Patienten. Desinfection. Behandl. rein exspectativ; strenge Diät; gegen d. Fieber kalte od. Eisumschläge, Regelung des Stuhles; rechtzeitige Behandl. d. Complicationen; bei bedeutender Spannung der Haut Einreibung oder Bepinseln mit Oel oder Einhüllung mit in verdünntes Glycerin (1 : 2 Wasser) getauchten Leinwandlappen; bei Nachlass des Fiebers laue Vollbäder. Die holländische Methode d. Pockenbehandlung besteht in der Ausschliessung d. chemisch. Strahlen des Tageslichtes, zu welchem Zwecke die Fenster mit dunkelrothem Glas versehen oder mit dicken roth. Teppichen behangen werden; desgleichen sollen Lampenglocken und Cylinder roth sein. Auf diese Weise ist das Tageslicht ohne Unterbrechung abzuhalten, bis die Blasen eingetrocknet sind, wodurch Suppuration vermieden wird. — Gegen die nach Variola verrucosa im Gesicht zurückbleibenden warzigen Knötchen Bepinseln m. Jodtinctur. Bei Schlaflosigkeit Sulfonal, Chloralhydrat u. dgl. Vgl. Insomnia

1751. Succi Citri,
Syr. rub. Id. aa. 15·0.
S. Zusatz zum Geträn

1752. Acid. salicyl. 3·0,
Amyl. p. 30·0.
Glycerin. 70·0.
S. Aeusserlich. Zur Einreibung des Rumpfes und der Extremitäten. — Für Gesicht und Hals ist das Glycerin durch Ol. amygdalar. zu ersetzen u. d. Paste d. eine Larve zu fixiren.

Auch Waschungen mit Chlorwasser, Bepinsel. mit Jodtinctur, 10%iger Lapislös. etc. empfohlen.

Als den Pockeninhalt rascher coagulirend und tiefere Narbenbildung verhütend wird von Zuelzer das Xylol empfohlen:

1753. Xylol. pur. 30·0.
S. 2—3stündl. 5—20 Tropf. in Rothwein.

Verbrennung vide: Combustio.

Verruca, Warze.

Abrasio im Niveau der Haut. Aetzung der Stelle mit:

1754. Acid. nitr. fumant. 5·0.
Dtr. ad vitr. epistom. vitr. claus.
S. Aeusserlich.

Wiederholte Aetzung ohne Abtragung mit:

1755. Acid. carbol. liquef. 5·0.
S. Aeusserlich.

1756 Acid. arsenic. 2·0—3·0,
Ung. ciner. 50·0.
S. Salbe. — Auf Mull aufgestrichen, auf die Warze aufzulegen und durch Binde zu fixiren. Die Salbe ist fortzulassen, sobald Excoriationen entstehen (Altschul).

Schutz der gesunden Umgebung durch Baumwolle, Traumaticin etc.

Vertigo, Schwindel.

Behandlung der Grundkrankheit (Centralnerven- oder Unterleibsorgane).

Bei Vertigo nervosa:

1757. Tinct. Valerian.
Elixir. acid. Haller. aa. 10·0.
S. 2stündl. 10—20 Tropfen in Zuckerwasser.

Bei Unterleibsträgheit:

1758. Resina Guajac. 5·0,
Sulf. depur.
Tart. depur. aa. 20·0,
Elaeosacch. Citri 10·0.
M. f. p. S. Morgens und Abends 1 Theelöffel voll.

Bei Ohrschwindel (Menière'sche Labyrintherkrankung) empfiehlt Charcot starke Chinindosen (0·6—0·8 pro die in Pillen zu 0·1) Nach 8—14 Tagen ebensolange Pause, hierauf Fortsetzung der Medication.

1759. Natrii salicyl. 0·2.
D. tal. dos. Nr. XX.
S. 3 Pulver täglich.
Pilocarpin-Injectionen (0·002—0·02).

Vitium cordis, Herzfehler.

Symptomatische Behandlung; Vermeidung übermässiger Bewegung und aller Aufregungen; nur seltene laue Bäder; Regelung d. Stuhlgangs. Im Stadium der Compensation diätetische Behandlung; Mechanotherapie (Apparatotherapie) unter entsprechender ärztlicher Leitung; Vermeidung von körperlichen und geistigen Ueberanstrengungen; Diät: Fleisch, Milch, Eier; Bier und leichter Wein in sehr geringen Quantitäten gestattet, Gewürze, starker Kaffee u. Thee, viel Rauchen verbot. Winter-Aufenthalt im Süden, zur Sommerszeit in waldigen, nicht zu gebirgigen Gegenden. Bei anämischen Kranken leichte Eisenpräparate, bei Plethorischen Molken- und Traubencuren, Sorge für Stuhlentleerung. Bei Störung der Compensation (Herzklopfen

Arhythmie) Kälte auf die Herzgegend, leichte Diuretica, Digitalis.

1760. Inf. fol. Dig. purp. e 1·0 ad 150·0
Syrup. rub. Idaei 15·0.
S. Jede 2. Stunde 1 Essl.

1761. Pulv. folior. digit. 0·05, Extr. et succ. liquir. q. s. f. dent. tal. pil. Nr. XX. [pil.
S. Täglich 6—10 Pillen.

1762. Tr. Digital.
Tr. Valerian. aa. 4·0.
Tr. ferr. acet. 6·0.
S. 3mal täglich 25 Tropfen.

1763. Fol. Digital. pulv.
Bulb. Scillae pulv. aa. 1·5.
Extr. Hyoscyam. 2·5.
M. f. pil. Nr. XXV. Consp. pulv. Lycopod.
S. 2 Pillen täglich.

1764. Digitoxin cryst. Merck [0·01,
Alcohol. 10·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zum Klysma. (3mal, später 2mal, schliesslich 1mal täglich je 10 Grm., hievon auf ein 100 Grm. Wasser enthaltendes, lauwarmes Klysma.)

1765. Digitalin. pur. 0·02,
Aq. dest. 15·0,
Alcohol. 5·0.
S. 1/5—1 Pravaz-Spritze zu injiciren. (Vorsicht!)

Statt Digitalis:

1766. Tinct. Strophant. hisp. 20·0
S. 3mal tgl. 5—20 Tropf.

1767. Coffeini citr. (oder *natrobenzoicum*) *1—2 0,*
Sacch. alb. 3·0.
Div. in dos. = 5.
S. Tagsüber zu nehmen.

1768. Coffein. natro-benz. 0·20,
Dentur tal. dos. = 10.
S. 4—8 Pulv. täglich.

1769. Inf. Convallar. maj. e 5·0 ad 150·0.
Syr. simpl. 20·0.
S. 2ständl. 1 Esslöffel.
Ebenso: *Inf. Adonid. vernal.*

1770. Tinct. Convallar. maj. (od. *Tr. Adonidis*) *10·0.*
S. 10 Tropfen 4mal tgl.

1771. Sparteini sulf. 0·30.
Aq. dest. 300·0.
Syr. cort. aur. 30·0.
S. 1 Essl. 3—4 mal tagl.

Bei schwachem Pulse, beschleunigter Herzthätigkeit und Cyanose eines der genannten Mittel, auch:

1772. Digitalisdialysat. 20·0.
S. 20-30-40 Tropfen tägl.

1773. Inf. fol. Digit. purpur. e 0·7 ad 150·0,
Spir. Aether. nitric. 2·0,
Oxymell. Scill. 20·0.
S. 3ständl. 1 Essl.

Bei Bronchialcatarrh:

1774. Chinini sulf. 0·50,
Sulf. aurunt. Antim.,
Flor. Benzoës aa. 0·20,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. dic. in dos. = 5
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

1775. Chinini sulf. 1·0,
Morph. muriat. 0·05,
Sacch. alb. 2·0.
M. f. p. dic. in dos. = 10.
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

Gegen asthmatische Anfälle als Folge von Herzfehlern:

1776. Tct. Lobel. infl. 10·0.
S. Ständl. 10—15 Tropfen.

1777. Aq. Lauroc. 10·0,
Tinct. Digitalis.
Tinct. Lobel. infl. aa. 5·0.
S. Ständl. 4—5 Tropfen.

Bei Erscheinungen von Lungenödem s. Oedema pulmonum.

Bei Oedemen und Albuminurie neben Giesshübler, Salvator, Selterswasser:

1778. Dec. rad. Ononid. spin. e 10·0 ad 200·0,
Liq. Kal. acet.,
Roob Junip. aa. 20·0.
S. 2ständl. 1 Essl.

1779. Diuretin Knoll 5·0—8·0,
Aq. dest. 100·0.
Syr. simpl. 20·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel.
1780. Theobromin. cryst. 0·3 bis 0·5.
D. tal. dos. Nr. 10.
S. Tägl. 6—10 Pulver zu n
1781. Uropherin. salicyl. 10·0,
Aq. dest. 120·0,
Vanillin. 0·001,
Syr. gummos. 30·0.
DS. 3—4mal tägl. 1 Esslöff.
Vide: Ascites.

Volvulus, Darmverschluss,

vide: Ileus.

Vulnus contusum, conquassatum, Quetschwunde.

Sorgfaltige Reinigung der Wunde, am besten durch Irrigation. Passende Lagerung (bei Extremitäten Elevation) und entsprechenden Verband.

Auf die blos gequetschten, nicht wunden Stellen einfache Umschläge.

Beim Jodoformverband wird gepulvertes Jodoform direct oder mittelst Streubüchse, resp. Pulverbläser in florähnl. Schichte aufgestreut; bequemer ist die Anwendung von 30—50% Jodoformgaze (derzeit in jeder Apotheke erhältlich), darüber, um Schorfbildung zu vermeiden, ein die 4—8fach gefaltete Gaze allseitig überragendes Stück impermeablen Stoffes (Billroth-Batist, Guttaperchapapier), als äusserste Schichte den Deckverband (Watte, Holzwolle und Binde oder Tuch). Für Hohlgänge eignen sich die Jodoformstäbchen. Die Desodorirung des Jodoforms findet durch Toncabohne, Cumarin oder Oleum Bergamotti, Menthae pip. etc. statt. Auch Carbolsäure 1·05 : 10·0 Jodoform wirkt desodorirend. Ebenso wie Jodoform finden Dermatol, Airol, Nosophen, Xeroform u. A. Verwendung.

1782. Acid. carbol.,
Spir. vin. conc. aa. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1783. Merc. corr. 0·50,
Aq. dest. 500·0.
S. Sublimatlösung (1 pro Mille).
1784. Merc. subl. corr.,
Natr. chlor. aa. 0·50,
Aq. fontis 500·0.
S. Aeusserlich (wie oben).
1785. Merc. subl. corr. 0·50,
Acid. tartar. 2·50,
Aq. destill. 500·0.
S. Saure Sublimatlösung (Laplace).
1786. Creolin. 4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1787. Calcar. chlor. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1788. Aq. Chlori,
Aq. dest. aa. 100·0.
S. Aeusserlich.
1789. Acid. carbol. 5·0,
Ol. olivar. 50·0.
S. Zum Verband.
1790. Acid. salicyl. 2·0,
Ung. emoll. 30·0.
S. Salbe.
1791. Kal. caust. 0·50,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1792. Acid. salicyl. 5·0,
Aq. dest. cum panx. Spir. vin. 200·0.
S. Zum Verband.
1793. Aq. Calcis 500·0.
S. Zum Abspülen.
1794. Jodoformi pur.,
Fabn Toncae desod. 50·0
S. Streupulver.
1795. Airol 10·0.
S. Streupulver.

1796. Airol,
Mucilag. gummi arab.,
Glycerin aa. 10·0,
Bol. alb. 20·0.
M. f. pasta.
S. Airolpasta (zum Occlusionsverband nach Bruns bei genähten Wunden. Mit einem Spatel in ziemlich dicker Lage aufzutragen, darüb. eine dünne Schichte Watte).
1797. Jodoform. pur. 50·0,
Ol. Bergamott. ytts. 5.
S. Streupulver.
1798. Jodoform. 10·0.
Butyr. Cacao 20·0,
Ol. Amygdal. q. s.
Fiant bacilli.
S. Jodoformstäbchen.
1799. Jodoform. 1·0.
Vaselini 15·0.
S. Salbe.
1800. Jodoform. 5·0,
Glycerini 40·0,
Aq. dest. 10·0,
Gumm. Tragacanth. 0·30.
F. Emulsio.
S. Zum Verband.

Vulnus scissum et lacerum,

Schnitt- u. Risswunde.

Reinigung der Wunde mit Carbol-, Thymol-, Sublimat- oder Chlorzinklösung; Vereinigung derselben. Antiseptischer Verband. (Bei kleinen Schnittwunden Heftpflasterverband.)

1801. Acid. carbol. 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 2½%ige Carbols. (zur Reinigung der Wunde).
1802. Creolin 4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. 2% Creolinlösung.
1803. Thymol. (oder Rotterin) 0·50,
Aq. dest. fervidae 500·0.
S. Aeusserlich. (½%)
1804. Acid. salicyl. 1·0,
Aq. dest. 400·0.
S. Salicylsäure (¼%ige).
1805. M. subl. corr. 0·50.
Aq. dest. 500·0.
S. Sublimatlösung (1 pro Mille).
1806. Bromoform. 0·54.
Aq. dest. 500·0.
S. Aeusserlich.
1807. Zinci chlorat. 5·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Verband. (1%ige Chlorzinklösung; kann bis 5% gesteigert werden.)

Bei granulirenden Wunden ein Verbandmittel:

1808. Glycerini 20·0,
Aq. dest. 50·0.
S. Aeusserlich.
1809. Kal. chlorici 5·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Aeusserlich.
1810. Kal. hyperm. 0·5,
Aq. dest. 200·0.
S. Verbandwasser.
1811. Aq. Plumb. 300·0,
S. Verbandwasser.

Bei granulirenden, leicht zerfallenden, allenfalls graulich belegten Wundflächen:

1812. Alum. crud. 10·0,
Plumb. ac. 20·0,
Aq. dest. 200·0.
Filtr. S. Starke Lösung.
1813. Alum. crud. 10·0,
Plumb. acet. 20·0,
Aq. dest. 400·0.
Filtr. S. Schwache Lösung (d. essigsauren Thonerde).
1814. Oxyd. Zinc. 5·0,
Vaselini 50·0.
S. Salbe.
1815. Argent. nitr. 0·10,
Axung. Porc. 50·0.
S. Salbe.
1816. Acid. boruc. pulv.
Paraffini,
Cerae alb. aa. 3·0,
Ol. amygdal. 20·0
S. Salbe. (Borsä

Bei unreinen, allenfalls gangränös Wunden, z. Ausspritzen jauchend. Höhlen, Chlorkalklösung oder:
1817. Aq. Chlori 50·0,
Aq. dest. 500·0.
S. Aeusserlich.
1818. Ac. carbol. 10·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Carbollösung (5%).

Vulvitis.

Behandl. der gleichzeit. Anämie, Scrophulose etc. Antisept. Ausspritzung m. 2% Carbol-, 1% Creolin- und 1/2% Sublimatlösung.
1819. Zinc. sulf. 4·0,
Aq. dest. 200·0.
S. Zum Ausspritzen.
1820 Jodoform. p. 1·0,
Natron bicarb. p.
Pulv. Oryzae aa. 10·0.
S. Zum Einstauben.

Wanderniere

vide: Renmobilis.

Wehenschwäche

vide: Metrakinesis.

Wuthkrankheit

vide: Lyssa.

Zahnkrankheiten

vide: Odontalgie.

2. Anhang.

a) Zu subcutanen Injectionen gebräuchliche Medicamente und ihre Dosirung.

Die dem Eingeklammerten vorangehenden Zahlen bedeuten Cubikcentimeter, das Eingeklammerte selbst die Menge der in einer 1 Ccm.-Spritze enthaltenen Substanz in Grammen.

Acidum carbolicum 3 : 100 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·015—0·03) und darüber, besonders als örtliches Antisepticum bei infectiösen Hautentzündung., Neuritid., Neuralgien und zu parenchymatösen Injectionen in Tumoren u. s. w.
Acidum perosmicum, Ueberosmiumsäure 1 : 100 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·005—0·01) als Antineuralgicum local. (Ad vitrum fuscum zu verschreiben.)
Actol (milchsaures Silber), in staubförmiger Schicht — etwa 1 Grm. — bei Ulcus contagios.
Aether rein (bei Collapszuständen) 0·5 *und darüber.*
Antipyrinum (als Antipyreticum und zur localen Analgesirung) in gleichen Mengen heissen Wassers gelöst; pro dosi 1·0—2·0 (= 0·5—1·0); schmerzhaft.
Apomorphinum hydrochloricum als Emeticum 1 : 100 Aq. dest. — pro dosi, bei Erwachsenen 0·5—1·0 (= 0·005—0·01); bei Kindern im ersten Lebensjahre 0·15 (= 0·0015), bei etwas älteren Kindern 0·3 (= 0·003).
Argentum subsulfurosum (bei Tabes): Arg. chlorati recenter praecipitati 0·1, Natrii subsulfurosi 0·6, Aq. dest. 20·0; pro dosi 0·5 - 1·0.
Aristol (bei Tuberculose, Nadaud): 1 : 100 Ol. olivarum, filtra; pro dosi 1 Ccm.
Atropinum sulfuricum 1 : 500. Aq. dest. — pro dosi 0·2—0·5 (= 0·0004—0·001).

Camphora (als Excitans) am besten in Form des ***Spiritus camphoratus*** oder ***Oleum camphoratum;*** von beiden pro dosi 1·0—2·0 (= 0·1—0·2).

Chininum bisulfuricum, hydrobromicum, hydrochloricum (die zur subcutanen Injection empfehlenswerthesten Chininsalze; nicht sulfuricum!) 1 : aa. 5 Glycerin und Wasser — pro dosi 1·0 (= 0·1) und darüber.

Chloralum hydratum (subcutane Injection nicht zweckmässig!) 1 : 2 Aq. dest. — pro dosi bei Erwachsenen 1·0—4·0 (= 0·33—1·3); bei Kindern im ersten Lebensjahre 0·6 (= 0·2), bei etwas älteren Kindern 1·0 (= 0·33). Auch Chloralhydrat mit Morphium (Chlorali hydrati 5·0, Morph. hydrochlor. 0·25, Aq. dest. 25·0); pro dos. 1·0 und darüber.

Cocainum hydrochloricum 1 : 20 Aq. dest. — pro dosi 0·2—1·0 (= 0·01—0·05) bei Neuralgien und Hyperästhesien.

Codeinum phosphoricum solubile 1 : 10 Aq. dest. — pro dosi 0·2—0·5 (= 0·02—0·05) als Hypnoticum.

Coffeinum purum, citricum, hydrobromicum; besser in Form von ***Coffeino-Natrium benzoic.*** u. ***salicylic.*** 1 : 5 Aq. dest. pro dosi 0·2—1·0 (= 0·1—0·2) bei Migraine etc.

Colchicinum 1 : 1000 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·0005—0·001), bei Neuralgien.

Convallamarinum (Merck) 1 : 100 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·005—0·01). Unsicher.

Curare 1 : aa. 50 Glycerin und Wasser — pro dosi 0·5—5·0 (= *0·01—0·05*). Unsicher.

Daturinum = Hyoscyaminum cryst.

Digitalinum amorphum (höchst ungleich, nicht zu empfehlen!) 1 : aa. 50 Spir. und Wasser; pro dosi 0·1—0·3 (= 0·001—0·003).

Duboisinum sulfuricum 1 : 500 Aq. dest. — pro dosi 0·1—0·2 (= 0·0002—0·0004).

Erythrophlaeinum (local analgesirend?) 1 : 100 Aq. dest. — pro dosi 0·25—0·5 (= 0·0025—0·005).

Extractum Secalis cornuti (am besten nach Vorschrift der neuen Ph. germ. bereitet). 1 : aa. 5 Glycerin und Wasser — pro dosi 1·0—2·0 (= 0·1—0·2).

Ferrum pyrophosphoricum cum Natrio citrico (bestes Eisenpräparat für subcutane Injection!) 1 : 6 Aq. dest. — pro dosi 1·0 und darüber. — Ebenso auch ***F. pyrophosph. cum Ammonio citrico.***

Hydrargyrum bichloratum 1 : 100 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·005—0·01). — Ebenso *v. Bamberger's* ***Quecksilberpeptonattösung*** (1 Ccm = 0·01 Sublimat) und ***Hydrargyrum cyanatum.***

Hydrargyrum formamidatum solutum, Lösung im Verhältniss von 1 : 100; davon 1·0 pro dosi (= 0·01 Quecksilberoxyd).

Hydrargyrum sozojodolicum (Hydr. sozojodol. 0·8, Kalii jodati 1·6, Aq. dest. 10·0; pro dosi 1·0 (= 0·08). Bei Lues.

Hydrargyrum thymolaceticum (Hydr. thymol. 0·75, Paraffini liquidi 10·0, tere exactissime. Alle 7—10 Tage eine Spritze intramusculär in der Glutäalgegend). Von Tranjen bei Phthisis empfohlen.

Hydrastininum hydrochloricum 1 : 10 Aq. dest., pro dosi 0·5 bis 1·0 (= 0·05—0·1), bei Uterinblutungen.

Hyoscyaminum amorphum Atrop. sulfuricum (unsiche
— ***Hyoscyaminum*** Merck ebenso.

Hyoscinum hydrojodicum 1:500 Aq. dest. — pro dosi 0·2—0·5 (= 0·0004—0·001) bei Tremor, Paralysis agitans u. s. w.

Kali cantharidinicum (0·2 Cantharidin, 0·4 Kalihydrat: 1000·0 Wasser); davon 0·5—1·0 pro dosi (= 0·0001—0·0002) nach Liebreich gegen Tuberculose und Lupus.

Liquor Kalii arsenicosi 1:5 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·1—0·2) bei Psoriasis, bei Chorea, Tremor und anderen Neurosen.

Morphinum hydrochloricum in sterilisirten Lösungen von 1:50 Aq. dest.; pro dosi 0·5—1·5 = 0·01—0·03; oder frisch bereitete Auflösung der Hypodermic disks mit 0·01 Morphium. — Auch mit Atrop. sulf. zusammen (0·01 Morph. hydrochlor. auf 0·001 Atrop. sulf.).

Morphinum sulfuricum 1:20—50 Aq. dest. — Dosis wie bei dem vorigen.

Natrium chloratum (zur »Hypodermoklyse« bei Cholera); nach Samuel 6·0 Natr. chlor., 1·0 Natr. carb. zu 1 Liter Wasser; nach Cantani 4·0 Natr. chlor., 3·0 Natr. carb. zu 1 Liter Wasser.

Nirvanin subcutan und submucös in 2%igen Lösungen (neuestens bei Zahnschmerz empfohlen).

Oleum camphoratum 0·1—1·0 pro dosi (neuerdings bei Phthisis empfohlen).

Physostigminum salicylicum 1:500 Aq. dest. — pro dosi 0·2—0·5 (= 0·0004—0·001). — Ebenso *P. hydrochloricum* und *sulfuricum*.

Pilocarpinum hydrochloricum 1:500 Aq. dest. — pro dosi 1·0—2·0 (= 0·02—0·04).

Piperazinum 1:10 Aq. dest., wovon 1·0 (= 0·1) pro dosi.

Scopolaminum hydrojodicum (und *hydrobromicum*) = Hyoscinum.

Sparteinum sulfuricum (Digitalis-ähnlich); 1:50 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·001 bis 0·02) und darüber.

Sperminum (Poehl) in 2% Lösung; 0·5—1·0 pro dosi.

Spiritus aethereus — wie Aether.

Strychninum nitricum 1:100 Aq. dest. — pro dosi 0·3—1·0 (= 0·003—0·01) — Ebenso *S. sulfuricum*.

Thiosinaminum. 15—20% alkoholische Lösung; 0·2—0·8 pro dosi (bei Lupus, Hebra).

Tinctura Cannabis indicae (rein) pro dosi 0·2—0·5.

Veratrinum 1:100 Spir. dil. — pro dos. 0·2—0·5 (= 0·002 bis 0·005) unzweckmässig.

b) Zu *Inhalationen gebräuchliche Medicamente und ihre Dosirung.*

Zu Inhalationen sind Zerstäubungsapparate mit Dampfbildung nach dem Systeme Siegle oder solche ohne Dampf mit Doppelgebläse nach Schnitzler zumeist gebräuchlich. Die nachfolgende Dosirung ist mit Rücksicht auf den letzteren Apparat berechnet; bei dem Siegle'schen Apparat muss die Dosis doppelt so stark genommen werden.

Acid. benzoicum 0·5—1·0 : 10 *Spir. vin.*

Acid. carbol. 0·5—1:100 Aq. dest.

Acid. lacticum 1—2 : 100.

Acid. tannicum 1—2 : 100 Aq. dest. Glycerin.

Amylnitrit 2—5 Tropfen auf ein Taschentuch.

Alumen crud. 2—3 : 100.
Ammon. dep. 0·3—1·0 : 100 Aq.
Aqua Calcis und Aq. destill. aa. p. aeq.
Aqua Creosoti 1—5 : 100 Aq.
Aqua Picis 1—20 : 100 Aq.
Aqua Chlori und Aq. destill. aa. p. aeq.
Aqua Laurocer. 3—5 : 100.
Argent. nitr. 0·1—02 100.
Borax venet. 3—5 : 100.
Bromum mit Kali bromat. aa. 0·2 : 100.
Chininum sulf. 0·5 : 100.
Chinin. tannicum 0·02—0·1 : 100.
Cocainum mur. 0·50 : 250.
Emuls. amygdal. oder oleos. etc. 5 : 100.
Extr. Bellad. 0·01—0·05 : 100.
Extr. conii 0·04—0·15 : 100.
Extr. Hyoscyami 0·05—0·20 : 100.
Extr. Opii aq. 0·1—0·2 : 100.
Glycerini pur. 10 : 100 oder unverdünnt.
Kal. bromat. 3·0 : 100.
Kal. carb. dep. 0·20—3·0 : 100 Aq.
Kal. chlor. 3—5 : 100.
Kal. hypermang. 0·1—0·2 : 100.
Kal. jodati 1—2 und Jodi pur. 0·02 : 100.
Kreosot. gtts. 2 : 1.
Lithium carb. 0·2—2·0 : 100.
Morphii mur. 0·1 : 100.
Natr. benzoicum 1·0—2·0 : 100.
Natr. bicarb. 3—5 : 100.
Natr. carb. dep. 0·20–2·0 : 100 Aq.
Natr. chlorat. 0·30—3·0 : 100 Aq.
Natr. hydrochl. 0·2—2·0 : 100.
Plumb. ac. bas. s. 3—5 : 100.
Tannini pur. 1—2·0 : 100.
Tinct. cannabis Ind. 0·5–1·0 : 100.
Tinct. Jodi 0·10 und Spir. vini 10·0 : 100.
Tinct. opii simpl. 0·2—0·5 : 100.

Andere Inhalationsmittel:

Ferner eignen sich zur Inhalationstherapie verschiedene Mineralwässer, weiters Infuse oder Decocte der Spec. emoll.: Althea, Glycyrrhiz. oder Flor. Malvae 1·0 : 100, sodann Inf. fol. Hyosc. e 0·5 bis 0·1 ad 100·0, Stramonii e 0·2—0·5 ad 100·0, Belladonn. e 0·1—0·2 ad 100·0, Inf. flor. Sambucc. oder Tiliae e 5·0—25·0 : 500.

Die bei Wärme sich leicht verflüchtigenden Medicamente, wie Ol. Pini, Ol. Terebinth. etc., eignen sich besser für den Siegle'schen Apparat; können übrigens auch ohne jeden Apparat eingeathmet werden, wenn man von diesem Medicament 10 bis 20 Tropfen in einen beliebigen Behälter in heisses Wasser gibt.

Aq. Picis 50·0. S. Tropfen zur Inhalation. Ol. Pini ebenso; ferner Ol. Eucalypti und Terebinth. allein oder mit Ol. Juniperi aa. part. aeq. oder 0·5—2·0 : 100 Aq.

c) Tropfen-Tabelle.

	Grm.	Tropf.
Acetum plumbi	1	= 16
Acidum aceticum . . .	1	= 16
Acidum hydrochlor. c. *(1·12 sp. Gew.)* . . .	1	= 13
Acidum hydrochloric. dilut. (1·06 sp. Gew.)	1	= 16
Acidum nitricum dilut. (1·13 sp. Gew.) . . .	1	= 16
Acidum phosphoricum (1·117 sp. Gew.) . .	1	= 16
Acidum sulfuris c. . .	1	= 12
Acidum sulfuris dilut. .	1	= 18
Aether	1	= 50
„ aceticus . . .	1	= 9
Alkohol. sulfuris . . .	1	=
Aqua destillata . . .	1	=

	Grm.	Tropf.
Aqua amygdalar. am.	1	= 16
Aquae spirituosae	1	= 25
Balsam. Copaivae	1	= 25
„ de Peru	1	= 16
Butyrum antimonii	1	= 12
Carboneum sulfureum	1	= 25
Chloroformium	1	= 25
Elixir. acid. Halleri	1	= 25
Kreosot	1	= 25
Liquor acidus Halleri	1	= 25
„ anodynus Hoffmanni.	1	= 25
„ ferri sesquichl.	1	= 12
„ hydrarg. nitrici	1	= 12
„ kalii arsenicosi	1	= 16
„ „ carbonici	1	= 16
„ „ caustici	1	= 16
„ stibii chlorati	1	= 12
Mucilago gummi arabici	1	= 12
Oleum amygd. am. aeth.	1	= 20
„ „ dulcium	1	= 20
„ anisi	1	= 25
„ aurantii flor.	1	= 25
„ bergamottae	1	= 25
„ cajeputi	1	= 25
„ carvi	1	= 25
„ caryophyllor.	1	= 20
„ cinnamomi	1	= 20
„ chamomillae	1	= 25

	Grm.	Tropf.
Oleum citri	1	= 25
„ crotonis	1	= 25
„ foeniculi	1	= 25
„ iuniperi	1	= 25
„ lavandulae	1	= 25
„ menthae	1	= 25
„ olivarum	1	= 20
„ origani	1	= 25
„ ricini	1	= 20
„ rosmarini	1	= 25
„ rosarum	1	= 25
„ sabinae	1	= 25
„ terebinthinae	1	= 25
Petroleum	1	= 25
Solutio arsenicalis Fowl.	1	= 16
Solutiones extr. narcot. (1 : 2)	1	= 37
Spiritus aethereus	1	= 25
„ ferri chlor. aeth.	1	= 25
„ muriatico aeth.	1	= 30
„ nitrico aeth.	1	= 30
„ vini conc.	1	= 40
„ „ dilutus	1	= 25
Stibium chlorat. solut.	1	= 12
Syrupi	1	= 12
Tincturae spirit.	1	= 25
Vinum stibiatum	1	= 20
„ Malaccense	1	= 20

3. Receptformeln für die Cassen- und Armen-Praxis.

(Die Zahl in Klammern gibt den Preis in Heilern öst. Währ. an.)

Analeptica.

Aether acet. 10·0.
S. 10—20 Trpf. in Wass. z. n.
(32)

Liqu. ammon. anis. 10·0.
S. 20 Tropfen in einer Tasse *heissen* Thee z. n.
(26)

Aether sulf. 10·0.
S. Eine Pravaz'sche Spritze voll zu injiciren.
(23)

Ol. camphorat. 10·0.
S. Wie d. V.
(28)

Camphor. 0·5,
Emuls. comm. ad 200·0.
S. Stündl. 1 Essl. voll z. n.
(93)

Camphorae 1·0,
Gummi arab. q. s. f. emuls. 100·0.
S. Für ein Klysma. (56)

Anthelmintica.

Flor. Kusso pulv. 20·0
ad scat.
S. Halbstündlich in 4 Portionen in Wasser, Wein oder Oblaten z. n.
(Bei Tänien.) *(50)*

Rad. filic. mar. pulv. 20·0
ad scatul.
S. Wie d. V. *(46)*

Cort. granati 50·0,
Natr. bicarb. 2·0,
Aq. commun. 1000·0.
Mac. p. h. XXIV.
Dein c. ad remau. 150·0.
S. Viertelstündlich ein Esslöffel voll z. n. *(197)*

Trochisci Santonini Nr. 10.
S. Morgens und Abends zwei Stück z. n.
D. ad. chart.
(Bei Oxyuren u. Ascariden.) *(32)*

Naphthalin. 2·0,
Ol. Sesami 48·0,
S. Zum Klystier.
(Bei Oxyuris der Kinder.) *(54)*

Flor. cinae 5·0,
Rad. Jalapae pulv. 1·0,
Syrup corr. aur. 25·0.
M. f. electuar.
S. Auf 3mal z. n.
(Bei Ascariden.) *(73)*

Antidiarrhoica und Adstringentia.

Tinct. opii simpl. 10·0.
S. 10 Tropfen m. m. tgl. z. n. *(34)*

Tinct. opii s. 5·0.
S. 10 Tropfen in ein Stärkemehlklystier. *(28)*

Pulv. Ipecac. opiat. 1·5.
Div. in dos. V.
S. 2—3 Pulver tgl. z. n. *(30)*

Rad. Salep r. t. 5·00.
D. ad chart.
S. Die Hälfte mit 1/4 Liter Wasser abzukochen und abgeseiht auf 3mal z. n. *(20)*

Rad. Ratanh. pulv. 10·0.
S. Wie d. V. *(40)*

Lign. Campechian. 10·0.
S. Auf 2 Schalen Thee. *(14)*

Rad. Colombo sc. 10·0.
S. Auf 2 Schalen Thee. *(18)*

Tannin. p. 5·0.
ad scat.
S. Messerspitzw. m. m. tgl. z. n. *(32)*

Bismuth. subnitr. 3·0,
Aq. font. ad 150·0.
S. Aufschütteln. 2stündlich 1 Esslöffel voll z. n. *(63)*

Antipyretica.

Natr. salicyl. 5·0,
Aq. font. ad 150·0.
S. 2stündl. 1 Essl. z. n. *(54)*

Chinin. sulf. 1·0.
Div. in dos. V.
S. 2stündl. 1 Pulv. z. n. *(37)*

Liqu. acid. Halleri 10·0.
S. 10 Tropfen in einem Glas Zuckerwasser z. n. *(26)*

Diaphoretica.

Flor. samb. od. flor. tiliae 20·0.
S. Thee auf 2 Tassen. *(20 resp. 22)*

Fol. Jaborandi 10·0.
S. Die Hälfte auf 1 Tasse Thee z. n. *(26)*

Pilocarpin. muriat. 0·05,
Aq. dest. 5·0.
S. 1/2—1 Spritze voll zur Injection.

Diuretica.

Infus. fol. Digital e 1·0 : 150·0 Col.
S. 2stündl. 1 Essl. voll z. n.
——— *(57)*

Tinct. Digital. 10·0.
S. 3mal tgl. 10 Trpf. z. n.
——— *(28)*

Infus. bulb. scillae 2·0 : 150·0
S. 2stündl. 1 Essl. voll z. n.
——— *(57)*

Decoct. rad. ononid. spin. 10·0 ad 180·0 Col.
Liq. kal. acet.
Oxymel. scill. aa. 10·0.
S. 2stündl. 1 Essl. voll z. n.
——— *(87)*

Calomel 1·0,
Sacch. 2·0.
Div. in dos. V.
S. 1—3 Pulver tgl. z. n.
——— *(29)*

Natr. salicyl. 10·0.
Div. in dos. X.
S. Tägl. 3—4 Pulver z. n.
(74)

Emetica.

Tartar. stibiat. 0·1,
Rad. Ipecac. pulv. 4·0.
Div. in dos. IV.
S. Viertelstündlich 1 Pulver, bis Erbrechen eintritt.
——— *(94)*

Infus. rad. Ipecac. e 4·0 : 180·0
Syrup. simpl 20·0.
S. ¼—½stündl. 1 Esslöffel voll z. n. *(105)*

Cupr. sulf. 1·0,
Aq. dest. ad 50·0.
S. Kaffeelöffelweise bis die Wirkung eintritt. *(40)*

———

Zinc. sulf. 2·0.
Aq. dest. ad 50·0.
Wie d. V. *(40)*

Apomorph. mur. 0·05,
Aq. dest. 5·0.
S. Zur subcutanen Injection (½—1 Spritze). *(60)*

Expectorantia.

Infus. rad. Ipecac. e 0·5 : 150·0 Col.
Morph. mur. 0·05
S. 2stündl. 1 Essl. z. n.
——— *(83)*

Infus. rad. seneg. e 10·0 : 150·0 Col.
Liqu. ammon. anisat. 5·00.
S. 2stündl. 1 Essl. z. n.
——— *(71)*

Liq. ammon. anisat. 5·00.
S. 3mal tägl. 10 Tropf z. n.
——— *(23)*

Ammonii chlorat. 1·8,
Stibii sulf. aurant. 0·18.
Div. in dos. VI.
S. 2—3 Pulver tgl. z. n
——— *(58)*

Aq. lauroceras. 10·0,
Apomorph. hydrochl.,
Morph. hydrochlor. aa 0·03.
Acid. mur dil. gtts. V,
D. in vitr. nigr.
S. 3mal tgl. 10 Trpfn. z. n.
——— *(78)*

Acid. benzoic,
Camphor. aa. 1·0,
Div. in dos. V. ad chart cerat.
S. 2—3stündl. 1 Pulv. z. n.
(64)

Haemostatica.

Infus. Secal. cornut. e 5·0 : 150·0
S. 1—2stündl 1 Essl. z. n.
——— *(59)*

Extr. secal. cornut. 1·0,
Aq. font. ad 100·0.
S. 1—2stündl. 1 Essl. voll z. n.
——— (54)

Ergotin. pur. 1·0,
Aq dest. 3·0.
S. 1 Spritze voll zu injiciren
(52)

Morph. mur. 0·1,
Atropin. sulf. 0·01,
Aq. dest. 10·0.
S. ½—1 Spritze zu injiciren.
(52)

Laxantia.

Ol. ricini 50·0.
S. 1—2stündl. 1 Essl. voll z. n.
——— *(38)*

Fol. sennae Tinn. sciss. 10·0
S. Auf 2 Tassen Thee.
——— *(17)*

Syrup. sennae c. manna 50·0.
S. Esslöffelw. z. n. *(43)*

———

Spec. laxant. St. Germain 10·0.
S. Wie d. V. *(26)*

———

Calomelan. 1·0,
Div. in dos. V.
S. 2 stündl. 1 Pulv. in Oblaten bis zur Wirkung z. n.
——— *(29)*

Rad. rhei 10·0,
Magnes. sulf. pulv. 15·0.
S. Messerspitzw. z. n.
——— *(83)*

Pilul. laxant. 5·0.
S. Abends 2—4 Stück z. n.
——— *(42)*

Podophyllin 0·5,
Sacch. 3·00.
Div. in dos. V.
S. 1—2 Pulv. tgl. in Obl. z. n.
——— *(59)*

Sal. therm. Carol. artef. crystall. 100·0,
ad chartam.
S. Künstliches Karlsbader Salz. Morgens 1—2 Kaffeelöffel in ¼ Liter warmen Wassers z. n. *(42)*

Nervina und Narcotica.

Morph. mur. 0·05,
Aq. lauroceras. 10·0.
S. 2stündl. 10 Tropfen z. n.
(49)

Morph. mur. 0·10,
Aq. dest. 5·0.
S. ½—1 Spritze voll subcutan.
——— *(43)*

Kal. bromat. pulv. 20·0
ad scat.
S. Messerspi·zw. in Zuckerwasser z. n. *(58)*

———

Chloral. hydrat. 2·0
ad chart.
S. In 1 Tasse Milch z. n.
——— *(18)*

Cocain. hydrochlor. 0·1,
Aq. font. 100·0.
S. Kaffeelöffelw. z. n.
——— *(51)*

Sulfonal. 2·0
ad chart.
S. 2 Stdn. vor dem Schlafengehen in 1 Tasse heissen Thees z. n.
——— *(38)*

Chinin. sulfur. 2·0,
Div. in dos. X.
S. 3 Pulv. tgl. in Oblaten z. n.
——— *(74)*

Sol. Fowleri 10·0.
3mal tgl. 5 Trpf., ansteigend.
(42)

Atropin. sulf. 0·02,
Aq. dest. 10·0.
S. ¼—½ Spritze subcutan.
——— *(48)*

Strychnin. nitr. 0·01,
Aq. dest. 10·0.
S. Wie d. V. *(42)*

Zinc. valerian. 0·18,
Sacch. 3·00.
Div. in dos. VI.
S. Tägl. 3 Pulver z. n.
——— *(58)*

Tinct. Valerian. aeth.,
Aq. amygdal. amar. conc. aa 10·0.
S. 3 mal tgl. 20 Tropfen z.
(42)

Roborantia.

Ferr. hydrooxydat. dialys. liqu. 20·0.
S. 3mal tgl. 15 Tropfen z. n.
(34)

Ferr. carbon. sacch. 20·0
ad scat.
S. Messerspitzw. z. n.
(70)

Tinct. malat. ferri 20·0
S. 3mal tgl. 20 Tropfen z. n.
(54)

Syrup. ferri jodat.,
Syrup. simpl. aa. 25·0.
S. 3mal tgl. ½ Theel. voll z. n.
(78)

Solut. arsen. Fowleri 10·0.
S. 3mal tgl. 5 Tropfen, bis 15 Tropfen steigend
(42)

Stomachica.

Acid. mur. dil. 20·0.
S. 10 Trpfn. in ½ Glas Wasser währ. d. Essens z. trink.
(26)

Natr. bicarbon.,
Magnes. carbon. aa. 10·0
ad scat.
S. Messerspitzweise nach dem Essen z. n.
(64)

Bismuth. subnitr. 3·0.
Div: in dos. VI.
S. Tgl. 2—3 Pulver z. n.
(54)

Pepsini 5·0
ad scat.
S. Eine kleine Messerspitze voll nach d. Essen z. n.
(52)

Pulv. rad. rhei 5·0,
Natr. bicarb 15·0
ad scat.
S. Messerspitzw. z. n.
(75)

Tinct. amar.,
— chinae comp. aa. 10·0.
S. 15—20 Tropfen mehrere Mal tgl. z. n.
(40)

Tinct. strychni,
Aq lauroc. aa. 5·0.
S. 10—15 Trpfn. m. M. tgl. z. n.
(27)

Resorcin. p. 2·0,
Aq. font. 180·0,
Syrup. simpl. 18·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel voll z. n.
(69)

4. Kurze Symptomatologie und Therapie der wichtigsten acuten Intoxicationen.

Allgemeines.

Der Verdacht einer acuten Vergiftung wird erweckt, wenn bei einer vorher ganz gesunden Person plötzlich auffallende und heftige Krankheitssymptome auftreten, wobei jedoch zu beachten ist, dass auch vorher kranke Personen vergiftet werden können, und dass andererseits auch gewisse Krankheiten bei vorher Gesunden und Kranken ähnliche acute und bedrohliche Erscheinungen *hervorzurufen* vermögen. Die verdächtigen Symptome gewinnen *an Beweiskraft*, wenn sie bald nach dem Genusse von Speisen *oder Getränken* oder Medicamenten auftreten, und zwar umso*mehr, wenn sie* bei mehreren Personen zugleich, eventuell auch *bei Hausthieren* sich einstellen. Für die Stellung der Diagnose *der Vergiftung* ist es wichtig, auf folgende Punkte besonders z

achten: Beschaffenheit der Haut, ob auffallend trocken oder feucht, ob ikterisch gefärbt, ob geröthet und mit Exanthemen bedeckt; Verhalten der Pupillen, ob reactionslos, ob auffallend eng oder weit; Beschaffenheit der Mundschleimhaut, ob angeätzt oder verfärbt; Geruch der Athemluft und eventuell des Erbrochenen; Beschaffenheit des Pulses; Geruch und Beschaffenheit des eventuell aus der Blase per Katheter zu entnehmenden Harnes, ob blut-, eiweiss- oder zuckerhaltig.

Die Therapie der acuten Vergiftungen hat einmal die prophylaktische Indication zu erfüllen, das noch nicht zur Wirkung gelangte Gift aus dem Körper zu entfernen, resp. seine Resorption zu verhindern. Dies geschieht bei Vergiftungen von Wunden aus durch Ausquetschen, Auswaschen oder Ausbrennen derselben, durch Abbinden und Immobilisiren des verletzten Gliedes, bei Vergiftungen vom Magen aus durch Brechmittel[1]) oder Aushebern des Magens mit der Schlundsonde und nachfolgende Auswaschung, die — zumal bei aufgehobener Schluckfähigkeit — vortheilhaft anstatt mit Wasser mit den als Antidota empfohlenen Lösungen oder Suspensionen vorgenommen wird. Bei Vergiftung mit ätzenden Giften (Mineralsäuren und Laugen) muss die Einführung der Sonde und die Auswaschung mit grösster Vorsicht geschehen, respective ganz unterbleiben. Die Entfernung des Giftes aus dem Darm wird durch Abführmittel (Drastica) oder durch Klysmen zu erzielen gesucht. Wenn schon Erbrechen und Durchfall bestehen, kommen nur die Magenausspülungen und Klysmen in Frage. — Zweitens hat die Therapie die durch Resorption des Giftes entstandenen Wirkungen zu paralysiren. Dies geschieht einmal durch Anwendung von speciellen Gegengiften (antidotarische Behandlung, und ferner durch symptomatische Bekämpfung der lebensgefährlichen Symptome, wie: Respirationsstörungen, Herzschwäche, Krämpfe u. s. w. Respirationslähmung erfordert die Einleitung künstlicher Athmung, Schwellung des Kehlkopfeinganges die Intubation oder Tracheotomie, Herzschwache (Collaps) die Anwendung physikalisch oder chemisch wirkender Analeptica. Solche sind: Warme Bäder mit kalten Uebergiessungen, Wärmflaschen, Bürsten und Frottiren der Haut, Sinapismen, Essigklystiere, rhythmische Stösse gegen die Herzgegend mit der flachen Hand, innere Darreichung von starkem Kaffee mit Cognac oder Rum, von Ammonium carbonicum (0·5 pro dosi in Selters), von Liquor Ammonii anisat.

---

[1]) Rp. *Pulv. rad. Ipecacuan. 2·0,*
Cupr. sulfur. 1·0,
Aqu. ad 60·0.
MDS. Alle 5—10 Min. 1 Esslöffel. Vor dem Gebr. umzuschütteln! (Für Kinder 1 Thee- bis 1 Kinderlöffel.)
Rp. *Sol. ut. Zinc. sulf. 1·0 : 60·0.*
DS. Alle 5—10 Min. 1 Essl.

Rp. *Apomorphin. hydrochlor. 0·05,*
Aqu. dest. ad 5·0,
D. in vitr. nigr.
S. Zur subcutanen Injection: $^1/_2$—1 Pravaz-Spritze zu injiciren. (Bei Kindern 1—3 Theilstriche der Spritze.)

Roborantia.

Ferr. hydrooxydat. dialys. liqu. 20·0.
S. 3mal tgl. 15 Tropfen z. n.
(34)

Ferr. carbon. sacch. 20·0
ad scat.
S. Messerspitzw. z. n.
(70)

Tinct. malat. ferri 20·0.
S. 3mal tgl. 20 Tropfen z. n.
(54)

Syrup. ferri jodat,
Syrup. simpl. aa. 25·0.
S. 3mal tgl. ½ Theel. voll z. n.
(78)

Solut. arsen. Fowleri 10·0.
S. 3mal tgl. 5 Tropfen, bis 15 Tropfen steigend
(42)

Stomachica.

Acid. mur. dil. 20·0.
S. 10 Trpfn. in ½ Glas Wasser währ. d. Essens z. trink.
(26)

Natr. bicarbon.,
Magnes. carbon. aa. 10·0
ad scat.
S. Messerspitzweise nach dem Essen z. n.
(64)

Bismuth. subnitr. 3·0.
Div. in dos. VI.
S. Tgl. 2—3 Pulver z. n.
(54)

Pepsini 5·0
ad scat.
S. Eine kleine Messerspitze voll nach d. Essen z. n.
(52)

Pulv. rad. rhei 5·0,
Natr. bicarb 15·0
ad scat.
S. Messerspitzw. z. n.
(75)

Tinct. amar.,
— chinae comp. aa. 10·0.
S. 15—20 Tropfen mehrere Mal tgl. z. n.
(40)

Tinct. strychni,
Aq lauroc. aa. 5·0.
S. 10—15 Trpfn. m. M. tgl. z. n.
(27)

Resorcin. p. 2·0,
Aq. font. 180·0,
Syrup. simpl. 18·0.
S. 2stündl. 1 Esslöffel voll z. n.
(69)

4. Kurze Symptomatologie und Therapie der wichtigsten acuten Intoxicationen.

Allgemeines.

Der Verdacht einer acuten Vergiftung wird erweckt, wenn bei einer vorher ganz gesunden Person plötzlich auffallende und heftige Krankheitssymptome auftreten, wobei jedoch zu beachten ist, dass auch vorher kranke Personen vergiftet werden können, und dass andererseits auch gewisse Krankheiten bei vorher Gesunden und Kranken ähnliche acute und bedrohliche Erscheinungen *hervorzurufen* vermögen. Die verdächtigen Symptome gewinnen *an Beweiskraft*, wenn sie bald nach dem Genusse von Speisen *oder Getränken* oder Medicamenten auftreten, und zwar umso*mehr, wenn sie* bei mehreren Personen zugleich, eventuell auch *bei Hausthieren* sich einstellen. Für die Stellung der Diagnose *der Vergiftung* ist es wichtig, auf folgende Punkte besonders z

ikten: Beschaffenheit der Haut, ob auffallend trocken oder ucht, ob ikterisch gefärbt, ob geröthet und mit Exanthemen edeckt; Verhalten der Pupillen, ob reactionslos, ob auffallend ng oder weit; Beschaffenheit der Mundschleimhaut, ob anätzt oder verfärbt; Geruch der Athemluft und eventuell des rbrochenen; Beschaffenheit des Pulses; Geruch und Beschaffenheit des eventuell aus der Blase per Katheter zu entnehmenden larnes, ob blut-, eiweiss- oder zuckerhaltig.

Die Therapie der acuten Vergiftungen hat einmal die prophylaktische Indication zu erfüllen, das noch nicht zur Wirkung gelangte Gift aus dem Körper zu entfernen, resp. seine Resorption zu verhindern. Dies geschieht bei Vergiftungen von Wunden aus durch Ausquetschen, Auswaschen oder Ausbrennen derselben, durch Abbinden und Immobilisiren des verletzten Gliedes, bei Vergiftungen vom Magen aus durch Brechmittel[1]) oder Aushebern des Magens mit der Schlundsonde und nachfolgende Auswaschung, die — zumal bei aufgehobener Schluckfähigkeit — vortheilhaft anstatt mit Wasser mit den als Antidota empfohlenen Lösungen oder Suspensionen vorgenommen wird. Bei Vergiftung mit ätzenden Giften (Mineralsäuren und Laugen) muss die Einführung der Sonde und die Auswaschung mit grösster Vorsicht geschehen, respective ganz unterbleiben. Die Entfernung des Giftes aus dem Darm wird durch Abführmittel (Drastica) oder durch Klysmen zu erzielen gesucht. Wenn schon Erbrechen und Durchfall bestehen, kommen nur die Magenausspülungen und Klysmen in Frage. — Zweitens hat die Therapie die durch Resorption des Giftes entstandenen Wirkungen zu paralysiren. Dies geschieht einmal durch Anwendung von speciellen Gegengiften (antidotarische Behandlung, und ferner durch symptomatische Bekämpfung der lebensgefährlichen Symptome, wie: Respirationsstörungen, Herzschwäche, Krämpfe u. s. w. Respirationslähmung erfordert die Einleitung künstlicher Athmung, Schwellung des Kehlkopfeinganges die Intubation oder Tracheotomie, Herzschwäche (Collaps) die Anwendung physikalisch oder chemisch wirkender Analeptica. Solche sind: Warme Bäder mit kalten Uebergiessungen, Wärmflaschen, Bürsten und Frottiren der Haut, Sinapismen, Essigklystiere, rhythmische Stösse gegen die Herzgegend mit der flachen Hand, innere Darreichung von starkem Kaffee mit Cognac oder Rum, von Ammonium carbonicum (0·5 pro dosi in Selters), von Liquor Ammonii anisat.

---

[1]) Rp. *Pulv. rad. Ipecacuan. 2·0,*
Cupr. sulfur. 1·0.
Aqu. ad 60·0.
MDS. Alle 5—10 Min. 1 Esslöffel. Vor dem Gebr. umzuschütteln! (Für Kinder 1 Thee- bis 1 Kinderlöffel.)

Rp. *Solut. Zinc. sulf. 1·0 : 60·0.*
DS. Alle 5—10 Min. 1 Essl.

Rp. *Apomorphin. hydrochlor. 0·05,*
Aqu. dest. ad 5·0,
D. in vitr. nigr.
S. Zur subcutanen Injection: ½—1 Pravaz-Spritze zu injiciren. (Bei Kindern 1—3 Theilstriche der Spritze.)

(12 Tropfen in Haferschleim), von Campher[1]), Digitalis, Strophantus[2]), subcutane Injection von Campher[3]), Aether, Coffein[4]), eventuell Aderlass zur Entlastung des Herzens. Gegen die Krämpfe gibt man Narcotica[5]) oder wendet mit Vortheil die Chloroformnarkose an. — Für die antidotarische Behandlung lassen sich als allgemeine Regeln nur die aufstellen, dass Säure-Vergiftungen die Zuführung von schwachen Alkalien, Alkali-Vergiftungen die von schwachen Säuren, Alkaloid-Vergiftungen die Zuführung von Tannin[6]) oder Kali permanganicum[7]) erfordern.

Da die Behandlung der acuten Vergiftungen vor allem eine schnelle sein muss, so ist es wichtig, die fast immer im Haushalt anzutreffenden Substanzen zu kennen, welche man vor Besorgung der ordinirten Antidota oder des Magenschlauches, oder vor Stellung einer exacten Diagnose sofort mit Vortheil therapeutisch benützen kann. Es lassen sich verwerthen als Brechmittel: Kochsalz (1 Esslöffel in Wasser), Senfmehl (1 Thee- bis 1 Esslöffel); als Analeptica: starker Kaffee mit Cognac, Rum, Wein, Hoffmannstropfen; bei Säure-Vergiftungen: Milch, Eiweiss, Seifenwasser, Kalkwasser, Eis; bei Alkali-Vergiftungen: verdünnter Essig, Milch, Oel, Eis; bei Alkaloid-Vergiftungen: starke Theeabkochungen (tanninhaltig im Gegensatz zum Theeaufguss).

Aconitin (Aconitum Napellus, Sturmhut).

Symptome: Nach kleinen Dosen: Vermehrung der Speichel- und Schweisssecretion, vermehrte Diurese, Pulsverlangsamung, Temperaturerniedrigung, Abnahme der Sensibilität und Reflexerregbarkeit.

Nach grösseren Dosen: Starke Salivation, Kollern im Leibe, Brechdurchfall, Schwindel, ziehendes Gefühl in den Kiefern,

---

[1]) Rp. *Camphor.,*
Ac. benzoic. aa 0·1.
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. V.
DS. Stündlich 1 Pulv.

[2]) Rp. *Tct. Digital. 10·0,*
Tct. Strophant.,
Tct. Valer. aeth. aa. 5·0.
MDS. 2—4mal täglich 40 Tropfen.

[3]) Rp. *Camphor. 1·0.*
Aether. ad 10·0.
MDS. Zur subcut. Injection. 1—5 Pravaz-Spritzen hintereinander einzuspritzen.

[4]) Rp. *Solut. Coffein. natr.-benz. 4·0 : 10·0.*
DS. Zur subcutanen Injection. ½—1 Spritze zu injiciren.

[5]) Rp. *Chloral. hydrat. 4·0,*
Aq. dest.,
Syr. cort. Aurant. aa 30·0.
MDS. 1—2 Esslöffel zu geben. (Event. per Klysma mit Haferschleim.)

[6]) Rp. *Ac. tannic. 0·1,*
Sacchar. 0·5.
M. f. pulv.
DS. Mehrmals 1 Pulver.
Oder: Magenauswaschung mit einer Lösung von 10 Gramm Ac. tannic. in 2 Liter Wasser. (Mit Wasser nachspülen!)

[7]) Rp. *Sol. Kal. permangan. 0·5 : 250·0.*
DS. In 2 Port. zu trinken.
Oder: Magenauswaschung mit einer Lösung v. 2—4 Gramm Kal. permang. in 2 Liter Wasser. (Mit Wasser nachspülen!)

Kribbeln in der Haut, allgemeine Schwäche, Mydriasis, Sehstörungen, Pulsverlangsamung, heftige Dyspnoe. Später Pulsbeschleunigung, Anästhesie, Respirations- und Herzlähmung bei bis zuletzt erhaltenem Bewusstsein.

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin. Analeptica. Opium. Zu versuchen: Atropin (0·005 : 5·0, davon $^1/_2$—1 Pravaz-Spritze), Digitalis. Eventuell künstliche Respiration.

Aether (Schwefeläther, Hoffmannstropfen).

Symptome: Inhalation: Excitation, allgemeine Narkose, Respirationslähmung. Aethergeruch der Athemluft!

Per os: Gasbildung im Abdomen und Athembeschwerden infolge von Empordrängung des Zwerchfells. Narkotische Erscheinungen.

Therapie: Zuführung frischer Luft, künstliche Respiration, Faradisation der Phrenici; Strychnin. nitr. (0·01 : 10·0, davon 1—2 Pravaz-Spritzen). — Bei Aufnahme per os: noch Magenauswaschung.

Alkohol.

Symptome: Excitation. Depression. Zusammenstürzen, Bewusstlosigkeit, völlige Anästhesie, starke Röthung des Gesichtes und der Conjunctiven, reflectorische Pupillenstarre, stertoröse verlangsamte Athmung, Erbrechen, Kothabgang, Haut kühl, klebrig, Puls sehr klein. Statt des Coma auch Delirien. Geruch der Exspirationsluft nach Alkohol!

Therapie: Magenentleerung. Inhalation von Salmiakgeist. Innerlich: Liquor Ammon. anisat., starker Kaffee. Eis auf den Kopf; Hände und Füsse in heisses Wasser oder Wärmflaschen. Warme Bäder mit kalten Uebergiessungen. Sinapismen. Essigklystiere. Eventuell Aderlass; künstliche Respiration.

Ammoniak (Salmiakgeist).

Symptome: Graue Schorfe an den Lippen, Schwellung und croupöse Exsudation im Munde, Salivation, Geruch des Athems nach Ammoniak, dauerndes Erbrechen nach Ammoniak riechender blutiger Massen, Leibschmerzen, blutige, nach Ammoniak riechende Durchfälle. Blutiger alkalischer Harn. Parästhesien, Schwindel, klonische Krämpfe, Tod im Collaps.

Inhalation: Husten, Dyspnoe, Glottisödem, eventuell Lungenödem.

Therapie: Verdünnter Essig, Weinsäure (1 Esslöffel auf 1 Glas Wasser), Citronensäure (Citronensaft). Milch, Oelemulsionen. Eispillen, Narcotica. — Nach Inhalation: Zuführung frischer Luft, Narcotica, eventuell Tracheotomie.

Anilin (Inhalation der Dämpfe und Aufnahme per os).

Symptome: Schwindel, Eingenommenheit des Kopfes, Dyspnoe, *stärkste Cyanose*, Schüttelfröste, Temperaturerniedrigung, *Mydriasis*, *Strangurie*, Methämoglobinämie, Harn braunschwarz, *Koma, Convulsionen.*

Therapie: Nach Inhalation: Zuführung frischer Luft, *Sauerstoffeinathmung*, Aderlass mit nachfolgender Kochsalz-

infusion (Transfusion), Analeptica. — Nach Aufnahme per os: Magenauswaschung, salinische Abführmittel (Natr. sulfur. theebis esslöffelweise in Wasser). Analeptica u. s. w. wie oben.

Antifebrin wie Anilin.

Antimon, cf. Brechweinstein.

Argentum nitricum.

Symptome: Weisse Schorfe im Munde, Leibschmerzen, Erbrechen weisser Massen, die sich am Licht bräunen. Paresen. Convulsionen.

Therapie: Magenauswaschung mit Kochsalzlösung oder Trinkenlassen derselben. Eiweiss, Milch, Eispillen.

Arsenik (Solutio Fowleri, Arsenwasserstoff, Schweinfurter und Scheel'sches Grün).

Symptome: Kratzen im Schlunde, Schlingbeschwerden, Durst, Leibschmerzen, choleraartiger Brechdurchfall, Reiswasserstühle, Wadenkrämpfe, Gliederschmerz, Cyanose, Ameisenkriechen, Puls klein, frequent, unregelmässig, Krämpfe. — Bei Anrühren des Erbrochenen mit Wasser sinkt die arsenige Säure zu Boden.

Oder: Kopfschmerzen, Schwindel, plötzlicher Collaps, Tod unter Convulsionen. (Fehlen der choleraartigen Symptome!)

Therapie: Magenauswaschung oder Entleerung durch Brechmittel (Zinc. sulf.). Darreichung des „Antidotum Arsenici" (umgeschüttelt 1—2 Esslöffel anfangs alle 10 Minuten, später stündlich. Auch nach Gebrauch desselben Magenauswaschung oder Brechmittel!) oder von Magnesia usta (1—2 Esslöffel auf 1 Glas Wasser; davon 2—4 Esslöffel $^1/_4$-, später $^1/_2$stündlich) oder von Ferrum oxydat. saccharat. solubile (Theelöffelweise $^1/_4$stündlich). Bis diese zur Hand, Eiweiss und Milch, Kalkwasser. — Später Analeptica, heisse Bäder, Diuretica.

Atropin (Atropa Belladonna, Tollkirsche; Datura Strammonium, Stechapfel).

Symptome: Maximale Mydriasis, Accommodationsstörung. Trockenheit im Munde und Halse, starker Durst, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Röthung des Gesichtes, trockene, heisse, scharlachrothe Haut, Schwindel, Puls- und Respirationsbeschleunigung nach vorübergehender Verlangsamung, Delirien mit Hallucinationen, allgemeine Lähmung.

Therapie: Brechmittel (Apomorphin), Magenwaschung mit Tannin oder Kal. permangan., auch Darreichung von gepulverter Holzkohle (Carbo ligni pulv., theelöffelweise). Als specifische Antidota sind empfohlen: Morphin., Physostigmin. salicyl. (0·01 10·0; davon $^1/_2$—1 Spritze), Pilocarpin. hydrochlor. (0·2 : 10·0; davon $^1/_2$—1 Spritze). Eiskappe auf den Kopf. Essigklystiere.

Austern, cf. Miesmuscheln.

Barytumverbindungen.

Symptome: Uebelkeit, Erbrechen barythaltiger Massen, Leibschmerzen im Epigastrium, Kolik, Diarrhöen, Kälte und Blas

der Haut, Schwindel, Doppeltsehen, Convulsionen, Puls verlangsamt, drahthart. Herzlähmung.

Therapie: Brechmittel bei geringem Erbrechen, Magenauswaschungen mit Lösungen von Natr. sulfur. oder Magnes. sulfur. (1 Esslöffel auf 1 Liter Wasser) oder Trinkenlassen. Eventuell künstliche Respiration.

Benzin (Benzol; Inhalation und Aufnahme per os).

Symptome: Kopfschmerzen, rauschähnlicher Zustand, Muskelzittern, Bewusstlosigkeit, Zuckungen, Cyanose, Mydriasis. Per os: auch Magenbeschwerden.

Therapie: Zufuhr frischer Luft. Analeptica (Kaffee, Coffein), Vorziehen der Zunge, künstliche Respiration. — Bei Aufnahme per os: Magenentleerung.

Bilsenkraut, cf. Atropin.

Bittermandelwasser, cf. Blausäure.

Blausäure (Cyankali, Aqua amygdal. amar.).

Symptome: Geruch der Athemluft nach Blausäure, Schwindel, Kopfschmerz, krampfartiges Athmen, Sehstörungen, Mydriasis, Bewusstlosigkeit, Krämpfe, Respirationslähmung.

Nach grossen Dosen Zusammenstürzen in wenigen Secunden und Tod nach einigen Minuten.

Therapie: Magenauswaschung mit Kal. permangan. oder die Lösung (1:500) weinglasweise trinken lassen. — Natrium subsulfurosum, messerspitzweise in Wasser. — Hydrogenium peroxydatum (innerlich esslöffelweise in Wasser, subcutan mit grosser Vorsicht so lange jede Minute 1 Pravaz-Spritze, als der Athem noch riecht. Kobert.) — Analeptica (Camph.-Aether). Atropin, eventuell Aderlass mit folgender Kochsalzinfusion; künstliche Respiration.

Bleiverbindungen (bes. Bleizucker).

Symptome: Salivation, Metallgeschmack, Erbrechen oft weisslich gefärbter Massen, Kolik, Obstipation oder blutige Durchfälle; Puls hart, verlangsamt, Lähmungen an den Extremitäten, Parästhesien, Anästhesien, Benommenheit.

Therapie: Brechmittel bei ungenügender Entleerung. Magenauswaschung mit Lösungen von Natr. sulfur. oder Magnes. sulfur. (1 Esslöffel auf 1 Liter Wasser) oder Trinkenlassen derselben (1 Thee- bis 1 Esslöffel auf 1 Glas Wasser). Eventuell Eiweiss, Milch. Analeptica. Später Opium.

Brechweinstein (Tartarus stibiatus, Antimon).

Symptome: Brennen im Mund, Schlund und Magen, Metallgeschmack, Salivation, Uebelkeit, heftiges Erbrechen, Kolik, choleraartige Durchfälle, Abgeschlagenheit, kleiner, *frequenter Puls, kalte* Haut, Cyanose, Wadenkrämpfe, Con*vulsionen, Collaps.* (Das Erbrechen kann auch fehlen.)

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin. Viel Wass*Milch, Eiweiss,* Eispillen, Opium. — Wärmflaschen, Analep*(Aether, Digitalis,* Strophantus).

Brom (Inhalation und Aufnahme per os).

Symptome: Inhalation: Dyspnoe, Schnupfen, Reizung der Conjunctiven, Salivation, eventuell Spasmus glottidis; Schwindel, Kopfschmerz, Benommenheit. — Geruch der Athemluft nach Brom.

Therapie: Zuführung frischer Luft. Inhalation von Wasserdämpfen oder Ammoniak.

Symptome: Aufnahme per os: Gelbfärbung und Schwellung der Mundschleimhaut, Erbrechen gelbbrauner Massen von charakteristischem Geruch. Soporöser Zustand.

Therapie: Stärkeabkochungen, Milch, Eiweiss, Alkalien, Eispillen.

Bromoform.

Symptome: Taumeln, Rausch, Bewusst- und Empfindungslosigkeit, Cyanose, kalte Haut; schwache, oft aussetzende Respiration; kleiner, frequenter, unregelmässiger Puls. Pupillen weit und starr.

Therapie: Magenentleerung. Analeptica (Camph.-Aether, Kaffee).

Cantharide (spanische Fliege; Cantharidin, Vergiftung auch durch äusserliche Application!).

Symptome: Brennen und Blasenbildungen im Munde, Schlingbeschwerden, Salivation (resp. Blasenbildung auf der äusseren Haut), blutiger Brechdurchfall, Nierenkoliken, Schmerzen in der Harnröhre, Spasmus vesicae, Priapismus; Harn sehr spärlich, eiweiss- und bluthaltig; Delirien, Krämpfe.

Therapie: Wiederholte Magenauswaschung. Schleimige Getränke mit Opiumzusatz. Eispillen. Alkalische Wässer (Fachinger, Vichy). Warme protrahirte Sitzbäder. Lauwarme Blasenausspülungen.

Cave: Fette, Oele (Milch), Campher!

Carbolsäure (Phenol, Kreosot, Lysol, Kreolin, Trikresol; Vergiftung per os, von der Haut und von den Schleimhäuten aus).

Symptome: Weissfärbung der Haut in der Umgebung des Mundes und der Mundschleimhaut. Erbrechen specifisch riechender Massen. Schwindel, Schwäche, Ohnmacht, profuse Schweisse; Puls klein, frequent; Temperatur erniedrigt. Harn dunkel-grünlich, an der Luft nachdunkelnd. — In grossen Dosen: Rascher Collaps, Herz- und Respirationslähmung.

Therapie: Magenauswaschung mit Zuckerkalklösung (1 bis 2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser) oder Zuckerkalk messerspitzweise *in Wasser.* (Im Nothfalle Kalkwasser.) Dann Natr. sulfur. (15 bis *30 Gramm in* Wasser). Eispillen. Analeptica (Alkohol).

Chlor (*Vergiftung* meist durch Einathmung; innerlich werden *grosse Dosen* vertragen).

Symptome: Dyspnoe, Schnupfen, Reizung der Conjunctiven. *Bronchitis mit* blutigem Sputum, eventuell Spasmus glottidis. -

Bei Vergiftung per os: Magencatarrh und Durchfall, Pulsbeschleunigung. Diagnose durch den charakteristischen Chlorgeruch.

Therapie: Frische Luft. Einathmen von Wasserdämpfen oder Ammoniak. Narcotica.

Bei Vergiftung per os: Natr. subsulfurosum (messerspitzweise in Wasser), Milch, Eiweiss.

Chloralhydrat.

Symptome: Kratzen im Schlunde, Rausch, Narkose, Röthung des Gesichtes, Verlangsamung der Athmung, Cyanose, Erbrechen, kleiner, langsamer Puls, Herzstillstand, Respirationslähmung. (Chloroform- und Aethervergiftung sind durch das Fehlen des charakteristischen Geruches, Morphinvergiftung durch das Fehlen der Myosis auszuschliessen.)

Therapie: Magenauswaschung. Künstliche Respiration. Herzmassage. Vorsichtig: Faradisation des Phrenicus am Halse. — Strychnin. nitric. (0·02:10·0; davon mehrmals 1 Pravaz-Spritze) Analeptica (Coffein, Hautreize).

Chloroform.

Symptome: Charakteristischer Geruch der Athemluft, Narkose, Athem- und Pulsverlangsamung, Pupillenerweiterung, Puls klein, irregulär, Respirations- und Herzstillstand. (Bei kranken Individuen und ungeschickter Narkose Tod durch vorzeitigen Herzstillstand). — Bei Vergiftungen per os: Hyperämie der Mund- und Rachenschleimhaut. Gastro-Enteritis.

Therapie: Frische Luft, Vorziehen der Zunge und rhythmische Tractionen derselben, künstliche Respiration, Herzmassage, Faradisation der Phrenici am Halse, Strychnin. nitric. (0·05:10·0; davon $^1/_2$—1 Pravaz-Spritze). Hautreize.

Chromverbindungen.

Symptome: Gelbrothe Verätzung und Schwellung der Mundschleimhaut. Heftige Leibschmerzen. Erbrechen gelbgrüner Massen. Blutige Durchfälle. Puls fadenförmig. Harn spärlich eiweiss- und bluthaltig, eventuell Anurie. Dyspnoe. Krämpfe. Collaps.

Therapie: Auswaschung des Magens mit Lösung von Natr. bicarbonicum. Milch, Eiweiss, Kalkzucker (messerspitzweise in Wasser), auch Magnes. carbon. (ebenso) oder Plumb. acet. (0·05 pro dosi). — Opium.

Cocain. (Vergiftung per os, von anderen Schleimhäuten aus und durch subcutane Injection.)

Symptome: Trockenheit und Brennen im Schlunde, Schlingbeschwerden, Blässe, Uebelkeit, Erbrechen, Leibschmerzen. Schwindel, Herzklopfen, Ohrensausen, Mydriasis, Exophthalmus, Heiterer Rausch mit nachfolgender Depression, Präcordialangst, *Dyspnoe, Cheine-Stokes'sches* Athmen, Cyanose, Collaps, *Convulsionen*, Respirationslähmung.

Therapie: Bei Vergiftung per os: Magenauswaschung m
Lösungen von Tannin oder Kali permangan. — Ferner An

nitrit (3 Tropfen auf's Taschentuch zum Einathmen), Ammonium carbonicum (messerspitzweise in Wasser), Sinapismen auf Herz und Magengegend. Gegen die Krämpfe Narcotica (Chloral). Eventuell künstliche Respiration.

Colchicin (Colchicum autumnale, Herbstzeitlose).

Symptome: Brennen im Munde, Salivation, Erbrechen, Koliken, blutige Durchfälle, Schwindel, Delirien, leichte Convulsionen, Puls unregelmässig, Collaps, Respirationslähmung.

Therapie: Magenausspülung mit Tannin oder Kali permang.-Lösung. Schleimige Getränke mit Opium. Warme Umschläge auf den Leib. Analeptica.

Conin, cf. Schierling.

Crotonöl.

Symptome: Brennen im Mund und Hals, Salivation, Erbrechen, Leibschmerzen, starke blutige Durchfälle; kalter Schweiss. Cyanose. Collaps.

Therapie: Magenausspülung. Milch, Oel, schleimige Getränke, Eispillen. Oelklystiere. Opium. Analeptica.

Cyankali, cf. Blausäure.

Digitalis purpurea (rother Fingerhut).

Symptome: Uebelkeit, Erbrechen, Magendrücken, Koliken, Durchfälle. Präcordialangst, Puls hart, maximal verlangsamt. Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen, Gesichtsfeldverdunklung, Mydriasis, Hallucinationen. Anurie. Später Puls sehr besch eunigt, klein, arhythmisch. Collaps. Herzparalyse, häufig unter Convulsionen.

Therapie: Magenausspülung, Darmentleerung, Eispillen. Opium. Sinapismen. Diuretica. Analeptica.

Eisessig (Ac. acet. glaciale; conc. Essigsäure).

Symptome: Geruch des Athems nach Essig, Erbrechen essigsaurer Massen, Leibschmerzen. Schwindel, Herzschwäche, Sinken der Temperatur, Bewusstlosigkeit, Tod unter Lungenödem.

Therapie: Seifenwasser, Magnes. ust. (ev. Kreide, Soda; messerspitzweise in Wasser); Eispillen. Analeptica.

Fischgift (giftige u. nicht giftige, kranke od. verdorb. Fische).

Symptome: Magenschmerzen, Brechdurchfall, Präcordialangst, Schwindel, Lähmungen, Krämpfe. Anfälle von Dyspnoe und Herzschwäche.

Therapie: Entleerung des Magens und des Darmcanals (Calomel 0·1—0·5 Gramm 3mal täglich); dann Opium. Analeptica.

Fleischgift (verdorbenes oder von kranken Thieren stammendes Fleisch).

Symptome: 6—48 Stunden nach dem Genuss: Brechdurchfall, Somnolenz, eventuell Delirien, Pupillenverengerung, Exantheme, Fieber, auch Temperaturherabsetzung. — Cholera- oder typhusähnliches Krankheitsbild.

Therapie: *Magenauswaschung.* Calomel (0·1—0·5 Gramm 3mal täglich). *Salol. Opium. Analeptica. Warme Bäder.*

Fliegenpilz, cf. Pilze.

Giftlattich (Lactuca virosa) wie Atropin.

Goldregen (Cytisus laburnum; Cytisin).

Symptome: Uebelkeit, Erbrechen, Salivation, Excitation, Zuckungen, tetanische Krämpfe; Koliken, Durchfälle; Herzklopfen, Cyanose.

Therapie: Entleerung des Magen-Darmcanales. Reichlich Thee trinken lassen. Gegen die Krämpfe Chloral. Dann Analeptica, eventuell künstliche Respiration.

Höllenstein, cf. Argent. nitric.

Jod (Jodtinctur, Jodglycerin, Lugol'sche Lösung. Vergiftung meist per os oder nach Injection in Wund- und Körperhöhlen).

Symptome: Im Munde Bräunung und Entzündung der Schleimhaut, Erbrechen brauner oder blauer, nach Jod riechender Massen, profuse, oft blutige Durchfälle. — Kopfschmerz, Schwindel, grosse Schwäche, blasse, kühle Haut, Collaps. Albuminurie, Hämoglobinurie, resp. Ischurie.

Therapie: Magenauswaschung mit Stärkeabkochungen, Eiweisslösungen, Sodalösungen. Eispillen. Opium. Analeptica.

Symptome: Inhalation der Dämpfe: Nasen-, Lungenbluten, eventuell Glottisödem.

Therapie: Behandlung cf. Chlorinhalation.

Jodoform (Vergiftung per os, von Wundflächen und Körperhöhlen aus).

Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Benommenheit, Schläfrigkeit, Hallucinationen. Coma. Zuweilen maniakalische Zustände mit nachfolgender Depression: Verfolgungsideen, Nahrungsverweigerung. Sehr kleiner frequenter Puls.

Therapie: Entfernung des Jodoforms von der Wundfläche, Bestreuen derselben mit Magnes. ust. Innerlich Kal. acetic. Analeptica. Warme Bäder. — Bei Vergiftung per os Magenauswaschung, Entleerung des Darmes.

Kali chloricum.

Symptome: Magenschmerzen, Erbrechen, Diarrhoe, Dyspnoe, Cyanose, Graufärbung der Haut, später Icterus. Kleiner schneller Puls. Harn dunkelbraun (Methämoglobin), spärlich. Somnolenz. Urämie. Tod durch Herzlähmung.

Therapie: Magenauswaschung, wenn noch Gift im Magen zu erwarten. — Eispillen, Opium, Analeptica (schwere Weine), alkalische Wässer (Vichy, Fachinger), Diuretica (Liqu. Kal acet. 30·0:200·0 2stündlich 1 Esslöffel oder Coffein. natr. benz. 4·0:10·0 ($^1/_2$–1 Pravaz-Spritze subcutan), Pilocarpin. hydrochlor. (0·2:10·0; ($^1/_2$—1 Pravaz-Spritze). Kochsalzinfusion. — Cave: Säuren und kohlensäurehaltige Getränke.

Kalilauge.

Symptome: Weissliche Trübung und Schwellung der Mund-schleimhaut. Fortdauerndes Erbrechen geruchloser, fadenziehender, brauner, alkalischer Massen. Furchtb

Schmerzen im Mund, Schlund und Magen, Koliken, blutige Diarrhoen. Harn alkalisch, bluthaltig. Event. Peritonitis. Tod in Collaps.

Therapie: Verdünnter Essig. Weinsäure (theelöffelweise in 1/2 Glas Wasser), Citronensäure. — Eiweiss, Milch, Oelemulsionen. Eispillen. Narkotica. Analeptica.

Kleesalz, cf. Oxalsäure.

Kohlenoxyd (Kohlendunst, Leuchtgas, Wassergas).

Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, Uebelkeit, Erbrechen. Röthung des Gesichtes, Pulsbeschleunigung, stertoröses Athmen, Sinken der Temperatur, Bewusstlosigkeit, Krämpfe.

Therapie: Frische Luft. Sauerstoff-Inhalationen. Künstliche Respiration. Aderlass mit nachfolgender Kochsalzinfusion (Transfusion). Faradisation der Phrenici. Analeptica.

Kohlensaures Kali (Pottasche) wie Kalilauge, nur schwächer.

Kupferverbindungen (Kupfervitriol, Grünspan, Schweinfurter Grün).

Symptome: Grüne Verschorfung der Mundschleimhaut, grünes oder blaues Erbrechen, Metallgeschmack, Salivation, Koliken, Tenesmus, braunrothe, dünne Stühle. Ikterus. Auftreibung des Leibes. Puls klein, Haut kühl. Nervöse Erscheinungen. Anasthesien, Paresen, Delirien. Collaps.

Therapie: Magenausspülung mit Ferrocyankali-Lösung, Eiweiss, Magnesia usta (theelöffelweise in Milch), Holzkohle (ebenso), Ferrum pulveratum (messerspitzweise in Milch), Milchzucker. Klystiere. Opium. Analeptica.

Leuchtgas, cf. Kohlenoxyd.

Lorcheln, cf. Pilze.

Lysol, cf. Carbolsäure.

Miesmuscheln (Mytilotoxin. Vergiftung durch kranke und verdorbene Thiere).

Symptome: Zusammenschnüren im Halse, Kopfschmerz, Kribbeln in Armen und Beinen, Excitation, Uebelkeit. Später Mydriasis, Paresen, Ataxie. Sinken der Temperatur.

Therapie: Magenausspülung. Calomel (0·1—0·5 3mal tägl.). Analeptica.

Morphium.

Symptome: Uebelkeit, Erbrechen, Benommenheit, Schlafsucht, Narkose, Schweisse. Sehr starke Pulsverlangsamung, maximale Miosis; Koma; zuweilen, besonders bei Kindern, Krampfe. Respirationslähmung.

Therapie: Brechmittel nur in der allerersten Zeit. Wiederholte Magenausspülungen — auch bei subcutaner Intoxication — mit Tannin- oder Kal. permang.-Lösung, oder Eingeben derselben. Atropin. sulfur. (0·01 : 10·0; davon 3—4mal 1 Pravaz-Spritze innerhalb 1/4 Stunde). Analeptica (starker Kaffee, Coffein. natro benz. subcutan). — Andauernde Hautreize. Eventuell künstliche Respiration.

Mutterkorn, cf. Secale.

Natronlauge, cf. Kalilauge.

Nicotin (Tabak, Tabaksaft, Vergiftung per os, durch Rauchen, durch Klystiere).

Symptome: Charakteristischer Geruch! Kratzen im Schlund, Salivation, Nausea: Brechdurchfall, Schwindel, kalter Schweiss; Puls klein, langsam, dann beschleunigt, arhythmisch. Beklemmungsgefühl. Miosis, Sehstörungen. Dyspnoe, Benommenheit, klonische Krämpfe. Lähmungen.

Therapie: Nach Vergiftung per os: Magenauswaschung mit Tannin- oder Jodlösung (Tct. Jod. gtt. XL, auf 1 Liter Wasser). — Darmausspülung. Analeptica (Kaffee, Cognac, Liquor Ammon. anisat.) Eventuell künstliche Athmung.

Nitrobenzol (Mirbanöl).

Symptome: Bittermandelgeruch der Athemluft. Erbrechen. Tiefste Cyanose. Starke Dyspnoe. Trismus. Delirien. Somnolenz. Mydriasis. Convulsionen.

Therapie: Magenauswaschung. Salinische Abführmittel (Magn. sulf. oder Natr. sulf. 1 Esslöffel, resp. 1 Theelöffel in Wasser). Analeptica (Kaffee). Venaesection mit folgender Kochsalzinfusion (resp. Transfusion). Eventuell künstliche Athmung.

Nitroglycerin,

Symptome: Schwindel, Herzklopfen, Röthung und Hitze im Gesicht, Dyspnoe, Cyanose, Delirien, Bewusstlosigkeit. — Nach Verschlucken grösserer Mengen auch Gastro-Enteritis.

Therapie: cf. Nitrobenzol. —

Opium, cf. Morphium.

Oxalsäure (Zuckersäure, Kleesalz).

Symptome: Weissgraue Verschorfung der Mundschleimhaut, braunes Erbrechen, starke Leibschmerzen, blutige Durchfälle, Schmerzen in der Lendengegend, Anurie. Nervöse Erscheinungen: Kribbeln, Anästhesie an den Fingerspitzen, klonische und tonische Krämpfe, später Paresen. Collaps.

Therapie: Magenauswaschung mit Zuckerkalk-Lösung (einige Esslöffel auf 1 Liter Wasser), Kalkwasser oder Zuckerkalk, eventuell Kreide, gepulverte Eierschalen theelöffelweise in Wasser eingeben. Auch Magnes. sulf. (1 Esslöffel auf 1 Glas Wasser). Eispillen, Eiweiss, Opium, Analeptica.

Petroleum, cf. Benzin.

Phosphor (gelber Phosphor, Zündhölzchenmasse, Rattengift).

Symptome: Magenschmerzen, Erbrechen knoblauchartig riechender, im Dunkeln leuchtender Massen. Gewöhnlich erst am 3. oder 4. Tage Icterus, leichtes Fieber, Erbrechen gallig-blutiger Massen. Vergrösserung der Leberdämpfung. Blutungen der Haut und Schleimhäute. *Bild der acuten gelben* Leberatrophie. Somnolenz, Koma. *Harn Gallenfarbstoff,* Blut, Eiweiss.

Therapie: Solange noch Phosphor im Magen, Cupr. als Brechmittel. Magenwaschung mit Kal. permang.-Lö

Altes, ozonhaltiges (nicht rectificirtes) Terpentinöl (40—50 Tropfen in schleimigen Getränken mehrmals täglich). Alkalische Wasser. Soda-Kochsalzinfusion (resp. Transfusion). — Cave: Fette (Milch), Oele.

Physostigmin (Eserin; Faba Calabarica).

Symptome: Salivation, Schweisse, Brechdurchfall, Koliken, Pulsverlangsamung (eventuell Abort), Tobsucht, Krämpfe, Miosis, Dyspnoe, Respirationslähmung.

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin- oder Kal. permang.-Lösung. Atropin. sulfur. subcutan. — Vor allem künstliche Respiration. Analeptica.

Picrotoxin (Menispermum Coccullus).

Symptome: Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, Zittern, Betäubung, Convulsionen, flache Respiration, Salivation, Schweisse, Mydriasis, Delirien, Lähmung.

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin- oder Kal. permang.-Lösung. Gegen die Krämpfe Chloral (1—2 Grm.) oder Chloroformnarkose. Künstliche Respiration. Analeptica.

Pikrinsäure.

Symptome: Symptome der acuten Gastro-Enteritis. Intensiver Icterus. Hämaturie, Bradykardie. Urticaria. Delirien, Krämpfe.

Therapie: Magenauswaschung. Salinische Abführmittel (Magnes. sulfur. 1 Esslöffel auf 1 Glas Wasser). Eventuell Opium. Eiweiss. Venaesection mit folgender Kochsalzinfusion.

Pilocarpin (Folia Jaborandi).

Symptome: Profuse Schweissabsonderung und Salivation, Nasensecretion, Thränenfluss, Uebelkeit, Brechdurchfall. Puls verlangsamt, dann arhythmisch. Miosis, Sehstörungen, Strangurie, Schwindel, Collaps.

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin- oder Kal. permang.-Lösung. Atropininjectionen. Analeptica.

Pilze.

1. Fliegenschwamm (Agaricus muscarius; **Muscarin**).

Symptome: Uebelkeit, Salivation, Schweisse, **Brechdurchfall**, Schwindel, Sehstörungen, Miosis, Puls anfangs **beschleunigt**, dann maximal verlangsamt, klein, aussetzend. **Excitation, Convulsionen.** Strangurie. Sopor.

Therapie: Brechmittel, Magenwaschung mit **Tannin-Lösung.** Darmausspülung. Atropininjectionen, Analeptica. **Eventuell Kochsalzinfusion.**

2. Lorchel (Helvella esculenta, nur in **frischem** Zustande giftig).

3. Knollenblätterschwamm. (Amanita **phalloides**; **Verwechslung** *mit* jungen Champignons!)

Symptome: Digestionsstörungen, resp. Brechdurchfall, Prostration. Hämatogener Icterus. Hämoglobinurie. Cyanose. Somnolenz. Koma.

Therapie: Brechmittel, Magenwaschung mit Tannin-Lösung, Darmausspülung. Atropininjectionen, Analeptica. Eventuell Kochsalzinfusion.

Pyrogallol (Vergiftung auch durch äussere Application).

Symptome: Kopfschmerzen, Frost, Brechdurchfall, Apathie, Temperaturerniedrigung, Puls und Respiration beschleunigt, Abnahme der Reflexe. Strangurie: Harn dunkelbraun (Methämoglob.), Cyanose, Somnolenz.

Therapie: Bei Vergiftung von der Haut aus: Abwaschen mit Alkohol und Aether. Bei interner: Magenauswaschung. Sauerstoffinhalation, Aderlass mit folgender Kochsalzinfusion. Analeptica.

Quecksilberverbindungen (besonders Sublimat; Vergiftung subcutan und von Schleimhäuten aus).

Symptome: Stomatitis, Salivation, Metallgeschmack, blutiges Erbrechen, dysenterische Durchfälle, Anurie. Hochgradige Schwäche, Collaps.

Therapie: Eiweiss, Milch, Ferrum pulveratum (messerspitzweise) oder Ferrum sulfuratum mit folgender Magenauswaschung. Eispillen, Ol. Ricini, Darmausspülungen, Analeptica. Cave: Kochsalz!

Sadebaum (Zweige und Beeren von Juniperus Sabina).

Symptome: Gastro-Enteritis, eventuell Abort. Albuminurie, Hämaturie.

Therapie: Entleerung des Magen-Darmcanals. Schleimige Getränke, Eis.

Salpeter (Kalisalpeter).

Symptome: Acute Gastro-Enteritis, Sehr kleiner, irregulärer Puls. Schmerzhafte Muskelcontractionen. Herzstillstand.

Therapie: Entleerung des Magen-Darmcanals. Eispillen, hohe Irrigationen, Analeptica.

Salpetersäure (Scheide- oder Königswasser).

Symptome: Gelbe Verätzung der Mundschleimhaut und der Mundwinkel, Salivation, Erbrechen gelber, nach Salpetersäure riechender Massen. Puls klein, Haut kühl, Anurie. Tod im Koma.

Therapie: Trinken grosser Mengen Seifenwasser; Magnesia usta theelöffelweise in Milch, Eiweisswasser. Eispillen, Narcotica, Analeptica.

Salpetrige Säure (rauchende Salpetersäure, Vergiftung durch Inhalation).

Symptome: Oft erst nach mehreren Stunden: Hustenreiz, Dyspnoe, schleimiger, blutiger Auswurf, eventuell Glottisödem, Collapserscheinungen.

Therapie: Frische Luft. Vorsichtige Ammoniak-Einathmung, Narcotica. Eventuell künstliche Respiration. Analeptica.

Salzsäure.

Symptome: *Pseudodiphtheritische Beläge im Mund und Rachen, selten Verschorfung der äusseren Haut. Erbrechen braun bis olivgefärbter, rauchender, nach Salzsäure riechender Massen. Collapserscheinungen. Schmerzhafte Durchfälle, Dysurie, Hämaturie. Perforationsperitonitis.*

Therapie: Trinken grosser Mengen Seifenwasser; Magnesia usta theelöffelweise in Milch, Eiweisswasser, Eispillen, Narcotica, Analeptica.

Santonin (Flores Cinae; Wurmkuchen).

Symptome: Flimmern vor den Augen, Gelbsehen, Schwindel, Salivation, Brechdurchfall, Haut kühl, blass. Hallucinationen des Geruches und Geschmackes, Mydriasis, Somnolenz, Convulsionen, Harn grünlich-gelb, beim Kochen mit Kalilauge scharlachroth.

Therapie: Magenauswaschung, Darmentleerung, Chloral, Analeptica.

Schierling (Conium maculatum, Coniin; Verwechselung mit Petersilie und Sellerie).

Symptome: Brennen in Mund und Schlund, Salivation, Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, Mydriasis, Parästhesien der Haut und Abnahme der Tastempfindlichkeit, aufsteigende Lähmung, Respirationsstillstand.

Therapie: Brechmittel, Magenausspülung mit Tannin- oder Kal. permang.-Lösung, Analeptica (Essigklystiere; Coffein, innerlich und subcutan; Strychnin. nitr. 0·05 : 10·0, davon mehrmals 1 Spritze). Gegen die Krämpfe Chloral. Künstliche Respiration.

Schlangengift.

Symptome: Schwellung und bläuliche Verfärbung der schmerzenden Bisstelle. Schwellung der ganzen Extremität, Hauthämorrhagien an derselben. Lähmungen. Athemstillstand.

Therapie: Abbinden und Immobilisirung der Extremität. Ausschneiden oder Ausbrennen der Bisstelle. Injection von Kal. permang.-Lösung in die Bisstelle. Magenauswaschung, Reichlich Alkoholica. Strychnin. nitr. (0·05 : 10·0; davon mehrmals 1 Spritze).

Schwämme, cf. Pilze.

Schwefelsäure (Vitriol).

Symptome: Weiss-graue, bei conc. Säure schwarze Verätzung der Mundwinkel und Mundschleimhaut. Salivation, Athembeschwerden, Erbrechen saurer, geruchloser, kaffeesatzartiger Massen. Sehr starke Schmerzen, eventuell Krämpfe. Collapserscheinungen, eventuell Perforationsperitonitis.

Therapie: Sehr vorsichtige Magenausspülung. Oel, Eiweiss, dann Seifenlösung, Magnesia usta theelöffelweise in kalter Milch, Eispillen, Narcotica, Analeptica. Cave: Sofortige Darreichung von Wasser bei conc. Säure. Eventuell Tracheotomie.

Schweflige Säure wie salpetrige Säure.

Schwefelkohlenstoff (Vergiftung durch Inhalation und *Aufnahme per os).*

Symptome: *Kopfschmerz,* Schwindel, Sehstörungen, Erbrechen, Durchfall, Betäubung, allgemeine Anästhesie.

Therapie: *Frische Luft,* resp. Magenauswaschung. Analept

Schwefelwasserstoff (Cloakengase).

Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Durchfall. — In schweren Fällen: Köthung und Schmerzen der Augen, Dyspnoe, Herzklopfen, Cyanose, Mydriasis, Benommenheit, Convulsionen. Lungenödem. — Bei reichlicher Einathmung plötzliches Zusammenstürzen, Tod durch Lungenödem.

Therapie: Frische Luft. Künstliche Respiration. Faradisation der Phrenici. Aderlass mit folgender Kochsalzinfusion, Analeptica.

Secale cornutum (Mutterkorn. Ergotin).

Symptome: Ac. Gastro-Enteritis. Schwindel, blasse und kalte Haut, Muskelschwäche, Puls langsam und klein, Respiration verlangsamt. Kribbeln in den Beinen, Lähmungserscheinungen, Convulsionen. Tod im Koma.

Therapie: Entleerung des Magen-Darmcanales (Calomel 0·1—0·3 Gramm mehrmals). Ac. tannic. (0·1 pro dosi), Analeptica, eventuell Morphin.

Stechapfel, cf. Atropin.

Strychnin (Nux vomica. Brucin. — Rattengift).

Symptome: Ziehende Schmerzen in den Kaumuskeln, Spannung und Steifigkeit der Glieder, Steigerung der Reflexerregbarkeit, Nackensteifigkeit, auffallende Schreckhaftigkeit. Trismus. Heftige Streckkrampfe, von Pausen unterbrochen. Im Anfall Mydriasis. Sensorium frei. Respirationsstillstand.

Therapie: Magenauswaschung mit Tanninlösung nur im Anfang, ebenso Brechmittel (Apomorphin). — Gegen die Krämpfe Chloroformnarkose oder Chloral (2·0) per rectum. Eventuell künstliche Respiration. (Kein Campher!)

Sublimat, cf. Quecksilber.

Sulfonal.

Symptome: Schlafsucht; bei chronischer Vergiftung Hyperästhesien, Lähmungen, Erbrechen.

Therapie: Magenausspülung, Excitantien. Kal. aceticum bei Aussetzen des Mittels.

Tabak, cf. Nicotin.

Tartarus stibiatus, cf. Brechweinstein.

Tollkirsche, cf. Atropin.

Veratrin (Semen Sabadillae, Läusesamen).

Symptome: Brennende Schmerzen im Mund und Magen, Niesreiz, Salivation, Brechdurchfall, Koliken, Tenesmus; Gefühllosigkeit der Haut; Puls schwach, langsam; Dyspnoe, Delirien, Collaps. Convulsionen. Sensorium frei. Herzlahmung.

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin- oder Kal. permanganicum-Lösung. Reichlich warmen Thee. Analeptica (Wein, Campher). Gegen die Excitation Narkose.

Wasserschierling (Cicuta virosa. Cicutoxin; Verwechselt mit Sellerie).

Symptome: Uebelkeit, Erbrechen, Herzklopfen, Schwindel, Bewusstlosigkeit, heftige epileptiforme Krämpfe, Dyspnoe, Mydriasis. Puls hart, langsam.

Therapie: Magenauswaschung mit Tannin- oder Kal. permanganicum-Lösung. Abführmittel. Gegen die Krämpfe Chloroformnarkose oder Chloral (2·0 Gramm). Analeptica. Künstliche Respiration.

Wurstgift (Botulismus, Vergiftung durch Wurst, Corned Beef, geräucherte Fische, wie Stöhr u. a.).

Symptome: 12—24 Stunden nach dem Essen Symptome wie bei Atropinvergiftung von langsamerem Verlauf, nur die Herzaction nicht beschleunigt, sondern abgeschwächt. Häufig Ptosis und andere Augenmuskellähmungen.

Therapie: Magenauswaschung. Abführmittel (Calomel 0·1 bis 0·3 Gramm mehrmals). Analeptica. Schwitzcuren.

Zinkverbindungen (besonders Chlorzink).

Symptome: Mundschleimhaut blutig oder weiss gerunzelt. Metallgeschmack. Salivation. Heftiges Erbrechen weisslicher, später blutiger Massen. Dünne kaffeebraune Stühle. Wadenkrämpfe. Collapserscheinungen.

Therapie: Magenauswaschung mit Lösungen von Tannin oder Soda oder Natr. phosphor. Hohe Irrigationen mit Glycerin. Milch, Eiweiss. Opium. Analeptica.

Zuckersäure, cf. Oxalsäure.

---

5. Cosmetica (Schönheitsmittel).

Cosmetica nennt man Medicamente zur Erhaltung, Pflege und Verbesserung von Aussehen und Function der äusseren Körpertheile, der Haut, der Haare, des Mundes und der Zähne. Neben den gewöhnlicheren, im Handel vorkommenden Duftmitteln, Parfums, Riech- und Räucherwaaren unterscheidet man die Cosmetica im engeren Sinne als Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung körperlicher Schönheit.

A. Cosmetik der Haut.

1. **Fette.** Mandel-, Oliven-, Vaselinöl, Cacaobutter, Lanolin, Unguentum emolliens, letzteres als Crême céleste, Cold-Cream bekannt.

Cacaocrême:

Ol. Cacao liquef. p. 5·0,
Ol. Amygdal. 30·0,
Ol. Bergam. 1·0,
Aq. Colon. 20·0.

Glycerincrême:

Cetacei g. 6·0,
Paraffini 5·0,
Ol. Amygd. 25·0,
Aq. Ros.,
Glycer. aa. 10·0,
Ol. Ros. guttas IV.

Lanolinpomade:

Lanolini anhydr. p. 80·0,
Ol. Cacao 20·0,
Liquata misce et adde:
Ol. Rosae guttas II.

Lanolinmilch:

Lanolini p. 10·0,
Boracis 1·0,
Aq. Rosar. 100·0.

Mandelpulver:

Amygd. dulc. p. 100·0,
Amygd. amar. 20·0,
Amyl. Oryzae 120·0,
Borac.,
Rhiz. Ireos pulv. aa. 5·0,
Ol. Bergam.,
Ol. Citri aa. 0·5.

Crême de beauté:

Amygdalar. dulc. p. 15·0,
Aq. flor. Aurant.,
Aq. Rosar. aa. 60·0,
Borac. 1·0,
Tct. Benz. 2·0; 1-2 Theel. mit Wasser gemischt z. Waschen.

Cold-Cream:

Cerae albae,
Cetacei aa. q. 20·0.
Ol. Amygdal. 180·0,
Aq. flor. Aurant.,
Aq. Rosae aa. 90·0,
Ol. Rosae,
Ol. Geranii aa. gtt. 12,
Ol. Amygd. amar. aeth. gtt. 1,
Ol. Bergamott. gtt. 4,
Ol. Neroli gtt. 3.

2. Glycerin (Honig) *(Glycer. 1000. Aq. flor. Aurant. 120·0, Ol. Nerol., Amygd. amar. aa 1);* zu Waschungen u. Einreibungen bei Rhagadenbildung an den Händen (gesprungener Haut).

3. Spirituöse Mittel. Waschungen mit Franzbranntwein, pur oder verdünnt.

4. Harze und Balsame (Theerpräparate), Perubalsam, flüssiger Storax, Benzoe und verharzter Tolubalsam.

Lac virgineum:

Tinct. balsam. Tolut. p. 10·0.
Aq. Rosar. 500·0 (½ bis 1 Theelöffel auf 1 Glas Wasser zum Waschen).

Waschwässer:

Tct. Benz. g. 4·0,
Kali carb.,
Spir. camph. aa 1·0,
Aq. Colon. 250·0,
Tct. Ambr. mosch. 0·25.

5. Alkalische Mittel.

a) Seifen. Toiletteseifen, ferner Spiritus Saponis kalinus, saponinhältige Pflanzentheile, wie die Quillayarinde *(Cortex Quillajae)* und die Seifenwurzel, namentlich die levantische *(Radix Saponariae levanticae).* Zur Parfümirung der Seifen dienen die oben angeführten Duftmittel und zur Färbung verschiedene Stoffe (Zinnober, Ultramarin etc.). Waschen der Haut mit *Spirit. saponatus* nach vorherigem Einreiben mit *Crême céleste* fördert wesentlich ihre Schönheit.

Waschpulver:

Sapon. in pulv. g. 25·0,
Natri carbon. sicc. 2·5,
Amyl. Oryzae 10·0,
Pulv. rhiz. Ireos 5·0,
Mixt. oleos. balsam. 4·0.

Seifencrême:

Sapon. kal. alb. 20·0,
Spirit. vin. 5·0,
Ol. Amygdal. q. s.

Seifenessenzen:

Sapon. albi p. 1·0,
Alcoh. 4·0,
Aq. Ros..
Aq. Nuph. aa. 1·0.

Lait des Roses:

Rasurae Sap. oleacei 14·0.
Cetacei 14·0.
Cerae alb. 14·0,
Aq. Rosae 1113·0,
Furf. Amygd. 250·0,
Ol. Rosae 1·0.

Ein Waschmittel für zarthäutige Theile ist *Tct. Quillajae*, mit etwas Bergamottenöl und der fünffachen Wassermenge verdünnt. Sie bildet den wirksamen Bestandtheil des

Eau Athénienne:

Tct. Quillajae g. 5·0,
Glycer. 30·0,
Bals. vit. Hoffm.,
Aq. Colon.,
Tct. Ireos aa. 40·0,
Essent. Mosch. c. Ambr. 0·2.

b) Borax (Natr. boracicum) besitzt bei schwach alkalischer Reaction eine ausgesprochene antiseptische Wirksamkeit.

Lotio cosmetica:

Natr. borac. g. 2·0—4·0,
Aq. Ros. 100·0,
Tct. Benz. 1·0.

c) Kohlensaeure und ätzende Alkalien (gegen abnorme Fettabscheidung und Comedonen).

Schönheitswasser:

Kali carbon. g. 2·0.
Tct. Benz. 10·0,
Aq. Ros. 200·0; 1 Essl. dem Waschwasser beizumischen.

Ebenso:

Natri carbon. 1·0,
Borac. 5·0.
Aq. dest. 100·0,
Aq. Rosar. 200·0.

Gegen Schwielen: *Kal. caust. fus. 5·0,*
Aq. dest. 100·0.
S. Zus. zu 1 Liter warmen Wasser für ein Bad.

6. Schwefelpräparate bei Akne, Sykosis etc.

Crême de toilette.

Lanolini,
Ol. Amygdalar.,
Sulfur praecip. aa. g. 5·0,
Zinci oxydati 2·5,
Tinct. Irid. flor. 0·5.
Tinct. Anchus. tinct. 2·5. (Die Haut wird damit überstrichen und dann bepudert (Fossat).

Cosmetische Crême:

Sulfur. praecipit.,
Spir. Sapon. kalini,
Glycerini aa. 10·0. (Abends mittelst eines Pinsels aufzutragen und Morgens mit Boraxlösung abzuwaschen; bei Comedonen und Gesichtssebor·rhoe.

Schwefelpaste (gegen Sommersprossen, Leberflecke etc.):

Sulfur. praec. g. 25·0,
Acid. acet. arom. q. s., f. pasta.
S. auch pag. 171.

7. Säuren. Essig- und Citronensäure gegen Pigment- v
ere Hautflecken; ferner Salicylsäure, letztere, um die norm

oder pathologisch verdichtete Hornschichte in beliebiger Ausdehnung und einer der Concentration des Präparates entsprechenden Tiefe abzuheben. Zur Beseitigung stinkender Fussschweisse. (S. pag. 68.)

8. Jodpräparate werden vorzugsweise zur Heilung von Frostbeulen, doch auch zur Tilgung von Pigmentflecken verwerthet (Jodtinctur, Jodglycerin, Jodcollodium).

9. Thonerdesalze. Alaun in Lösung (1 : 20—50 Aq.) und essigsaure Thonerdelösigkeit (2—5 : 100 Aq.) gegen Frostschäden, Röthe und Follicularanschwellungen im Gesichte. Z. B.:

Alumin.,
Borac. aa. g. 2·0.
Aq. Ros. 150·0.
Tct. Benz. 5·0.

Ausserdem zeitweil. Waschen mit Spir. camph., essigsaurer Thonerde oder fein geschlämmtem Thon etc.

10. Bleipräparate. Bei Hyperidrose, chron. Ekzemen, als Deck- und Schminkmittel.

11. Zink- und Wismuthpräparate. Zinkoxyd, sowie basisch-salpetersaures Wismuth dienen als Heil- und Deckmittel gegen rothe Gesichtsflecke und nässende Ausschläge.

12. Quecksilberpräparate. Wirksame, aber gefährliche Mittel, besonders gegen Sommersprossen und andere durch Pigmentablagerung bedingte Hautflecke.

Hydrarg. bichlor. corros. 1—5·0,
Aq. Ros.,
Spirit. vin. aa. 50·0.
S. Zum Betupfen der Haut.

Sommersprossensalbe:

Hydrarg. bichlor. ammon. 2·0,
Ung. emoll. 50.

Oder:

Hydrarg. praecip. albi,
Bismuth. subnitr. aa. 1·0,
Ung. simpl. 10·0.

Auf Leinwand gestrichen.

Aqua orientat. Hebrae:
Hydrarg. bichlor. corr. 0·05,
Emuls. Amygd. amar. 300·0,
Tct. Benz. 1·5.

Mittelst Läppchen aufzulegen.

13. Deck- und Färbemittel (Schminken). Zu weissen Schminken werden feine Stärkemehlsorten, venetianischer Talk etc. verwendet. Rothe Schminken werden durch inniges Mischen der Deckmittel mit Carmin, Saflorroth, Krapplack bereitet. Zum Bemalen der Gesichts- und anderer Hautadern werden wohl auch blaue Schminken (aus Berliner- oder Indigoblau in beliebigen Verhältnissen mit venet. Talk gemischt) in Anspruch genommen.

B. Mittel zur Verschönerung des behaarten Theiles des Kopfes. (Cosmetik der Haare.)

1. Mittel gegen trockene und spröde Haare. (Haaröle und Haarpomaden); *Ol. Amygd.*, *Ol. Olivar. pruinc.*, *Ol. Avellanae*, *Ol. Sesami*, Lanolin u. a. Fette mit den oben geschilderten Duftmitteln. Weiters Rosenpomade (*Unguentum rosatum s. pu*

dinum), Vanillen-, Jasmin- und andere Pomaden, welche mit duftenden Fettextracten versetzt werden.

Haaröl (Essbouquet-Oel):

Ol. Amygd. g. 25·0,	*Ol. Violar. 20·0,*
Ol. Resed. 10·0,	*Ol. Ros. aeth. gtt. 1.*

2. Mittel, die Haare zu fixiren und zu formen.

Brillantine liquide:

Glycerini,	*Alkohol. aa. p. aeq.,*
Olei Ricini,	*Olei odor. q. s.*

3. Mittel zur Entfernung von Kopfschuppen. (S. pag. 116.)

4. Haarwuchsmittel. (S. pag. 5.)

5 Entfernung von Haaren an naturgemäss unbehaarten Stellen. Mechanisch durch Ausreissen derselben mittelst einer Cilienpincette oder stark klebender Pechpflaster *(Terebinth. 4, resin. Pini 5)*; durch Elektrolyse (höchstens 12 Haare in Intervallen von 1 bis 2 Wochen); mit Röntgenstrahlen.

6. Haarfärbemittel. *a)* Vegetabilische Haarfärbemittel: Grüne Walnussschalen u. a. m.; wenig wirksam.

b) Mineralische Haarfärbemittel:

1. Salpetersaures Silber, meist in ammoniakalischer Lösung, mit oder ohne Kupfervitriol, um Haare dunkelbraun oder schwarz dauernd zu färben.

2. Wismuthpräparate färben, mit alkalischen und Schwefelmitteln *(Natrium sulfuratum. Natrum subsulfurosum)* in Verbindung gebracht, die Haare hell- bis dunkelbraun.

3. Kupfervitriollösung, nach dieser Ferrocyankalium- oder Calciumsulfhydratlösung behufs Braunfärbung der Haare.

4. Bleipräparate zum Nachdunkeln von ergrauten Haaren; gesundheitsschädlich.

5. Wasserstoffhyperoxyd, ein Mittel, um rothe Haare röthlichgelb oder hellblond zu färben. Solche Präparate sind das Golden Hair-Wash, Auricomus und Eau fontaine de jouvence. Zur Blondfärbung eignen sich sehr gut auch Waschungen mit 150 Grm. Rheum in $^1/_2$ Liter Weisswein bis auf die Hälfte eingekocht. Nach dem Waschen trocknen lassen.

C. Mittel zur Pflege und Erhaltung der Schönheit der Mundgebilde.

1. Lippen. Ein lebhafteres Roth ertheilt man den Lippen mit Hilfe rother Schminkwässer *(Alloxan. Purpurissimum)*. Trockene aufgesprungene Lippen werden mit *Crème céleste*, Honigsalben oder eigens bereiteten Lippenpomaden *(Butyr. Cacao 10·0, Ol. Ricin. 3·0, Extr. Catechu 1·0, Ol. Betulae gtt. 2, Ol. Anis. stell. gtt. 5)*, rothen Lippensalben etc. bestrichen.

2. Zähne und Zahnfleisch.

Zahnreinigungsmittel. Zu den milderen mechanisch wirkenden gehören: *Präparirte* Holzkohle, am besten Lindenkohle,

kohlensaure und phosphorsaure Kalkpräparate. Stärkere: Präparirte Austernschalen, Sepienbein, selbst Schachtelhalm und Bimsstein (chinesisches Zahnpulver). Um Zähne ohne Nachtheil chemisch zu reinigen, sind milde alkalische Mittel, wie Seife, Borax oder Soda anzuwenden.

1. Zahnpulver. Das einfachste und zweckmässigste Zahnpulver:

Pulvis dentifr. simpl.:	*Pulv. rhiz. Ireos.,*
Cretae praep. 40·0.	*Magnes. carb. aa. 3·0.*
Pulv. Sapon. 5·0.	*Ol. Menth. pip. gtt. 3.*
Ol. Menth. pip. gtt. 4.	*Magnes. carbonic. 95·0,*
Pulvis dentifricius Dr. Heider:	*Ol. Gaultheriae gtt. 3,* *Carminii q. s.*
Oss. Sep. praep. 25·0.	

2. Zahnpasten. *Pasta dentifricia mollis u. dura, Odontine.*

3. Zahnseifen.

Zahnpasta mit Seife.	*Talci praepar. aa. g. 10·0,*
Saponis in pulv.,	*Ol. Menth. pip. gtt. 10,*
Magnes. carbon.,	*Mucil. Gm. Acac. q. s.*
Pulv. rad. Iridis flor.,	*ut f. pasta spissior.*

4. Zahntincturen. Zahntropfen.

Elixirium dentifricium Heideri:	*Antiseptica:*
Ol. Menth. pip. 1·0.	*Acid. salicyl. p. 4,*
Aether. acet. 2·0,	*Spir. Menth. 50·0:*
Spir. Vini 80·0,	10—20 Tropfen in ½ Glas Wasser.
Glycerin 20·0.	S. auch pag. 92.

3. Mundhöhle. Mittel, den übelriechenden Athem zu verbessern. *Liquor Natri chloroti.* als Mundwasser zu ½ Esslöffel in einem halb gefüllten Glase Wasser mit Zusatz von Weingeist *(Liq. Calcar. chlor. 100. Alkoh. 10).* Auch *Kali hypermangan.*, Boraxsäure, Salol als Mundwasser *(Salol. 1·0, Spirit. 100·0. Tinct. Coccionellae 3·0. Ol. Rosar. gtt. 1. Ol. Menth. pip. gtt. 2.* Ein Theelöffel auf 1 Glas Wasser. Von Kaumitteln sind es die Nelken und der Kalmus, deren man sich zu diesem Zwecke bedient. Zur Beseitigung üblen Athemgeruches vom Rauchen werden unter den Namen *Cachou de Bologne (Cachoudé)* Pastillen *(Pastilles pour les fumeurs)* und Pillen *(Cachous aromatisés)* verkauft. *Pilulae odoriferae Viennenses: Moschi 0·01, Rhiz. Irid. flor. pulv. 5·0, Extr. liquirit. 10·0, Ol. Menth. pip. gtt. X, Mucil. gumm. arab. q. s. f. pil. pond. 0·05. Obduc. argent.*

6. Vergleichung der gebräuchlichen Thermometerscalen.

C. = Celsius, R. = Réaumur, F. = Fahrenheit.

C.	0	5	10	15	20	25	30	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
R.	0	4	8	12	16	20	24	28	28_8	29_6	30_4	31_2	32	32_8	33_6	34_4	35_2	36
F.	32	41	50	59	68	77	86	95	96_8	98_6	100_4	102_2	104	105_8	107_6	109_4	111_2	113

Anmerkung. Die Eintheilung von Réaumur und Celsius bewegt sich zwischen Gefrierpunkt (= Nullpunkt) und Siedepunkt des Wassers, R. nimmt 80, Celsius 100 Grade an. Bei Fahrenheit beginnt der Nullpunkt tiefer, und zwar da, wo eine Weingeist- oder Quecksilbersäule in einer Kaltemischung aus Salz und schmelzendem Eise zu stehen kommt. Von da bis zum Siedepunkt des Wassers nimmt er 212^0 an.

7. Uebersicht

der officinellen, sowie der wichtigeren nicht officinellen Arzneimittel, ihrer Dosirung und Anwendung, sowie ihrer Preise.

Die officinellen Mittel der Ph. Austriaca (Ed. VII. ex 1890) sind mit *, die der Ph. Germanica (Ed. III. ex 1890) mit ° bezeichnet. Die mit † bezeichneten Mittel finden sich in der Tabelle für Maximaldosen.

p. d. = pro dosi; m. t. — mehrmals täglich.

Die mit schiefen Lettern gesetzten Zahlen vor dem = bedeuten Gramme, die Zahlen nach dem = den Preis für dieselben in Hellern. Die Preise der officinellen Mittel sind nach der „Arzneitaxe f. d. Jahr 1899", diejenigen der nichtofficinellen Mittel nach den neuesten Preislisten angegeben.

Abri precatorii Sem. (Jequirity); Inf. 0·5—1·0 : 100 Col. zu Bähungen u. Instillationen bei Augenkrankheiten *(10=6)*.

°**Absinthii Herba**; Inf. 5·0—15·0 : 100 Col.; Pulv. 0·5—2·0 m. t. *(10=12)*. —°**Extr.** 0·5 d. *(1=8)*. — **Ol. aether.** 1—2 Tpf. p. d. *(1=20)*. — **Tinct. Abs.* und **Tinct. Abs. compos.* 20—60 Tpf. m. t. *(1·0 bis 3·0)* m. t. *(10=8)*.

Absinthin. Bitterstoff aus *Artemisia absynthium*; int. 0·1—0·25 2mal t. *(0·01=4)*.

°†**Acetanilidum siehe Antifebrinum.**

Acetalum (Diaethylacetal). Hypnotic. u. **Anaesthetic.** 8·0—12·0 p. d. in **Emuls.** u. Mixt.; ext. in **Klyst.**

Acetonum (Spir. pyroacet. depurat.) 5—20 Tpf. m. t. ad 5·0! p. d.; ext. zu Inhal. 0·1—1·0 : 100·0 Aq.; zu Einreib. u. **Waschung.** als Liniment *(10=8)*.

Acetphenetidinum (Antipyr.) 0·1—0·7 stündl.; (Phenacetin Bayer, Acetphenetidin) 0·5—1·0 auf einm. (Neuralgicum) *(1=5)*.

Acetphenylhydrazin = Hydracetin.

*° **Acetum (purum)** zu Saturat., selten zu Mixtur. (6% Essigsäure enthalt.) 25·0—50·0 : 150·0; als Getränk 100·0—150·0 : 1 Ltr. Zuckerwasser; ext. zu Mund- u. Gurgelwässern 20·0—50·0 : 150·0; zu Waschungen, Umschlägen, Injectionen (pur od. mit Wasser aa. zu 30·0—120·0 pur od. verd.) *(100 = 6)*.

*° **Acetum aromat.** 7·0-15·0 m. t.; z. Mixtur. 15·0—50·0 : 150·0; ext. als Riechmittel, zu Räucherungen *(100=20)*.

— ° **pyrolignosum crudum**; nur ext. rein oder verdünnt (1—10%) zu Inject., Waschung, Pinselung, Verbandwässer etc. *(100=10)*.

— ° **rectificatum**; 0·3—1·0 (10—30 Tpf.) m. t.; auch verdünnt mit aromat. Wässern; ext. zu Mund- u. Gurgelwässern (1 : 10 bis 20 Aq.) zu Pinselsäften (1 : 5—10 Mel); zu Inject., Umschläg., Verbänd. etc. (w. o.) *(100=18)*.

* **A. Scillae**; 1·0—5·0 p. d. in Mixt. a. Diuret. u. Expect. *(10=5)*.

*° **Acidum acet. conc.** (96% Essigsäure) nur ext. als Aetz- u. Riechmittel und Rubef. *(10=6)*.

— *° **dilutum** (20—30% Essigsäure) 0·5—2·0 m. t. für sich oder in Mixtur (5·0 bis 20·0 : 150·0); ext. wie Acetum *(100=24)*.

Acetum aromaticum. Riech*mittel.*

*°† ***Acidum arsenicosum*** (*Arsenicum album*) 0·001 bis *0·005 ad. 0·006!* p. d. ad *0·02!* p. die (Ph. Germ. 0·005! p. d. ad 0·02 p. d.) in Pillen oder Lösungen; ext. als Aetzmittel, als Streupulver, Salben und Pasten (0·1—0·3 : 20·0); zu Bäd., Umschl. (1/20—3/10%), Inject. (1/2—1%) *(1=3)*. —

*†‡ **Solutio (Liquor) arsenic. Fowleri** (100 Th. = 1 Th. der Säure); 2 - 10 Tf. (0·5 p. d. 1·2 ! p. die); ext. zu subcut. Inj. f. sich (1—2 Tpf.) oder verdünnt (1 : 1—3 Aq.) *(1 = 3)*. — **Solut. arsenic. Bietti** (Ammon. arsenic. 1 : 500 Aq.) in 5 b. 10mal grösserer Dosis als die früheren; ebenso **Solutio arsenic. Pearsonii** (Natr. arsen. 1 : 600 Aq.) *(1=2)*. — **Pilulae asiaticae** Acid. arsenicos., Piper nigr mit Gummi Arabic.) 1 Pille = 0·005 Ars. nitr. (*1 St.* = 2). — **Pulv. arsenicalis Cosmi** (Acid. arsenic., Sang. dracon., Carb. animal., Cinnabaris) z. Salb., Aetzpast., Streupulv. etc.

A. aseptinicum (wässerige Lösung von Borax (5·0) in 100·0 Wasserstoffsuperoxyd (3%) mit oder ohne Acid. salicylic. *(10=40)*.

— *° **benzoicum (sublimat.)** (Flores Benzoë) 0·03—0·5 p. d. m. t. als Expector.; bei Polyarthritis 0·5—1·0 1—3stündl. ad 10·0—12·0 p. die in Pulv., Mixtur.; ext. zu Inhalat., Verbund. (5—10%), zu Cigaretten, Rauchpapier *(1=8)*.

— *° **boricum (boracicum)**. 0·2 bis 1·0 p. d. m. t. ad 5·0 p. die in Pulvern, Pillen, Lösung.; ext. als Streupulver; in Lösung (1—5%) zu Waschungen, Injectionen, Mund- u. Gurgelwässern; zur Wun-

als Borglycerin (92 Th. Glycerin, 62 Acid. boric., Borlint. Borwatta (10 b. 20%), Borphenollint; zu Salben. Suppositor. (20 bis 25%) *(10=6)*.

— °**Ung. A. b.**

A. boro-salicylicum ext. wie Salicylsäure *(1=5)*.

— **camphoricum** (Antiseptic.) 0·5—1·0 p. d. m. t. ad 6·0 p. die. *(1=18)*.

— ***†carbolicum crust.** (Acid. phenylicum, Phenolum) *0·01—0·10! p. d. m. t. ad 0·50! p. die in Pill., spirit. Lösung., Emuls., ext. als Aetzmittel (5 bis 30%); zur Wundbehandl. a. Antiseptic., Verbandmittel (Carbolgaze, Carbollint, Carbolseide), in wässerigen, spirituös. u. ölig. Lösungen m. Colod. (1 : 10 Col. elastic.): zu Waschungen, Pinselu g., Inhalationen, Einreib., Einspritzungen, Klyst. (1/10—15% Lösung); zu Linimenten, Salben (1 : 5 bis 50 Ol. Glyc., Linim. Calc.); als Carbolspray (1—5%); Riechmittel; zu hypodermat. (0·1—0·2 : 10 Aq.), zu parenchymat. Injectionen. (1 : 50 Aq.) *(100=55)*. °**crudum** nur ext. zu Desinfection. pur oder in Lösung (1 : 20 bis 50) oder als Carbolpulver mit ander. Stoffen *(100=12)*. — ***°liquefactum** (10 : 1 Aq.) als Aetzmittel wie oben *(10=6)*.

cathartinic. int. 0·05-0·15 in *Pulv.* (Purgans) *(0·1=2)*.

— **chloronitrosum** (Aq. regia) s. *Acid. nitr.* *(10=6)*.

— ***°chromicum** als Aetzm. pur oder verd. (1 : 20—50 Aq.) z. Pins. *(1=6)*.

A. chrysophanicum (s. Chrysarobinum).

— **cinnamylicum**, zu intraven. und subcut. Inject. (bei Tuberculose und Lupus) *(1=16)*.

— ***°citricum**, 0·3—1·0 p. d. m. t. in Pulv., Saturat., Brausemischung, Limonaden (ungef. 2·0—2·5 d. Säure entsprechen einer Citrone); ext. zu Pinselung. (1 : 10 Aq.); zu Waschungen, Mund- und Gurgelwässern (1—2%) *(10=18)*.

— **cubebicum** (Cubebensäure) 0·3—0·5—0·75—1·0! p. d. m. t. ad 5·0! p. die in Pill., Bol.

— °**formicicum** als Rubefac. u. Aetzmittel; pur od. verdünnt (1—10% wässeriger od. spirit. Lösung) *(10=8)*.

— **gallicum** (Gallapfelsäure) 0·5—0·6 p. d. m. t. in Pulv., Pill., Solut., ext. zu Mundwässern (1—5%), Augenwässern (1/2 2%), Inject. (1%), Pinselung (1 : 6 Glycerin) *(10=22)*.

— **gymnemicum** (Gymnemasäure) ext. zum Bepinseln der Zunge in 1% wässeriger Lösung (bei Paragensie).

— **hydrobromicum dilutum** (10%), b. Krampfhusten, Vomitus gravidar., disp. Zuständen, Ohrensausen in starker Verdünnung (1 : 100—150 Aq.), 2—20 Tpf. p. d. m. t., stündl. bis 2stündl. (ad 40! Tpf. p. d. u. 200 Tpf.! p. die); ext. zu Pinselungen u. antisept. Verbänden *(10=15)*.

— ***° hydrochloricum** (Acidum muriaticum), conc. pur. (c. 2%, Ph. G. 25%) (10=4) u. **A. hydrochloric. crud.**

(100 = 10) (3% Chlorwasserstoffgas) ext. pur als Aetzmittel; zu Mund- u. Gurgelwässern (1—3%), Inhalirsäften (1—3 : 25—30 Mel oder Syrup); Waschungen, Umschlägen (1—2%), zu Bädern (60·0 bis 120·0 zu einem Vollbad, 30·0—60·0 zu einem Fussbad). — *°dilut. (12% Chlorwasserstoffgas) 10—30 Tpf. p. d. m. t. ad 5·0—10·0 p. die, mit Aq. (1 : 100—200) verdünnt als Getränk, in Mixturen und Tropfen *(10=4)*.

A. hydrocyanicum (Cyanwasserstoffsäure, 2% der freien Blausäure), $^1/_5$—1 Tpf. (0·01—0·05!) p. d. m. t. ad 0·2 p. die in Tpf.; ext. a. Pinselwässer (0·25 bis 0·5 : 5·0 Aq.), Augenwässern (0·05—0·25 : 5·0 Aq.) und Salben (0·5 : 5·0 Fett) *(0·10=2)*.

— **hydrofluoricum** ($1^1/_2$%) 10 b. 30! Tpf. p. d. in starker Verdünnung 3mal tägl.; ext. zu Inhalationen und Verbänden (0·5—1·0 : 500) *(10=2°)*.

— **hydrojodicum** 0·5—2·0 p. d. 2—5 m. t. mit Aq. verdünnt.

— **hyperosmicum** (Acid. perosmicum, osmicum) 0·001 p. d. m. t. verdünnt mit Aq., besser in Pill. (0·015! p. d. und 0·05! p. die bei Epilepsie); subcut. in 1% Lös. $^1/_3$—1 Pr Sprtz. 1 m. t. (bei Neubildg., Kropf, Neuralgien) *(0·1=140)*.

— **jodicum** 0·1—0·3! p. d. m. t. ad. 1·20! p. die in verdünnter Lösung oder in *Pill.*; *ext.* in Salb. oder *subcutan* (1 : 5—10 Aq.) *(1=30)*.

A. kakodylicum (Dimethylarsensäure) int. in Form d. Natriumsalzes, s. Natrium kakodylicum.

— **kreosotinicum** (Antipyretic.) wie Acid. salicylic. *(1=16)*.

— *°**lacticum**, 5—20 Tropfen (0·3—1·5) p. d. m. t. in wässerig. Lös. (1 : 200 Aq.) Pastillen. ad 10·0 p. die; ext. zu Inhalat. (15—20 Tropf. : 15—30 Aq.); als Mund- und Gurgelwasser (1 : 100—150 Aq.); z. Pinselungen (1 : 5—10 Aq.); zu Injectionen und Verbandwässern (1—2%); zu Aetzungen tuberculöser Geschwüre pur od. 50 b. 80% Lösung, zu Pasten *(1=6)*.

— **naphtylamin - sulfonicum** (Naphtonsäure) int. 0·5 m. m. t. in Pulvern (bei acutem Jodismus, chronischer Cystitis).

— *°**nitricum conc. pur.** (c. 48% der reinen Säure) *(10=5)*. Aetzmittel wie das noch einmal so starke *°**Ac. nitriconitrosum** (fumans) pur oder mit Baumwolle verdickt als Acid. nitricum solidefact. *(100=44)*.

— *°**dilutum pur.** (ca. 21%) 5—15 Tpf. (0·5—1·0) p. d. m. t. stark verdünnt a. Getrk.; in Mix., Tropf., Pill. (unzweckm.) *(10=4)*.

— **chloronitros. (Aq. regia** = A. nitric. 1, A. hydrochl. 2) 1·0—2·0 z. 150·0—200·0 Aq. esslöffelweise; ext. zu Bädern u. Fusswaschungen (30·0—50·0) *(10=6)*.

— **oleïnicum.** Zur Pflasterbereitung (Dieterich'sches Heftpflast.) u. z. (Oleat *(1=10)*.

A. oxalicum. 0·05—0·3 p. d. m. t. in Pulv., Solution (1%) esslöffelweise; ext. auch Mundwasser (½–1%) *(10=15).*

— ***° phosphoricum.** (16%. Ph. G. 20% reine Säure), 10 bis 30 Tpf. (0·5—1·5 p. d. m. t. ad 10·0! p. die als Getränk stark verd. (½—1%), in Mixtur. (2·0 b. 10·0 : 100·0), in Pillen (auf ⅓ eingedampft); ext. z. Mundwässern, Verbandwässern (1—4%) *(10=5).* — **siccum (glaciale)** 0·1 bis 0·3 p. d. m. tägl. in Pillen *(10=20).*

— **picronitricum** (picrinicum, carbagoticum; Welter's Bitter), 0·1—0·25, 0·5! p. d. m. t. ad 1·5! p. die in Pillen oder Lösungen; ext. bei Verbrennungen, in der Eczemtherapie, in ½% wässeriger Lösung *(10=25).*

— ***° pyrogallicum** (Pyrogallussäure), ext. in alkoh. Lösung (5—30 : 100) und in Salben (1 : 10—20 Vaselin od. Lanolin), als 10—40% Pflastermull *(1=8).*

— ***° salicylicum** (Antisept. u. Antipyret.), 0·15—1·0 p. d. 1—3stdl. ad 2·0—8·0! p. die in Pulvern, Pillen, Lösung., Mixt., Emuls.; ext. als Streupulver (pur od. 1·50 Amylum, Talcum, Carbo etc.), Zahn- und Schnupfpulver (0·1—1·0 : 10—100 Carbo, Sacchar., Acid. tannic. etc.), zu Insufflat. in Pharynx u. *d. Mund*höhle (1 : 5—50); *in Lösgn.* zu Verbänden *(3 bis 10%)*, Salicylwatte, *-Jute*, als Salicylwasser *(1 : 20—300* Aq.) zu Waschungen, Mund- und Gurgelwässern (1 : 300 b. 500 Aq. mit Zusatz von Spirit. Vini, aromatisch. Wäs-ern, Glycerin); zu Inhalationen (1 : 500 bis 1000 Aq.), Injectionen (1 : 300—100 Aq.), zu Klystieren (3·0—8·0 als Antipyreticum u. 1·0—3·0 als locales Antisepticum); zum Ausspül. d. Darmes; zur subcut. Injection (unzweckmässig; 1 : 600 bis 1000 Aq.); zu Pflastern (1 : 2 Empl. diachyl.), Salben u. Linim. (1 : 10—50) *(1 = 3).* — **A. borosalicylicum** (Ac. borac. 1, Ac. salicyl. 2, Aq. 5, Spir. 10 z. Trockene verdampft) *(1 = 5).* — Pulv. salicylic. c. Talco (P. c. pudores pedum: A. salicyl. 3. Amyl. 10, Talc. 87).

A. salicylosum (Acid. spirituosum) 0·1—0·5 p. d. m. t. in alkohol. Lös. od. mit einem Syrup.

— **sclerotinicum** (Sclerotinsäure) 0·15—0·25—0·3 p. d. m. t.; subc. (1 : 10 Aq.) 0·01—0·06! p. d. ad 0·25! p. die *(0·1=12).*

— **silicicum** (hydrat.); wasserhältige Kieselsäure, 0·06 bis 0·1 p. d. 2mal t. in Trochiscen, Pillen, Pulvern, alkalischen oder sauren Lös. *(10=18).*

— **sozolicum** (Sozolsäure, Aseptol, 83% der reinen Orthophenolsulfonsäure), Antisepticum und Antifermentativum. Wie Salicyls.; ext. nur in 3—10% wässer. Lösung.

— **succinicum** (Bernsteinsäure) 0·3—1·0 p. d. m. t. in Pulv., Pill., wässerig. u. alkohol. Lösung; ext. zu Mund- u. Gurgelwässern



(1:10 b. 50), zu Pinselung. (1 : 5 b. 10 Mel oder Glyc.) *(1=3)*.

A. sulfanilicum (Sulfanilsäure, Para-Amidobenzol-Sulfosäure) 2·0 p. dos. 4·0 p. die in Wasser (b. Jodismus u. acutem Catarrh d. Nase und des Kehlkopfes) *(1=4)*.

— **sulfoichthyolicum** s. Ichthyol.

— **sulfuricum anglicanum** (crudum; 75% Säure) *(100=8)*, ebenso wie ***Acid. sulfuric. conc. purum.** *(10=5)* (96%, Ph. G. 91%) und **°A. sulfuricum** (Ph. G. 94—97%), nur ext. als Aetzmittel pur oder mit Pflanzenpulver (1 : 7—8) als Paste; zu Bädern (1 Th. einer Schwefelverbindung : $^1/_2$—$^3/_4$ Th. der Säure).

— ***°sulfuric. dilutum** (100 A. s. conc.: 476 Aq.) 0·25 - 1·5 p. d. m. t. in Pill., Tpf. (5—30 Tpf. p. d.) mit Syrup od. Zuckerwasser, Mixt., Getränk (2·0 - 4·0 ; 500 Aq.); ext. zu Mund- u. Gurgelwässern (1—4%), Pinselsäften (1·0—3·0 ; 25·0), Waschungen *(10=2)*.

— **sulfurosum liquidum** (Aqua sulfurosa), 5—10 Tropfen p. d. m. tägl.; ext. zu Pinselsäften, Gurgelwässern (5 Tpf. : 100 Aq.) *(10=3)*.

— ***°tannicum** (Tanninum, Gerbsäure) 0·03 - 0·4 p. d. m. t. ad 2·0 p. die in Pulv., Pillen, Lösungen (wässer., alkoh., glycerinhält.), *Mixt.* (m. schleim. *Mitteln*, aromat. Wässern *etc.)*; *ext.* pur oder mit *(1:1—10)* Amyl., Zinkoxyd, Borax, Zucker, Bleiweiss etc. als Streu-, Schnupf- und Kehlkopfpulver; zu Inhal., Einspritz. (0·5 b. 1·0—5·0 ; 100—200 Aq.), z. Mund- u. Gurgelwässern (1 : 20—100), zu Bädern (10·0—50·0), zu Klystier. (0·5—2·0 : 100), zu Salben u. Linimenten (1:4—15), zu Supp. (0·2 Tannin zu 2·0 Ol. Cacao : 0·2 Cer. flav.) *(10=20)*.

A. boratum (Ac. tannic. 1 : 3 Ac. boric.) als Streupulv.

— **Bacilla tannica** (aus Tannin und Tragacanth, Glycerin, Gelatin).

— **Collodium tannic.** (1 : 10 Coll.).

— **Glycerinum tannic.** (1 : 4 bis 10 Glycer.).

— **Sapo tannini** (Sap. 15, Tannin 1).

— ***°tartaricum** (Weinsäure) 0·2—1·0 p. d. m. t. ad 10·0 p. die in Pulv., Brausepulver, Trochisci; in Mxt. (4·0 : 30·0—50·0 Syr. : 200·0 Aq.) stündl. 1—2 Essl., als Getränk (5·0—10·0 zu 50·0—100·0 Syr. : 1 L. Aq.) *(10=12)*.

— **thymicum** s. Thymol.

— **trichloraceticum** (locales Causticum) in Substanz od. in 20—25% Lösungen *(1=8)*.

— **valerianicum** (Baldrian-Amylsäure) 5—10! Tpf. p. d. m. t. ad 40! Tpf. p. die in alkoh. od. schleim. Vehikeln (meist in Verbindung mit Ammonium-, Zink-, Eisensalz., Chinin) *(1=35)*.

°**Acoin.** In Lösung an Stelle von Cocain empfohlen; soll minder toxisch wirkend sein. Gleiche Dosirung wie bei Cocain (0·1=14).

Aconitinum (Vorsicht! Wirkungsstärke variabel!) 0·0003—0·001—0·004 p. d. 2—3m. t. ad 0·007! p. d. und 0·04! p. die (Ph. G. Ed III. 0·004! p. d. 0·03! p. die) in Pill., alkohol. Lös. (1 : 60) u. Trochisci; ext. in Salben (1—2 : 60), in alkoh. Lös. (1 : 25—50), zur subcut. Inj. (0·1 mit einigen Tpf. Salzsäure in 10·0 Aq. gelöst u. davon 5—20 Theilstriche einer Pravaz'schen Spritze (ca. 0·001—0·004 p.d.). *(0·01=4).*

— **°Aconiti Tuber**; 0·03—0·1 p. d. 2—3 m. t. ad 0·5! p. die in Pulvern und Pillen.

*°†**Extract. Aconit.** 0·005 b. 0·01 p. d. 2—4mal t. ad 0·03! p. d. und 0·12! p. die (Ph. G. 0·02! p. d. u. 0·1! p. die) in Pill., alk. Lös.; ext. in Lös. (1 : 20 bis 50), Salben (1 : 5—10) und Pflastern *(1=15).* —

*°†**Tct. Aconit.**; 2—10 Tpf. (0·1 bis 0·5!) p. d. m. t. ad 1·5! p. die (Ph. G. 0·5! p. d. ad 2·0! p. die); ext. häufig zu Einreibungen *(10=10).*

Acorus s. Calami Rhizom.

Actol (Argentum lacticum), Antisepticum, ext. in 1‰ wässerig. Lösung subcut. 0·3—1·0 : 100—200 Aq. (0·01 pro dosi et die) *(1=45).*

°**Adeps benzoatus** s. Axungia.

— **lanae**, Salbenconstituens *(10=20).*

— **lanae purissimum** = **Alapurin** (s. dieses).

— ° **suillus** s. Axungia.

Adhaesivum (Hausmann) flüssiges antiseptisch. Wundpflaster zum Bedecken kleiner Verletzungen.

Adonidis vernalis Hb. Infus. aus 4·0—8·0 : 150·0—200·0 Colat. 2—3stündlich 1 Esslöffel *(10=5).*

A. aestivalis Folia, ebenso *(10=5).*

Aerugo. Grünspan. Derivans. In Salbenform 1 : 10·0.

Aesculus hippocastanus. Extr. fluid. Int. 10—15 Tropfen m. tgl. (Gegen die Schmerzanfälle bei Hämorrhoiden) *(1=6).*

*°**Aether (sulfuricus)** 5 bis 20 Tropfen (0·1—0·5) p. d. m. t. ad 8·0 p. die pur in einfachen Vehikeln.; in Kapseln (Perles d'Éther à 5 Tpf.); ext. zu allgem. (9 Aether + 1 Chlorof.) und localer Anästhesie (pur), als Riechmittel, zu Einreibungen (pur oder in Salbenform), zu Klyst. (1·0—1·5 : 100 Aq.), Pinselungen; zur subc. Inj. in Collaps ½—1 Pravaz'sche Spritze *(10=5).* — **A. crudus**, nur ext. wie vorh.

— °**aceticus**, wie d. vorige; ebs. ext. *(10=14).*

— °**bromatus** s. Aethylum bromatum *(1=12).*

— **camphoratus** (Camph. 1, Spirit. Aether. 9) z. subc. Inj. wie oben.

— **jodatus** (Jodäthyl), ext. 1·5—2·0 zum Aufpinseln *(1=25).*

— **methylicus** (Methyläther), zur allgem. und localen Anästhesie 4·0—24·0.

— **Petrolei** s. Petrol.

— **valerianicus** 10—20 Tropf. p. d. m. tägl. ad 5·0 p. die in Tropfen oder Kapseln *(1=10).*

Aethoxy-Coffeinum. Narcoticum. 0·2—0·5 gegen Hemikranie bei Gewöhnung an Coffein (1=120).

Aethylenum bromatum Sedat. und Hypnot. innerl. in öliger Emulsion. 1·0—3·0 2—3m. t. *(1=8).*

— **chloratum** (Chloräthyl. In 10—50 Ccm. enthaltenden Glasgefässen mit capillaren, durch Metallverschraubung verschlossenen Oeffnungen. Liquor hollandic.) 5—20 Tropfen p. d. 3—4m. t. mit Aether, Alkoh., fetten Oelen; ext. als locales Anästheticum. (pur o. m. Aeth) *(10=50).*

Aethylidenum bichloratum wie Chloroform (Verbrauchsmenge z. Narcose grösser als bei diesem) bei Zahnoperationen *(1=40).*

Aethylium bromatum als Sedativum 5—20 Tropf. (0·3 bis 1·0) p. d. 2—4 m. t. auf Zucker od. i. Kaps.; zu Inhal. 0·2—5·0; z. allgm. Anästh. 15·0—60·0 *(1=12).*

— **chloratum** (Chloräthyl, Aethylchlorid, locales Anaesth. *(10=200).*

— **jodatum** zu Inh. b. Asthma 5—10 Trpf. p. d. *(1=25).*

Agaricus albus (Boletus Laricis, Fungus Laric.) als gelindes Drastic. (1·0—2·0 p. d. m. t.), als schweissbeschränkendes Mittel 0·2 bis 0·5 p. d. 2—3m. t. in Pulver, Pillen oder Species *(10=8,* pulv. *10=14).* — ♀ **Agaricinum** (Agaricussäure) als schweissbeschränkendes Mittel 0·005—0·01 p. d. m. t. ad 0·02! p. d. in Pill. (gew. m. Pulv. Doweri, u. Diarrhoe zu verhüten) *(0·10=10).*

— ***Chirurgorum,*** Blutstillungsmittel.

Agathinum (Antineuralgicum, nicht zuverlässig). 0·5 3m. t. in Pulv. *(1=90).*

Agrimoniae Hb. Inf. 10·0 bis 15·0 : 100—150 Col. *(100=32).*

Ailanthi Fol. u. Cort. Inf. u. Dct. 5·0—10·0 : 100—150 C.

Aiodin, durch Tannin aus der Schilddrüse gefälltes Präparat; int. in Pastillen zu 0·1, 0·3 und 0·5.

Airol (Trockenantisepticum) als Pulver, Gaze (10 bis 20%) Salbe, mit Collodium (10%), 10% Emuls. Zu Injectionen (i. d. Harnröhre) (1 : 10 Glyc.) *(1=18).*

Alant-Campher s. Helenin.

Alapurin (Adeps lan. purissimus) Salbengrundlage *(10=20).*

Albumen. Eiereiweiss. *a)* Als deckendes Mittel bei irritativen Hautprocessen. *b)* Bei Vergiftungen mit ätzenden Säuren.

Alcarnose. Künstl Nährpräparat, Albumosen u. Extractivstoffe d. Fleisches, sowie Maltose und andere leicht assimilirbare Kohlehydrate u. Pflanzennährsalze enthaltend; in Kapseln zu 12·0 mehrere Stück p. die

Aletris farinosae Rad. (Tonic. Amar.) Dct. 15·0—30·0 zu 100—150 Col.; in Pulv. 0·6 p. d. m. t. — **Tinctura A. F.** 4·0—8·0 p. d. m. t. — **Ext. A. f. fl.** 0·5—2·0 p. d. m. t.

Aleuronat (Pflanzeneiweiss), künstl. Nährpräparat.

Allylium sulfuratum. Knoblauchöl. Int. zu 0·02 p. dos., 0·3 p. die, subcutan 1 bis 2 Ccm. einer 0·5%igen Mischung mit sterilisirtem Olivenöl.

*♀ **Aloë** 0·02—0·03 p. d. m. t. (Amarum, respective stomachicum) 0·05—0·3 als gelindes Abführmittel 0·3—0·6 ad 1·0 p. d. Drasticum nur in Pil

ext. fast nur noch in Clysmen (0·5 bis 1·25 per Clysma). (Die nicht offic. Leberaloë (Al. hepatica) kann in etwas höheren Dosen gereicht werden.) *(10 = 3.)* — ***°Extr. Aloës** wie Al. 0·02—0·03 p. d. m. t. als Stomachic., als gelindes Abführmittel 0·05 bis 0·2, als Drasticum bis 0·5. *(10=24).* — **Massa pilular. Rufi** (Aloë 60, Myrrha 30, Crocus 10) wie Al. in dopp. so gr. Dosen. — **°Pilulae aloëticae ferratae.** 1—6 P. p. die. — *** Pilulae laxantes** s. Jalapae Tnb. — **Tinctura Al.** als Tonic. u. Digestiv. 5—30 Trpf. p. d. m. t. *(10=10).* — **°Tinct. Al. composita** ½—1 Theelöffel *(10=8).* — **Aloënum (Aloïn)** 0·1 bis 0·2 p. d. purgirend, 0·2 b. 0·5 p. d. drastisch (0·3! p. d. 0·6! p. die), in Pill. oder Glycerinlösung (1 : 5—8) *(1 = 6).*

Alphol. Alphanaphtholsalicylsäureester. Int. 0·5 bis 1·0—2·0 p. dos.

Althaeae *°Fol. *(100=20)* und ***°Rad.** *(10 = 10).* Macer., Inf. und Dct. 5·0 bis 10·0 : 100—300 Col. od. in Species; das Pulver d. Rad. als Consperg. u. zu Pillenmasse; ext. z. Kataplasmen, zu Umschlägen, Mund- u. Gurgelwässern, Augenwässern. Klystier. in Macer. od. Dct. 4·0 bis 15·0 : 100 Col.; zu Inject. (8·0 bis 5·0 : 100 Col.). — ***Species Alth.** (Fol. Alth. *10, Rad. Alth.* 5, Liquirit. *2·5, Flor. Malv.*1) *(100=28).* ***°Spec. emollientes** (Fol. *Alth.* — Malv., herb. *Melilot.* aa. 1, sem. Lin. *2; Ph. G.* dieselb. Drog. u. Flor. Chamomill. aa. 1) *(100=30).* — ***Spec. emoll. p. cataplasmate** (w. d. vorhergehenden grobgepulv.) zu Breiumschl. *(100=48).* — ***°Spec. pectorales** (Fol. Alth. 4, Rad. Liquirit. — Alth., Hord. perlat. fruct. Cerat. — Caric. aa. 10. Flor. Verb. — Malv. — Rhoead., Fruct. Anis. st. aa. 1; Ph. G. Rad. Alth. 8, — Liquirit. 3, Rhiz. Irid. 1, Fol. Farfar. 4, Flor. Verbasc., Fruct. Anis. aa. 2), leicht. Dct. m. Wasser oder Milch *(100=32).* — ***°Syrupus Alth.** theelöffelweise auch als Corrig. u. Constituens *(10 = 5).* — **Tabulae de Alth.** (Eibischtäfelchen).

***°Alumen** (Kali-Alaun) 0·05 bis 1·0 p. d. m. t. ad 5·0 p. die (8·0 p. die verursachen Erbrechen, Diarrhoe und Kolik) in Pulv., Pill., Boli, Lös., Molken (s. unten); ext. als Aetzmittel pur od. geschm. (Alaunstifte, Crayons de Alun); Streu-, Schlund-, Kehlkopf-, Schnupf- und Augen-Pulver (pur oder 1 : 2—5 Zucker etc.); in Lösung als Pinselsaft (1 : 10—15). Mund-, Gurgel-, Augenw. (0·5 bis 1·0 : 100—200). Inhalat. u. Klyst. (0·5—2·5 : 100—150), zu Waschungen (5·0 bis 10·0 : 100), Bädern (200·0 für ein Vollbad. 15·0—20·0 f. 1 Fussb.); in Salb. (0·1 b. 2·0 : 10·25) *(10=3).*

— **Serum Lactis aluminatum** (1 : 200 Milch), ¼—½ Lt. p. die. — **plumbosum** s. Talcum praep.

— ***° ustum** (Al. calcinatum) nur ext. (wirkt stärker al

Al.) als Streu-, Schlund-, Kehlkopf- u. Augenpulv. (wie ob.) *(10=8)*.

Alumina hydrica (hydrata, Argilla pura) 0·2—1·0 p. d. m. t. in Pulv., Mixt.; ext. als Streupulver und Zahnpulver *(10=16)*.

*° **Aluminii acetici Liquor** (Aluminium aceticum; Argilla acetica) 5—20 Tpf. (0·5 b. 2·0) p. d. m. t. in Lös. m. einem Syrup.; ext. pur od. verd. z. Umschl. (1 : 5—20), Verb., Wasch. (1 : 5—10), Injectionen ($^1/_2$—1 : 100) *(100=35)*.

Aluminium acetico-tartaricum (essig-weinsaure Thonerde). Adstring. u. Antiseptic. nur ext. pur oder in Lösung zu Mund- und Gurgelwässern (1—2%), Inject., Pinsel. (5—50%), Wundbehandl. (1—3%) *(1=3)*. — **borotannicum** s. Cutol. — **boro-tartaricum** s. Boral. — **chloratum** (fälschlich Chloralum gen.), nur ext. als Antisepticum in Lösung (1—10%). — **hydratum** (s. Alumina hydrica). — **salicylicum** s. Salumin. **A.** *°**sulfuricum** wie bei Alumen *(10=4)*.

Alumnolum (Adstring.). Ext. als Spülmittel in 0·5—2% Lösung; bei torpiden Geschwüren in 3—6% Lös. und Salben; in 10—20% Stäbchen (bei Endometritis); als Streupulver in d. Dermat. *(1=10)*.

Ambra (grisea u. nigra) 0·06 bis 1·0 in Pulv., Pillen, Trochisc., Tinct. *(0·01=20)*.

Aminoform, s. Urotropin.

***Ammonia** (pura liquida); *Liquor Ammonii caustici, Ammoniak*; circa 10% wasserfreies Ammoniak, 3—20 Tpf. (0·1—0·5) p. d. m. t. stark verdünnt u. mit schleim. Vehikeln; ext. als Riechm., Inject. (5—15 Tpf. : 60—100), Waschungen u. Einreibung. (2·0—6·0 : 25—100 Aq.), Inhalationen, Klystieren (5—10 Tpf. p. d.), Salben und Linimente (1 : 5—10), hypoderm. (1 : 5—10), intravenös (1 : 2—20) *(10=3)*. — *° **Liq. Ammon. anisat.** (Ol. Anisi 1, Alkohol (90%) 20, Ammon. 5, Ph. G. 1 : 24 : 5) 3—20 Tpf. p. d. m. t. ad 5·0 p. die; ext. als Riech- und Inhalationsmittel; hypodermat. 5—10 Trpf. p. d. *(10=10)*.—Zu Einreibungen dienen: *°**Linimentum ammoniatum** (L. volatile; Ol. olivar. 4, Amm. 1) *(10=6)*. — °**Liniment. ammoniato-camphoratum** *(10=10)*. — *°**Liniment. saponato-camphoratum** (Bals. Opodeldoc) *(100=60)*. — °**Liniment. saponato-camphorat. liquidum.**

*°**Ammoniacum** (Gummi resina A., A. depuratum) 0·3—1·0 p. d. m. t. ad 5·0 p. die in Pill. o. Emuls.; ext. zu Pflast. *(100=50)*.

***Ammonium acetic. solut.** (Liquor ammon. acetic. c. 15% essigs. Ammonium) 2·0—10·0 p. d. m. t. pur in Mixt. (10·0—50·0 : 100, od. m. diaphoret. Mitteln) ext. zu Gurgelwässern u. Einreibungen *(10=12)*.

— **benzoicum** s. Natrium benz. (1=6).

— *°**bromatum** s. K. bromat.

— *°**carbonicum** (Sal Alkali volatile) 0·2—0·6 p. d. t. ad 2·0 p. die in Pu

Lös., Mixt., Saturat.; ext. als Riechm., in Waschw., Salb., Liniment. *(10=3).*
— **Aq. Am. bicarbonici** (1 Flasche zu 200·0 Inhalt. enthält 0·2 Ammon. carbonic.). — **Am. carbonic. pyro-oleosum** (Sal volatile Cornu cervi) wie oben *(10=3).* — **Liquor Am. carbonic. pyrooleos.** (Spiritus Cornu cervi), 15 bis 30 Tpf. p. d. m. t. *(10=3).*

A. causticum. Salmiakgeist: als Riechmittel bei Ohnmachten. Zu Waschungen nach Insectenstich, als Excitans bei Collaps, 0·1—0·5 in starker Verdünnung.

—*° **chloratum** (Sal amm. depur.) 0·2—1·0 p. d. m. t. ad 10·0 p. die in Pulv., Pill., Elect., Lös., Mixt.: ext. als Riech-, Streupulv.; zu Mund- u. Gurgelwässern (1 bis 3 : 100), Waschung, Bädern (50·0 b. 100·0). Fomentationen, Pinselsäften (3 5 ; 25) ; Injectionen, Inhalation.; Salben u. Liniment. (1 : 5 bis 10) *(10 = 4)* — Tablettes pectorales, Salmiak-Pastill. — ° **Am. chlorat. ferrat.** (Ferrum ammoniatum) 0·2—1·0 p. d. m. t. in Lös., Mixt. (2·0 - 5·0 : 100) *(10 = 10).*

— **jodatum** (c. 63%iges Jod) 0·1—0·6 p. d. m. t. in Lös.; ext in Salben (1 : 20—50) *(1 = 14).*

— **phosphoricum** 0·5—1·0 p. d. m. t. ad 6·0 p. d. in Lösung *(1 = 32).*

— ***picrinicum*** (picronitricum) *0·05—0·1 p. d. m. t. ad 0·4 p. die. Vorsicht* b. d. *Dosirung! Leicht explodirbar!*

*° **A. sulfoichthyolicum s.** Ichthyol.

— **valerianicum** 0·1—0·3 p. d. m. t. ad 1·0—4·0 p. die in Pill., Mixt. *(1 = 15).*

*° **Amygdalae amarae** (Semen Amygd. amar.) in Emuls. mit den süssen Mandeln; ext. in Pulv. u. Pasten *(10 = 5).* — **Amygdalinum** (1·0) entwickelt mit Emulsin u. Wasser: Bittermandelöl (0·5) u. Blaus. (0·06) *(1 = 32).* — *° **Amygd. dulcis** in Emuls. (1 : 10—25 Col.) *(10 = 5).* — * **Emulsio amygdalina** (Amygd. dulc. decorticat. 25 + Sacchar. 15 + 250 Aq.). — *° **Ol. Amygd. amar. aether.** ¼ bis 1 Tpf. (0·01 b. 0·05) in alkohol. od. äther. Lös., als Oelzucк., Emuls. ext. pur od. Lös. zu Einreib., Wasch., in Salb. (0·1 : 10·0) *(1=20).* — *°**Syrup. amygdal. theelw. *(10=8).*

Amygdophenin. Int. 1·0 p. dos., 6·0 p. die (Antirheumaticum und Antineuralgicum) *(1 = 35).*

°† **Amylenum hydratum** (Tert. Amylalkohol). Hypnotic. und Sedativ. 2·0—4·0 in Lös. (diese muss vollst. sein!) p. d. m. t. ad 5·0! p. die; ext. in Klystier *(1=10).*

*° **Amylium nitrosum** (Amylnitrit). 1—5! Tpf. p. d. zu Inhalat., subcutan (1 : 10 Spir.), zu Blaseninject. (3 Tpf. : 100 Aq.) (1=5).

— **valerianicum.** Int. 0·15 p dos. in Gelatinekapse

m. tgl. (Bei Gallen- und Nierensteinkolik.) *(1=10)*.

Amyloform. Antisepticum. Anwend. in Pulverform oder als 10% Gaze *(1=10)*.

*°**Amylum** (Tritici) z. Const. für Pulv., Mucilag., Consperg; ext. Streu- und Waschpulv.; in Klystier. (1—2 Theel.: ½—1 Tasse Aq. aufgekocht) *(100=30)*. — ***A. Marantae** (Arrow-root), meist Nahrungsm. (1—2 Theel. in 1 Tasse Fleischbrühe, Milch, Wasser etc. zu einem Schleim aufgekocht) *(100=65)*.

Amylum jodatum insolubile. Int. zur Jodmedication; ext. als Wundheilmittel zum Ers. d. Jodoforms *(1=5)*.

Analgen (Nervinum) 0·5—1·0 (!) p. d., 3·0 (!) p. die in Pulv. od. alkohol. Lösung *(1=44)*.

Anarcotin s. Narcotin.

Anemoninum (Anemonin, Kampfer der Anemona pulsatilla L.) bei Bronchialcatarrhen, Asthma, Pertussis als Expector. 0·005—0·03! p. d. m. t. ad 0·10! p. d. in Pulv., Pill. oder Syr.

Aneson (auch **Anesin**) 1%ige wässerige Lösung von Aceton-Chloroform. Locales Anästheticum zur subcut. Injection *(1=20)*.

*°**Angelicae** Rad. 0·5—2·0 p. d. m. t. in Pulv.; Inf. 5·0 bis 15·0 : 100—200 Col. *(10=10)*. — **Extract. Angelic.** 0·2 bis 1·0 p. d. m. t. *(1=10)*. — °**Spirit. Angelic. compos.** 10 b. *20 Tpf. p. d. m. t. (10=8)*.

***Angusturae Cortex** 0·2—1·0 p. d. m. t. in Pulv. Dct. aus 5·0—15·0 : 100—200 Col. *(10=5)*.

Anilinum sulfuric. 0·05—0·12 p. d. 1—3 m. t. in Pulv., Pill. u. Lös. (0·05—0·2 : 150); ext. in Salb. (1 : 20—30) *(1=2)*.

Anilipyrin (durch Zusammenschmelzen von 1 Aequivalent Antifebrin mit 2 Aequivalenten Antipyrin dargestellt), int. 0·5 bis 1·0 m. m. t. in Pulvern (Antipyreticum u. Analgeticum) *(0·1=15)*.

*°**Anisi Fruct.** (Semen Anis. vulgar.; Anis.) 0·3—1·5 in Pulv., Latwerg., Inf. 5·0 b. 10·0 : 100—200 Col. *(10=10)*. — **Ol. Anis. vulgar.** 1—3 Tropfen m. t. in Elaeosacchar. *(1=10)*. — ***Spirit. Anis. vulgar.** ½ bis 2 Theel. m. t. *(10=5)*.

***Anisi stell. Fruct.** (Sternanis) w. d. vorangeh. *(10=18)*.

Anthrarobinum s. Chrysarobinum.

Antiarthrin. Pillen aus Extr. aesc. hippocast. m. Salicin und Salzsäure bereitet; (besonders bei harnsaurer Diathese empfohlen).

*°**Antidotum Arsenici** s. Ferr. sulfuricum.

*°†**Antifebrinum** (Acetanilid) 0·25 bis 1·0! p. d. m. t. ad 2·0! p. die als Antipyretic., Rheumat., Neuralg. etc. in Pulv., Pill. u. Lös.; ext. als Antiseptic. in Lös. *(1=3)*.

Antihydorrhin = Borsäure-Salicyläther 10%, Chloräthyläther 5%, Spir. rosar. 85% gegen Hyperhydrosis, zu al täglich bepinseln und bis zur Trockne verreiben lassen.

Antinervin (Salicylbromanilid). Int. 0·5 m. m. täal. (Antineuralgicum u. Antinervinum. Ohne schä Nebenwirkungen. (1=

Antinosin, Natronsalz. d. Nosophen (s. d.), Antiseptic. in 0·5—1% Lös. *(1 = 60).*

Antipyonin. Natriumtetraborat. Streupulver (bei Hornhaut- und Bindehautentzündungen).

*° **Antipyrinum** 0·5—1·0—3·0 p. d. 3-4 m. t. (Kindern 0·2 b. 0·8, 3—4 m. t.) ad 8·0! p. die Mixtur., Pulv. ext. als Streupulv., Klystier. (1·0 b. 5·0), Inj. in Urethra (½ b. 1¼% Lös.) *(1=10).*

— **amygdalicum** s. Tussol.

— **tannicum,** unlöslich, int. in gleichen Dosen wie Antipyrin *(1=13).*

Antisepsin. Paramonobromacetanilid. Int. 0·02—0·05 p. dos. (Antipyreticum u. Antisepticum).

Antiseptin. Mischung von Zinkjodid, Zinksulfat, Borsäure und Thymol. Zur Wundbehandlung.

Antispasminum, Narcein-Natrium — Natriumsalicylat (Sedativ. bes. bei Keuchhusten), int. bei Erwachsenen 0·2—0·5 p. d., 1·0 p. die. Kindern 0·01—0·1 p. d. (mit der 10fach. Menge Aq. amygd. amar.) *(0·1=14).*

Antitoxin, s. Serum.

Antrophore. Zur Behandlung von Affectionen der Urethra, des Uterus, der Nase, des Rectum u. s. w. verwendete, mit medicamentösen Stoffen imprägnirte Stäbchen und Stifte.

Anusol. Jodresorcinsulfosaures Wismuth. Ext. zu Suppositor. (b. Hämorrhoid.).

Anytin. Ein die Löslichkeit verschiedener Stoffe (z. B. *Jod*) *befördernd es Mittel.*

Apiolum cryst. album (*Petersilienkampfer*) 0·25—1·0! p. d. m. t. ad. 4·0! p. die in Pulver und Syrup bei Wechselfieber und Dysmenorrhoe etc. *(0·1=4).*

Apiolinum. Int. zu je 0·2 in Gelatinekaps., mehrmals tägl. (bei Dysmenorrhoe).

Apocodeinum 0·01—0·03! p. d. m. t. ad. 0·08! p. die (Expectorans) in Pill., Lös., Syrup *(0·01=16).*

Apocyni cannabini Cort. (Emeto-Catharticum und Diureticum) Dct. 4·0 bis 5·0 : 200—250 Col. — **Extr. fluid. a. c.** Int. 10—15 gtt. p. d. (Herztonicum) *(1=4).*

Apolysin. Antipyreticum, Analgeticum. Intern in Pulvern zu 0·5 m. m. tägl. *(0·1=4).*

*°† **Apomorphinum hydrochlor.** als Expectorans 0·001 bis 0·005 p. d. in Pulv., Pill., Lösung (in vitro nigro) als Emetic. 0·01! (0·012!) p. d. ad 0·05! p. die; subcut. als Emet. von einer 1% Lösung : 0·001—0·01 (Kindern c. den 4. Theil: in Klystier. 0·01—0·03) *(0·01=4).*

*°† **Aqua Amygdal. amar. conc.** (1000 Th. enth. 1 Th. wasserfreie Blausäure) 0·5—1·50 (10—40 Tpf.) p. d. ad 5·0 p. die! (Ph. G. 2·0! p. d. 8·0! p. die) pur, Tpf., Mixt. *(10=12).* — * **Aq. Amygdal. amar. dilut.** (1000 Th. enth. 0·05 wasserfr. Blausäure). Thee- bis esslöffelweise pur oder in Mixturen *(10=2).*

— * **aromat. spirit.** Theelw. zu Einreib. *(100=30).*

— * **Goulardi** s. Plumb. acet.

— *° **Calcis** (Aq. Calcariae) s. Calcium oxydat.

— *° **carbolisata** (33 Th. flüss. Carbols. u. 967 Th. Wass.)

z. Verb. u. Desinfectionszweck *(100=8)*.

* **A. carminativa** (Flor. Chamom. Roman. 100 Cort. Citr., Fol. Menth. crisp. Fruct. Carv., Coriandr., Foenicul. aa. 30 : 4000 Aq.) theelw. *(100=24)*.

— *° **Chlori** (Aq. chlorata) s. Chlorum solut.

— *° **Cinnamomi** s. Cinnam. Cort.

— *° **destillat.** *(1000 = 30)*.

— ° **Florum Aurantii** s. Aur. Cort.

— *° **Foeniculi** s. Foeniculi Fruct.

— **hydrosulfurata** bei Intoxicat. mit Metallen 150·0 b. 500·0 pur oder verd. mit Wasser becherw. *(10=5)*.

— **Kreosoti** (Aq. Binelli). theelöffelw.: ext. zu Umschlägen, Einspritzung., Mundwasser *(10=3)*.

— †* **Laurocerasi** (10 Theil. enth. 0·6 wasserfr. Blausäure) wie Aq. Amygdal. am. conc. *(10=8)*.

— * **Melissae** als Corrig. z. Mixtur. *(100=24)*.

— **Menthae crispae** z. Mixt. *(100=30)*.

— *° **Menthae piperitae** zu Mixtur. *(100=30)*.

— **phagedaenica** s. Hydrarg.

— ° **Picis** s. Pix liquid.

— *° **Plumbi** s. Plumb. acetic.

— * **Plumbi spirituosa** (Aq. Goulardi) s. Plumb. acet.

— *° **Rosae** s. Rosae Flor.

— * **Rubi Idaei** s. Rubi Idaei Fruct.

* **Araroba** s. Chrysarobin.

Arbutinum bei Blasencatarrh und Nierenleiden 0·5 bis 1·0! p. d. ad 4·0! p. die in *Pulv.* u. Lös. *(0·10=4)*.

° **Arecae Semen.** 4·0—6·0 in *Pulver.* Bandwurmmittel *(10=8)*.

Arecolinum hydrobromicum. 1% wäss Lös. z. Einträuf. (als Myotic. u. b Glaukom).

Arenariae rubrae Hb. als Diuretic. in Dct. 1·0—1·5 zu 100·0 Col. — **Extr. Arenar.** 0·5—1·0 p. die in Pillen u. Mixturen.

Argentaminum. Ext. zu Inject. bei Gonorrhoe 1 : 4000 bis 1 : 1000 (!) *(1=14)*.

Argentol (Argentum chinaseptolicum), zu Streupulv., Salbenm. Vasel. u. Lanol., Emuls., 1 Th. Argent.: 300 — 1000 Th. Flüssigk. (bei Gonorrhoe) *(1=8)*.

Argentum chloratum (muriat.) 0·01—0·1 p. d. 3—4 m. t. in Pulv. u. Pill. *(0·10=5)*.

— **Aq. chlorato-ammoniat.** 0·003 b. 0·01 p. d. 2—4 m. t. in Lös. u. Pill. (Vorsicht!)

— **citricum** = Itrol, s. d.

— **collioidale Credé** zu Salben (s. Unguentum Credé), int. in Pill. (Arg. c. 0·5, Sacch. lact. 5·0, Glycerin q. s. ut f. pil. 50) 2—6 Stück tgl., Lösung, subcut. Injection (1·0 : 200·0) ext. Lösungen (1·0 : 2000·0—10.000·0) zu Umschl. u. Ausspülungen. (Antisepticum) *(1=100)*.

— ° **foliatum** z. Ueberziehen von Pillen *(Lm = 2)*.

— **jodatum** 0·005 p. d. wie Arg. chlorat. *(1=100)*.

— **lacticum** = Actol, s. d.

— †* **nitricum crystallis.** *(1=18)* u. *° † **fusum** 0·005—0·03! p. d. 2—4 mal täglich ad 0·2! p. die in Pillen, Lösungen, Pastill.; äuss. (Ag. nitric. fus.) in Substanz, conc. Lös. (1 : 1—2 Aq.) als Aetzm.; Crayons au Nitrate d'Argent.; verdünnt als Schlund- und Kehlkopfpulver (0·5—1 zu 20—50 Sacchar., be-

Alum. ust.), Inhal. (0·01 bis 0·3 : 100 Aq.), Inject. (0·12—2·0 : 100 0), Pinsel. (1·0 ; 10—100 Aq.), Klyst. (1 : 200—1000 Aq.), Augenwässer (0·1—2·0 : 100 Aq.). Verbandwässern (1—2 zu 100 Aq.), Salben (1 : 10 b. 50) ; subcut. (1 : 2000 Aq.) *(1=22).* — *° **Arg. nitric. c. Kalio nitrico** (Lapis infern. mitigatus 1 : 2 K. nitric.) *(1=12).*

A. oxydatum 0·005—0·05 in Pulv. u. Pill.

*° **Argilla alba** (Bolus alb.) 0·5—2·0 ; als Constituens f. Pill. u. Past. ; äuss. zu Streu-, Zahn- u. Augenpulv., bei Brandwunden (m. Ol. Oliv., Liq. Plumb. subacetic. in Jodoform).

— **rubra** (Bolus Armena) ebenso *(100=35).*

Argonin (Argentum-Casein-Verbindung) ext. in 1 bis 2% Lösung (bes. bei Gonorrhoe) *(1=18).*

Aristol (Dithymoldijodid) in 10% Salb. u. Pv. a. Ersatz f. Jodof. b. Hautkrankh. *(1=55).*

*° **Arnicae Flores** *(10=4)* und ***Radix** *(10=4)* in Pulv., 0·3—1·2 in Pulv. od. Pill., Inf. (aus Flor. 2·0—10·0 : 100 aus Rad. etwas höhere Dos.), Dct. (aus Rad.) 3·0—10·0 : 100, in Spec. ; äuss. als Niesspulv. (Flor.), z. Umschl., Kataplasmen, Klystieren (Inf. 5·0—20·0 : 100). — **Extr. flor.** 0·1—0·5 p. d. — **Extr. radic.** 0·2—1·5 p. d. — *° ***Tinct. Arnic.** *0·5—2·0* p. d.; *äuss z. Einreib. Umschl., Verbänd. u. s. f. (10=10).*

Arowroot, s. *Amylum Maranthae.*

Arsenicum jodat. 0·005—0·015 p. d. 1—3 m. t. m. Pill. ; Salb. 0·05—0·12 : 10·0 Fett) *(0·1=3).* — **Liquor Arsen. hydrojod. et Hydrargyri** (Liquor s. Solutio Donovani) 5—20 Tpf. p. d. 2—3 m. t. (0·5—2·0 p. die) m. schleim. Vehik. — **Ars. sulfuratum citrin.** (Operm.) als Aetzm. u. Depilator *(10=4).*

Arsenhaemol. Int. 0·1 p. dos. 0·3—1·0 p. die in Pillen (100 Theile enthalt. 1 Th. Acid. arsenicosum)

Artemisiae Hb. u. Rad. Hb. wie Hb. Absinthi ; Bad. m. Pulv. 0·1—2·0 p. d. od. Inf. 2·0—7·0 : 100 Col. *(10=3).* — **Ext. Artemis.** 0·1 - 0·5 p. d. *(1=15).* **Hb. Artemis. frividae** (Antitypic.) als Extract. fluid. 2·0—8·0 p. d. m. t.

*° **Asa foetida** (Gummi resina depurat.) 0·2—1·0 p. d. ad 5·0 p. die m. Pill., in Emuls. 2·0 - 6·0 : 100·0 ; äusserl. als Riechm., zu Klystier. 3·00 - 10·0 mit Eigelb. Emuls.) *(10=10).* — *° **Tinct. As. foet.** 20—60 Tpf. p. d. pur od. in Mixt. ; äusserl. wie oben *(10=8).*

Asaprolum (Antirheum. Antitherm.). Ext. 2·0—4·0 p. die in Pulv. od. Lös. *(0·1=3).*

Asclepiadis incarnatae Rad. als Ext. fluid. (Diuretic. u. Anthelminthic.) 10—50 Tpf. p. d.

Aseptolums. Acid. sozolicum.

Asparaginum (Diuret.) 0·05 ad 0·1 ! p. d. ad 0·3 ! p. die in Pulv., Pill. o. Lös. *(0·1=3).*

Aspidium spinulosum. Im ätherischen Extracte. Bandwurmmittel. 4 Grm. 2 St. darauf Ricinusöl.

Aspidosperminum muriatic. (hydrochloric.) 0·001 bis

0·003 p. d. ad 0·006! p. die in Pulv., Pillen od. Sol. *(0·01=12).*

Aspirin (Acetylsalicylsäure) int. 1·0 p. d. 4 0—5·0 p. die in Pulvern *(1=15).*

Asterol 2 - 4 : 1000·0 zum Desinficiren von Metallinstrumenten, d. es nicht angreift (organ. Quecksilberverbindung).

Atropinum †purum u. †*° **sulfuricum** 0·0002—0·001! p. d. ad 0·003! p. die in Pillen, Pulver, Lösung; als Mydriatic. in Lösung. (0·1—1·0 : 100); subcutan. Inj. (0·01—0·05 : 10 Aq.) 0·0002—0·001, mit Morphin. muriat. combinirt (Atrop. sulfuric. 0·02, Morph. muriat. 0·4, Aq. destill. 20·0); in Salben u. Liniment. (0·2—0·5 : 100) *(0·01=4,* sulf. *0·1=34).* — **Atrop.-Gelatine** (Blättchen à 0·0025 Atrop.) als Mydriat.

A. valerianic. int. wie Atrop. sulfuric. *(0·01=5).*

*° **Aurantii fruct. Cort.** (expulpatus = Flavedo Cortic. Aurant.) 0·3 - 2·0 p. d. 2—4 m. t. in Pulv. Spec. Electuar., Inf. 5·0 bis 12·0 : 100, Alkohol - Auszügen *(10=12).* — **Extr. Aurant.** 0·1—0·5 p. d. m. t. *(1=8).* — ***Fol. Aurant.** 1·0 bis 4·0 p. d. Spec. Electuar., Inf. 5·0 bis 15·0 : 100 Col. *(10=8).* — **Flor. Aurant.** ebenso; — als Corrigentia zu Elaeosacchar.: ***Aq. flor. Aurant.** (Aqua Naphae) *(10=6).* — ***Ol. flor. Aurant.** *(0·1=8).* — ***Ol. Aur. cortic.** *(1=10).* — ***Ol. Bergamott.** *(1=6).* — *° **Syr. cort. Aurant.** Corrig. (10·0 bis 20·0 : 100—250 Mixt.) *(10=5).* — **Syrup. Aurant. flor.** ebenso. — *° **Tinct. aurant. cortic.** 20—60 Tpf. p. d. m. t., Corr. *(10 = 8).*

°† **Auro-Natrium chloratum** 0·003 bis 0·03! p. d. 1—2 m. t. ad 0·05! p. die (Ph. G. 0·05! p. d. ad 0·2! p. die) in Pulv., Pill., Pastill., Lösung. (in vitro nigro); in Augenwäss. (0·1 bis 0·2 : 100), Salben (0·03 bis 0·2 : 5) *(0·10=46).*

Aurum chloratum 0·002—0·01 in Lösung.; ext. als Aetzmittel (Landolfi'sches Verfahr. geg. Krebs) *(0·1=75).*

— **foliatum** (Blattgold) zum Ueberziehen von Pillen. *(Lm=10)*

— **jodatum** (0·004—0·01 (geg. Syphilis) in Pulv., Pill.; zu Salben 1·0—2·0 : 100).

— **oxydatum** 0·005—0·05 p. d. 2 3 m. t. in Pulv., Pill.

*° **Axungia porci** (Adeps suillus), Constit. für Salben *(100=40).*

— ***porci benzoata** *(10=8).*

— ***Unguent. simplex** (Axung. 4, Cer. 1) *(10=8).*

*° **Balsamum Copaivae** 10 Tpf. aufsteig. bis 60 Tpf. p. d. (0·5—3·0 p. d. 1·0 = 20—25 Tpf.) ad 20·0! p. die pur, am häufigsten in Kapseln (Capsules gélatineuses au Copahu; zuweil. combin. mit Extr. Cubeb. aa.; mit Extr. Myrrh. u. Ferr. pulverat.; mit Myrrh. u. Ferr sulfuric.; mit Pepsin u. Bismut. subnitric.), in Pill., Bissen, Electuar. (in Oblaten), Emulsion (mit Gummi Arabic.), Schüttelmixt., Gallerten (Bals. Copaiv. solidificatum in Oblaten); zu Einreibung, pur oder mit Fett., Oel.; Klystieren (bis 20·0 i. Emuls.) (10=1

ng der gebräuchlichen mometerscalen.

R. = Réaumur, F. = Fahrenheit.

5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
28	28$_5$	29$_6$	30$_4$	31$_2$	32	32$_8$	33$_6$	34$_4$	35$_2$	36
95	96$_7$	98$_6$	100$_4$	102$_2$	104	105$_8$	107$_6$	109$_4$	111$_2$	113

e Eintheilung von Réaumur und Celsius
Gefrierpunkt (= Nullpunkt) und Siedepunkt
mt 80, Celsius 100 Grade an. Bei Fahren-
Nullpunkt tiefer, und zwar da, wo eine Wein-
bersäule in einer Kältemischung aus Salz und
zu stehen kommt. Von da bis zum Siedepunkt
t er 212° an.

7. Uebersicht

llen, sowie der wichtigeren nicht n Arzneimittel, ihrer Dosirung und endung, sowie ihrer Preise.

ittel der Ph. Austriaca (Ed. VII. ex 1890) sind mit *, die
ca (Ed. III. ex 1890) mit ° bezeichnet. Die mit † bezeich-
ittel finden sich in der Tabelle für Maximaldosen.

d. = pro dosi; m. t. = mehrmals täglich.

n Lettern gesetzten Zahlen vor dem = bedeuten Gramme,
dem = den Preis für dieselben in Hellern. Die Preise der
tel sind nach der „Arzneitaxe f. d. Jahr 1899", diejenigen der
inellen Mittel nach den neuesten Preislisten angegeben.

torii Sem. (Je-
Inf. 0·5—1·0 ;
zu Bähungen u.
ionen bei Augen-
eiten *(10=6)*.

Herba; Inf. 5·0—
00 Col.; Pulv. 0·5—
(10=12). —°**Extr.** 0·5
=8). — **Ol. aether.**
Tpf. p. d. *(1=20)*. —
Abs. und ***Tinct. Abs.**
t. 20—60 Tpf. m. t.
3·0) m. t. *(10=8)*.
Bitterstoff aus Ar-
absinthium; int.
2mal t. *(0·01=4)*.

°† **Acetanilidum** siehe Antife
brinum.

Acetalum (Diaethylacetal
Hypnotic. u. Anaesthet
8·0—12·0 p. d. in Emu
u. Mixt.; ext. in Kly

Acetonum (Spir. pyroac
depurat.) 5—20 Tpf. m
ad 5·0! p. d.; ext. zu
hal. 0·1—1·0 : 100·0
zu Einreib. u. Wasch
als Liniment *(10=8)*.

Acetphenetidinum (Ant
0·1—0·7 stündl.; (
cetin Bayer, Ace
tidin) 0·5—1·0 au
(Neuralgicum) (

Acetphenylhydrazin = Hydracetin.

** **Acetum (purum)** zu Sorrat., selten zu Mixtur. (6% Essigsäure enthal.) 25·0—50·0 : 150·0; als Getränk 100·0—150·0 : 1 Liter Zuckerwasser; ext. zu Mund- u. Gurgelwasser 20·0—50·0 : 150·0; zu Waschungen, Umschlägen, Injectionen (pur od. mit Wasser ää. zu 50·0—100·0 pur od. verd.).

** **Acetum aromat.** zu Sorrat.; z. Mixtur. 25·0—50·0 : 150·0; ext. als Einreibemittel, zu Abwaschungen (100·0—200·0).

— **pyroligneum** ... ext. zum Einathmen (1—10%), zu Spülungen, Pinselungen, Einspritzungen.

— **... rectificatus** ... (10- zu 100·0) ... verdünnt zum ... Wasser, zur ... z. ... (2·5—5·0 ... Umschläge, ... zu 100·0—150·0).

* **A. Sellae** ...

* **Aether** ... Essigäther ... Aether z. ... Kollodium ...

— ** ... ätherisch ... mit ... Aether ... Aether ... Aether ...

Acetum ... mixtum.

* **... plumbicum** ... solutum, ... Wasser ... Bleiessig.

B. Gurjunae wie **Bals. Copaiv.** *(1=2).*

— **de Mecca** (sehr feines Terpentinöl) wie Terebinthin *(1=8).*

— *° **Peruvianum** 0·2—1·2 p. d. (3·0 5·0 p. d.) in Pill., Pastill., Electuar., Emuls. (5·0—10·0); zu Einreib. (als Krätzmittel 10·0—15·0) zur Wundbehandlung (wunde Brustwarzen etc.) in Salben, Cerat., Liniment., in spirituöser Lösung u. Emuls. zu Mundwässern, Zahntinct., Ohrtropf.; zu cosmetischen Zwecken (Pomaden etc.) *(10=50).* — **Syrup. Bals. Peruvian.** (S. balsamicus: — Expector.) 1 Theel. u. Essl. p. d. Corrig. u. Constit.

— *° **Tolutanum** ebenso *(10=25).*

— * **vitae Hofmanni** (Mixtur. oleoso-balsamica) 5—20 Tpf. p. d.; Riechmittel, zu Einreib., Waschung., zu cosmetisch. Zwecken *(10=15).*

Baptistae tinctoriae Rad. als Extr. fluid. 5—15 Tpf. p. d. **Baptisin** (Resinoid) 0·1—0·4 p. d. in Pill. (Purgans, Emeto-Cathartic., Cholagog.)

* **Bardanae Rad.** in Spec., Dct. (10·0—50·0 : 100—500 Col.) *(10=4).* — **Extr. Bardan.** 0·5 bis 1·0 p. d. *(1=6).*

* † **Belladonnae Rad.** 0·01-0·07! p. d. ad 0·3! p. die in Pulv., Pill, Inf. (0·3 bis 1·0 : 100 Col.); ext. in Inf. als Augenwasser (0·5 bis *1·5 : 100), Inhalat.* (0·5 bis *1·0 : 100), Inject.* (1·0—4·0 *zu 100), Klystier.* (0·05 bis *0·5 : 100—150),* Umschlägen *(2·0—5·0 : 100),* in Salben (1 : 5—10), **Linimenten** *(10=5).* — **Ext. rad. Bellad.** 0·01—0·05! p. d. ad 0·1! p. d. in Pulv. Pill., Lösung *(1=15).* — *° † **Fol. Bellad.** 0·05—0·2! p. d. ad. 0·6! p. die in Pulv., Pill., Inf. (0·5—1·5 : 100); als Rauchmittel (Cigaretten), in Inf. (0·5—5·0 : 100) zu Verbandwäss., local. Bädern. Fomentat., Injection., zu Inhalat. (0·5—1·0 : 500), Klystieren (0·1—1·0 : 100), Augenbähungen (3·0 bis 6·0 : 100), Augenwässern (1·0—3·0 : 25) *(1=2).* — *† **Extr. Fol. Bellad.** 0·01-0·05! p. d. ad 0·2! p. die *(1=15).* — *† **Tinct. fol. (rad.) Bellad.** 1—10 Tpf. (1·0! p. d. ad 4·0! p. die) *(10=12).*

Benzinum Petrolei (Benzin) 0·2—1·0 (5—25 Tpf.) in Mixt. od. schleimigen Vehikeln; zu Einreib. (1 : 2—4 Fett), Klystieren (3·0—8·0 : 500), Inhalat. *(100=22).*

*° **Benzoë Resina** 0·2—1·0 p. d. in Pill., Emuls.; z. Zahnpulvern, Räucher., comm. Zwecken *(10=15).* — *° **Tinct. Benz.** zu Waschw., Umschlägen *(10=10).*

Benzojodhydrinum. Als Ersatz für Jodkali. 0·13 entspricht 1·0 Kal. jodat. In Pillen.

Benzolum wie Benzin 1·0! p. d. ad 6·0! p. die *(10=8).*

Benzonaphtolum, int. 0·5 p. d., 1·5—5·0 p. die in Oblaten als Darmantifermentativ. *(1=5).*

Benzosolum v. Guajacolum benzoicum.

Berberidis aquifolii Rad. als Extr. fluid. (Tonic. und Alter.) 15 Tpf. b. 1 Theel. p. d. 2—4m. t. — **Berber**

num phosphoricum 0·02 bis 0·05 ad 0·3 p. die in Mixt. — **Berberin. muriaticum** 0·06! p. d. ad 0·24! p. die *(1=8)*.

Betolum (Naphtalol) (b. Blasencatarrhen, Gelenkrheumatismus, Fäulnissprocess im Darmcanale) 0·3—0·5 p. d. 2—4m. t. ad 2·0 p. die in Pulv. *(1=10)*.

Betulae Extractum, 1·0 in Wasser gelöst als Diureticum *(1=8, fluid.10=8)*.

Bismal (Methylendigalluss. Wismuth). Int. 1·0 p. dos., 2·0—4·0 p. die in schleimigem Vehikel (Darmadstringens) *(1=16)*.

Bismuthol, int. 0·5 m. tgl. (Antisepticum und Adstringens) *(1=40)*.

Bismuthum β-naphtholicum (Orphol) Darmdesinficiens 0·25—0·5 3m. t. i. Pulver oder Pillen *(1=20)*.

— **carbonicum** wie Bism. subnitric. *(1=8)*.

— **citricum** wie Bism. subnitric. *(1=10)* — **B. ammoniato-citric.** 0·2—0·5 p. d. 2—4 m. t. in Pulv., Lös.

— **lacticum cryst.** 0·05—0·3 p. d. 2—4m. t. *(1=8)*.

— **loretinicum.** Ext. als Streupulver, 10% Salbe. Int. zu 0·5 ein od. mehrere Male tgl. in Kapseln.

— **oxyjodatum** (subjodatum) 1·0—2·0 p. die; Streupulv., zu Salben *(1=20)*.

— **peptonatum** 2·0—5·0 p. d. *(1=8)*.

— **phosphoricum solubile.** Int. 0·2—0·5 p. dos., 3·0—4·0 p. die in Pulv. od. wässerig. Lös. (Darmadstr.) *(1=10)*.

— **salicylicum** 0·3—1·0 p. d. 2—4 m. t. ad 12·0 p. die in Pulv., Pill. (Obl.) *(1=8)*. — **B. subsalicylic.** ebenso.

*°**B. subnitricum** (Magister. Bism.) (0·2—1·0 p. d. 2 b. 4 m. t. (bei Brechdurchfall d. Kinder 0·2—0·4 stündl.) in Pulv., Pill.; als Streupulv., Nasen-, Schlund-, Kehlkopfpulver; Inject. (Gonorrhoe) in Schüttelmixt. (4·0—12·0 : 100), Salben (0·5—3·0 : 25) *(1=6)*.

— **tannicum** wie B. subnitric. *(1=6)*.

— **tribromphenylicum** (Xeroform). Int. als Darmantisepticum, ext. als Jodoformersatz *(10=115)*.

— **valerianicum** 0·03—0·2 p. d. in Pulv. u. Pill. *(1=10)*.

Blattae orientales (Diuretic., 0·06—1·0 p. d. in Pulv., Pill., Inf od. Dct. (5·0 b. 10·0 : 100—150) *(1=25)*. — **Tinct., Blatt.** 15—40 Tropf. p. d. *(10=80)*.

Boldo Folia 0·5—1·0 p. d. in Pulvern, Inf. (3·0 bis 5·0 : 100) *(10=20)*. — **Tct. Bold.** 20—60 Tropfen p. d. — **Boldinum** 0·005—0·01 p. d. in Pulv., Pill. *(0·01=40)*.

*°**Bolus alba** s. Argilla alb. *(100=35)*.

B. Armena s. Argilla rubr.

Bonduc (Bondo) Semen (Tonic. u. Febrifug.) in Pulver 1·0—2·0 p. d. 3 m. t. — **Bonduc.** 0·1—0·2 p. die in Pillen.

Boral (Aluminium borotartaricum). Antisept ext. als Streupulv., 10% Salbe.

*°**Borax** s. Natrium boracic.

Boroglycerinlanolin. Extern gegen Eczem. Schrunden, Excoriationen.

Borol (Antisepticum). Int. 5—6mal tägl. 10—30 Tropf. einer 2% wäss. Lös.; ext. 1—2% wässer. Lös. (1=

Bromalbacid. Int. 0·5 p. statt Bromkali (1=

Bromalinum. Int. 2·0—4·0 m. m. tägl. (Ersatz der Bromalkalien) *(1=20).*

Bromalum hydratum (Bromalhydrat) 0·05—0·5 p. d. m. t. in Pill. u. Lös. *(0·1=6).*

Bromidia (Combination aus Bromkali, Chloralhydrat, Ext. hyosciam. und Extr. cannab. ind.) int. theelöffelw. *(10=60)*

Bromipin, Bromfett. int. 3m. tgl. 1 Kaffeel. *(10=50).*

Bromoformium 2—6 Tpf. (je nach d. Alter) m. t. Kind. b. Keuchh. n. d. Mahlzeit in einem Löffel Wasser *(1=6).*

Bromol. (Tribromphenol.) Antisept. int. 0·005 0·015 p. d. ext. zu Pinselungen bei Diphtherie und zur Wundbehandl. *(1=12).*

° **Bromum** 0·003—0·02 p. d. ad 0·1 p. die in Alkohol od. Wasser (Aqua Bromi, bromata: 0·25 : 25·0 Aq.); hievon 5—15 Tropf. p. d. 2m. t. od. 0·05 : 30·0 Aq. theelw.): zu Pinselungen diphtherit. Membr. (0·25 b. 0·5% Lös. od. Bromi, Kali bromat. aa. 1·0 : 10·0 bis 100·0 Aq.), zu Verbandw., Umschlägen, Inject. (0·25—0·5% Lös.); zu Inhal. (1 : 500 o. Bromi, Kali bromat. aa. 0·2, Aq. dest. 100·0), Salben (1·0 b. 2·0 : 50—100 Fett), Liniment; zu Desinfectionszwecken (Platten oder Cylinder aus Kieselguhr m. Br. getränkt) *(0·10=2).*

Tct. Bromi. — **Brom. chloratum** 0·1 p. d. in Lös. *als Aetzm. (0·1=2).*

Brucinum, 0·005—0·1! p. d. *1—3m. t. in Pillen,* Tpf., *(1·0 : 2·5·0 Alkoh.,* hievon *2—25 Tropf. in Mixt.) (0·1=5).* — **Br. nitricum,** ebenso *(0·1=5).* — **Br. sulfuricum,** ebenso *(0·1=5).*

Bryonia. Rad. (Purgans) 0·5 b. 2·0 p. d. in Pulv., Inf. (5·0 bis 15·0 : 100—200 Col.). *(10=8).*

Bryonin int. 0·001 m. tgl.

Buchu (Bucco) Fol. 1·0—1·5 p. d. 3—4m. t. in Pulv., Inf. (5·0—30·0 : 100—200 Col.) *(10=6).* — **Ol. B.** ½—1 Tpf. m. t. — **Tct. B.** 20—60 Tpf. p. d. — **Extr. fl. B.** int. 2·0—4·0 p. d.

°° **Bulbus scillae** s. Scill. Bulb.

Bursa pastoris als Extract od. als Bursa-Pillen gegen Uterusblutung, empfohl. 1—2 Pillen täglich.

Butyrum Cacao s. Cac. Sem.

Buxinum sulfuricum 0·1—0·5 p. d. (Tonic.) u. 1·0—1·5 p. d. (Antipyr.) in Pulv., Pill. u. Lös.

Byrolin = Boroglycerinlanolin.

Cacao Semen (Fabae Cac.). Dct. (15·0 : 100—200). — **Sem. Cac. expressum** (entölter Cac.) *(10=16).* — °° **Oleum (Butyrum) Cacao** 0·5 2·0 p. d. in Pulver, Pastillen, Emuls.; als Constit. zu Salben, Cerat., Stäbchen, Supposit. etc. *(10=12).* — **Pasta Cacao.** (Gesundheits-Chokolade. — **Chokolade.**)

Cacti grandiflorae Tct. (Analeptic.) 5—12 Tpf. theelöffelw. — **Cactin** subc. 0·001—0·005.

Caesium bromatum, int. in Pulv. 0·18—0·3 m. tgl., ebenso **C. bitartaricum.**

Cadmium sulfuricum 0·005 b. 0·01 in Pillen und Lös.; Augenwässern (0·05—0·2 zu 10 Aq.), Inject. (1·0 b. 2·0 : 100), Augensalben

Fett) *(1 = 6)*,
salicylicum.
(Diuret.) 0·3 b.
a Pulv., Inf. o.
0·0 : 100—200 C.
Extr. C. (0·3 bis
1=28).
Rhizoma (Rad.
2·0 p. d. in Plv.,
verg., Inf. (5·0
)0 Col.); Kan-
ufectio Calami,
r *(10 = 8)*. —
0·1—0·5 p. d.
— **°Oleum C.**
p. d. in Lös.,
10). — **°Tinct. C.**
), d.; zu Mund-
Zahntincturen

chlorata s. Cal-
chloros.
Calc. oxydat.
a 0·5—1·0 p. d.;
a bei Intoxicat.
Carbolsäure;
mnung.
ionicum nativum
a), als Streu-
lver etc. *(100*
***° Calc. carb.**
cipitatum, Cal-
hic.) 0·5—2·0 p.
in Pulv., Pil-
Schüttelmixt.;
d Zahnpulver

(fusum) 0·1 b.
n Lös.; Ver-
(1:24), Augen-
(0·1—1·0 : 100),
(3·0—5·0 : 200),
·0 bis 100·0 p.
= 8)*. — **Calc.**
stall. u. crud.
phosphoricum =
d.
rosum (Calcar.
05 bis 0·6 in
chisc. (à 0·06),
suspend. (1·0
b. 2·0 : 100), 0·5—1·0 p. die gegen Chorea; Streu- u. Zahnp., Mund- u. Gurgelwässer (5·0 bis 30·0 : 300), Augenwässer (0·08 bis 12·0 : 100—150). Waschgn. (15·0—30·0 : 500), Bädern (250·0 bis 500·0 p. baln.), Pinselsäften (0·5—1·0 zu 25 Schleim), Inject. (0·02 bis 2·0 : 100) *(100 = 12)*.

C. ***° oxydatum** (Calcar. usta, caustica) nur ext. als Aetzm.: Pasta caustica Vienn. (Kal. caustic. 5 zu Calc. oxydat. 6) *(100 = 12)*. Lapis caustic. Filhosii v. Sigmundi; Kluge's Aetzm. — **Calcaria extincta** (gel. Kalk) zu Aq. Calcis 50·0—150·0 p. d. ad 300·0 b. 600·0 p. die mit Wasser, Milch etc.; zu Inhalat., Mund- u. Gurgelwässern, Inject., Klystier., Pinsel., Umschläg., Verbandwäss. — **Linimentum Calcis** (Aq. Calc., Ol. olivar. aa.) meist bei Verbrennungen.

— **permanganicum.** Ext. in 0·04 - 0·5‰ wässerig. Lösung (Desinficiens).

***° Calcium phosphoricum** (Calcar. phosphoric.) 0·5—5·0 p. d. m. t. in Pulv., Pill., Pastill. *(10 = 60)*. — **° Calc. phosphoric. crudum** (gebr. Knochen) ebenso. — **Calc. hypophosphorosum** 0·1—0·3 p. d. in Lösung *(1 = 5)*.

— **sulfo-carbolicum** 0·3 p. d. m. t. in Lösung.

— **sulfuratum** 0·01—1·0 p. d. 2—4m. t.; meist ext. in Salben (1·0—3·0 : 25), zu Waschung. (5·0 : 100), Bädern (50·0—120·0 p. baln.) *(10 = 5)*. — ***° Calc. oxysulfurat.** zu Solutio Vlemingkx zu Waschung. u. Bädern *(100 = 40)*. — **Calc. s**

furato-stibiatum 0·1–0·3 p. d. 2—4m. t. in Pillen, Pulver, Abkochung. (5·0 : 1000 auf 1000 Col.; tassenweise).

C. *°**sulfuricum ustum** (gebr. Gyps) zu Verbänden *(100 = 5)*.

*° **Camphora** 0·03—0·2 p. d. m. t. (Excit.) 0·3—0·5 p. d. 1—2m. t. (Sedativ.), Pulv., Pill., Biss., Mixt., Emuls., Streupulv., Kaumittel, in Zähne, im Ohre zu tragen (eingehüllt), Kräuterkissen, zu Räucherungen, Inhalat., zu Verbänden, Mund- und Gurgelwässern (0·2—1·0 zu 100), Klyst. (0·3—1·2), Liniment, Seifen (3·0 : 25), Salben (1·0—3·0 : 10—25); zu subc. Inj. (1 : 12 Spir. oder 5 Aether oder in Fett, Oel gelöst; 1 volle Spritze p. d.! als Excitans) *(10 = 12)*. — * **Oleum camphorat.** (1 : 3 Oleum oliv.) *(10=10)*. — *° **Spirit. camphorat.** (1 : 9 Spirit.) zu Einreibungen, Wasch. etc. *(100 = 50)*. — **Vinum camphoratum** (1 : 50·0 Wein) 1—2 Theelöffel. *(10 = 5)*.

Camph. (mono)-bromata 0·1 bis 0·4 p. d. ad 3·0 pro die in Pulv., Pill., Kapseln, Trochisc., Emulsion *(1=5)*. **Camph. carbolisata** (10 Th. conc. Carbolsäurelös. zu 25 Th. Camph. pulv.) zu Verbänden.

Camphora trita. Nach Bedürfniss mit Alkohol zu chirurgischem Cerat. zu verordnen.

Camphoroxol. Desodorans u. Antisepticum *(1=2)*.

*° *Cannabis indicae* **Hb.** 0·2 b. 0·5 p. d. in Pulv., Infus. (2·0—5·0 : 100—200), Col.: zu Inhal. am häufigsten in Cigaretten *(10=6)*. — *† **Extr. Cannab. indic.** 0·03 b. 0·1! p. d. (Sedat.) 0·2—1·2 (Hypn.) ad 0·3! (Ph. G. 0·4!) p. d. in Pill., Past., Mixt., p. selten in Salben (0·2 bis 0·5 : 10), Liniment *(1=24)*. — **Resina Cannab.** 0·2—0·5 p. d. — **Tinct. Cannab. indic.** 5—20 Tpf. ad 1·0! p. d. ad 4·0! p. die *(10 = 14)*. — **Haschisch pur.** (Churrus) 0·01 bis 0·05 p. d.

Cannabinonum (Sedativ. und Hypnotic.) 0·05—0·2! p. d. und die *(1 = 50)*.

Cannabinum purum 0·05—0·3 p. d. — **tannicum** 0·2—0·5 p. d. in Pulv. *(0·10 = 4)*.

*°† **Cantharides** 0·01—0·05! p. d. m. t. ad 0·2! p. die (Ph. G. 0·15! p. die) in Pulver, Pillen; Streupulver, Salben, Pflaster *(10=24)*. — **Charta epispastica.** — °**Collodium Canthar.** (1 : 5 Coll. elast.). — *°**Emplastr. Canth. ordinar.** (vesicat.) *(10 = 20)*. — *° **Empl. Canth. perpetuum** (u. Euphorb.) *(10=30)*. — °**Oleum cantharid.** 0·05—0·3 (1—6 Tpf.) p. d. in Kaps., Pill., Emuls.; zu Salb. u. Einreib. — *°† **Tct. Canth.** 0·1—0·5! p. d. ad 1·0! p. die (Ph. G. 1·5! p. die); ext. wie Canth. *(10=12)*. — °**Unguent. Canth. z. Verbänd.**, selten zu Einreibungen. — **Cantharidinum** int. zu 0·0001 0·0002 in L. oder Pillen *(0·01=10)*.

*°**Cap. Ven. Hb.** (Frond.) *(10=4)* zu *°**Syr. Capill. Ven.** *(10=8)*.

°**Capsici Fruct.** 0·05—0·2 p. d. m. t. in Pulv., Pill.; ext. als Reizm. in Cataplasm. *(10=8)*. — °**Tinct. Caps.**

10—30 Tpf. (0·3—1·0) p. d. mit Wasser o. schleim. Vehikeln; zu Einreibgn., Mund- u. Gurgelwässern, Zahntropfen *(10 = 6)*.

Captol (Condensationsproduct des Formaldehyds mit Chloral). Ext. in alkoholischer 1%ig. Lösung, in 1—2%iger Salbe mit Vaselin u. Lanolin (bei Seborrhoea capit. u. Defluv. capillor. 25%ig) *(1=40)*.

*° **Carbo Ligni depuratus** (C. vegetabilis) 0·5—3·0 p. d. in Pulv., Troch., Latw.; Streu- und Zahnpulvern, Mundwäss. (3·0—5·0 : 100), Salb. (10·0 : 25·0) *(100 = 22)*. Ebenso: **Carb. animalis** *(10 = 12)*. — **Carb. panis.** *(10 = 10)*. — **C. populi.** — **C. Spongiae** *(10 = 12)*.

Carboneum sulfurat. (Schwefelkohlenstoff) 1—10! Tpf. ad 40! Tropf. p. die in Kaps., wässer., alkohol., äther. und ölig. Lösgn.; ext. zu Einreib. pur od. Lös., local. Anästhetic. (zerstäubt).

C. trichloratum (Chlorkohlenstoff), Analeptic. 0·2 bis 0·5! p. d. ad 2·0 p. die in Pulv., alkohol. Lösung.

*° **Cardamomi Semen** (resp. Fructus) 0·3—1·0 p. d. m. t. in Pulv.; Zusatz zu aromat. Spec., Tinct. u. anderen Mitteln *(1 = 10)*.

Cardoleum (Vesicans und Pruriens) *(1=15)*.

° **Cardui benedicti Hb.** 1·0 bis 2·0 p. d. in Pulv., Inf. o. Dct. (5·0—15·0 : 100) *(10 = 5)*. - ° **Extr. Card. benedict.** 0·5—2·0 p. d. 2—3m. t. in Pill., Mixt. *(1 = 4)*.

Caricae (Feigen) zu Spec. Dct. 10·0—20·0 : 100—500 C.

Caricis (arenariae) Rad. zu Spec., Dct. 20·0—60·0 ad 100·0 *(100 = 25)*.

Carniferrin. Int. 0·5 p. d. in Tabletten o. Pulv. (Eisenpräparat) *(1 = 28)*.

Carnis Extr. Nahrungsmittel ½—1 Theel. (2·0—5·0 ad 10·0) auf 1 Tasse heiss. Wasser *(10 = 60)*.

Carpaium hydrochloricum (aus Carica Papaya, Alkaloid), subcut. 0·006—0·01, int. 0·025 wie Digitalis wirkend *(0·01=160)*.

*° **Carragheen** Dct. 3·0—5·0 zu 100—500 Col. *(10 = 4)*. — ° **Gelatina C.** Theelöffelweise.

*° **Carvi Fruct.** (Sem.) *(100=25)*. — *° **Ol. Carv.** *(1 = 8)*. — * **Spirit. Carv.** wie Anis Fruct. *(10 = 5)*.

*° **Caryophyll.** (Flores) 0·1 b. 0·6 p. d. in Pulv., Inf. (2·0—6·0 : 100—200 Col.); Zahnpulv., Consperg.; in Inf. zu Mundwäss., Zahntinct. *(10=12)*. — *° **Oleum C.** ½—2 Tropf. in Tinctur. C. 10—30 Tpf. zu Einreib., Zahnm. *(1=3)*.

Cascarae Sagradae Cort. s. Rhamn. Pursh. **Cascar. amarae Cort.** in Form des Extr. fluid., **Extr. Cascarae siccum**, 0·06-0·15-0·5 (bei Syphilis) 40—50 Tpf. p. d. 2—4m. t. *(1 = 6)*.

*° **Cascarillae Cort.** 1·0—2·0 p. d. m. t. in Pulv., besser in Inf. od. Dct. (10·0 bis 20·0 : 100—200 Col.), Spec. *(10 = 5)*. — ° **Extr. Cascarill.** 0·3 bis 1·5 p. d. in Pill. u. Mixt. (1=15). — * **Tinct. Cascar.** 20—40 Tpf. ad 10·0 p. die *(10 = 12)*.

Casein-Natrium s. Nutrose.

***Cassiae Fistulae Fructus** (1 = 20) zu * **Pulpa C.** T

bis esslöffelw. zu purg. Latw. u. Mixt. *(10 = 15)*.

Castaneae vescae Extr. fluid. als Anticatarrh. 0·3—2·5 p. d. 2—3m. t. *(1 = 3)*.

* **Castoreum** (Canadense; Bibergeil) 0·1—1·0 p. d. in Pulv., Pill. *(0·1 = 10)*. — * **Tinct. Castor.** 10—60 Tropf. (0·5—3·0) p. d.; als Riechm., Augenwässern (2·0—3·0 zu 100), Klyst. (1·0 b. 4·0) *(1 = 20)*. — **Castor. Sibiricum** ebenso *(1 = 50)*.

*° **Catechu** (Terra Japonica) 0·2—1·5 p. d. in Pulver, Troch., Pill., in wässer. oder alkoh. Lös. (3·0 bis 5·0 : 100 Col.), zu Zahnpulvern, -Pasten, -Tinct., als Streupulv., in Lös., zu Klyst. *(10 = 14)*. — *° **Tct. Catechu** 10—60 Tpf. p. d. *(10 = 10)*.

*° **Centaurii minoris Hb.** siehe Hb. Cardui bened. *(100 = 48)*. — * **Extr. Cent. minor.** ebenso *(10 = 60)*.

*° **Cera alba** *(10 = 10)* und *° **flava** *(10 = 8)* i. Emuls. (5·0—10·0 : 100) u. Dct. (2·0 bis 5·0 : 100); als Const. f. Pill., Salb., Pflast., Bougies etc.

C. Japonica ebenso.

° **Cerasorum Syrup.**, Corrig. u. Constit. *(10 = 6)*.

* **Ceratum fuscum** s. Plumb. — **simplex** wie Butyr. Cacao.

Ceresinum (reiner Ozokerit) wie Paraffin *(10 = 4)*.

Cerium oxalicum (gegen Vomit. d. Schwang., Dyspepsie, Magen- u. Darmcatarrh) 0·05—0·1—0·3! p. d. *ad 1·0! p. die* in Pulv., *solv. in Lösung.* od. Pill. *(1 = 3)*. — *Ebenso* **C. valerianicum.**

Cerussa s. Plumb. carbon.

*° **Cetaceum** (Sperma Ceti) 1·0—1·5 p. d. in Pulv. (mit Zucker), Emuls. (5·0 bis 10·0 : 100—200); zu Cerat., Pflaster, Past. *(10 = 10)*. — * **Ceratum Cetac.** — **rubrum**, durch Rad. Alkannae roth gefärbt. *(10 = 14)*.

Cetrarinum (Bitterstoff) 0·1 bis 0·6 p. d. *(0·1 = 60)*.

*° **Chamomillae vulgaris Flor.** 1·0—5·0 p. d. in Pulv. Inf. (5·0—15·0 : 100—200 Col.); zu Kräuterkissen, Cataplasm. etc., ein Inf. zu Gurgelwäss., Inhal., Bähungen, Augenwäss., Klystier., Bädern (50·0 b. 1000·0) *(10 = 8)*. — * **Aq. Chamomill.** pur thee- bis esslw., Zusatz zu Mixtur. *(100 = 20)*. — **Extr. Chamomill.** 0·5—1·5 p. d. *(1 = 10)*. — **Ol. Chamomill. aeth.** ½ bis 2 Tpf. p. d. *(0·1 = 14)*. — **Syrup. Chamomill.** thee- b. esslw. pur, Corrig. *(10 = 8)*. — * **Tct. Chamomill.** 10—30 Tpf. p. d. 2—4 m. t. *(10 = 8)*.

Chelidonii Hb. *(10 = 4)* als Succus recent. 2·0—10·0 p. die. — **Ext. chelid.** 0·1 b. 0·5 p. d. in Pill., **Mixt.** *(1 = 20)*.

Chelidon'num phosphoric., int. 0·1 - 0·2 p. dos *(0·1 = 82)*; ebenso **Ch. sulfuricum** und **Ch. tannicum** (Sedativum) *(0·1 = 82)*.

* **Chenopodii ambrosioïdes Hb.** (Mexikanisches Traubenkraut, Jesuitenthee) 0·5 bis 4·0 in Pulv., Spec., Inf. (10·0—30·0 : 100—200 Coll.); zu Umschl. *(10 = 6)*.

Chimaphilae Hb. Inf. 10·0 b. 30·0 : 100—200 Coll. p. die.

* **Chinae Cortex fuscus** 0·5 b. 10·0 (—60·0 in Extract. d.

in Pulv., Pill., Electuar., Schüttelmixt. wässerig. u. alkohol., Inf. od. Dct. (5·0—25·0 : 100—200 Col.); Chinachocolade, Chinakaffee, Chinawein; Streupulv., Zahnpulv., Latwerg., Cataplasm. etc.; im Inf. od. Dct. zu Mund-Gurgelwäss., Inject. Umschlägen, Klystier *(10=20).* — **Extr. Chinae** (*°**aquosum** *(1=20)* u. °**spirituosum**) 0·3—2·0 p. d. in Pill., Mixt.; zu Mundw., Zahnmitt., Pinselsäft., Pomad. — **Extr. chinae Nanning,** 15—20 Tropfen bei Anorexie und Dyspepsie. — °**Tinct. Chinae** 1·0—5·0 p. d. *(10=12).* — *°**Tinct. Chinae composita** ½ bis 1 Theel. p. d. 2—4m. t., in Tpf. od. Mixt. *(10=10).* — **Cort. Chinae Calisayae** (Königsrinde) und **Cort. Chinae ruber** w. o *(10=24).*

***C. Vinum** *(100=130).*

Chinaphtol(Chininum β-naphthosulfonicum) int. 0·5 p. dos, 2·0 3·0 p. die in Pulv., Pill. (Antipyr.) *(0·1=16).*

Chinasepto! (Oxychinolin-Sulfonsäure), Antiseptic.

Chinatum (Quinetum) wie Quinium.

Chinidinum hydrochloricum. — **salicylic.** *(0·10=12).* — **sulf.** *(1=18).* — **tannic.** *(0·10=12)* w. d. entspr. Chininsalze.

Chininum purum 0·03—1·0 in Pulv., Pill., alkohol. u. äther. Lös. Besser d. Salze *(1=32).*

— **arsenicicum** 0·003—0·01 in Pillen *(1=32).*

— **bihydrobromicum** 0·5—1·0 in Oblat.; subcut. (1—3 zu 10 Aq.) *(1=28).*

— **bimuriaticum - carbamidat.** subc. (50% Lös.) 0·1—0·5.

***C. bisulfuricum** (in 11 Thl. Aq. lösl.) wie Chin. sulf. *(1=15).*

— **carbolicum** 0·5—0·6 p. d. 4—6m. t. in Pill.

— **citricum** wie Chin. sulfur. *(1=28).*

— *° **ferro-citricum** 0·05—1·0 p. d. ad 2·0 p. die in Pulv. Pill., Lösung *(1=10).*

— **hydrobromicum** 0·05—0·5 p. d., ad 2·0 p. die in Pulv., Pill., Lös.; subc. (1 : 10 alkohol. Aq.) *(1=26).*

— *° **hydrochloricum** w. Chin. sulfuric.; ist lösl.; subcut. (0·15—0·25 : Glycerin und Aq. aa. 5·0) *(1=18).* **Ch. lacticum** leicht in Aq. lösl.) *(1=30).* — **phosphoricum** (soll sehr milde wirken) *(1=30).*

— **saccharinicum** (schw. lösl. in Aq., schwach bitter, 36% Sacchar, 64% Chin) *(1=80).*

— **salicylicum** 0·1—0·5 p. d. ad 2 p. d. *(1=24).*

— *° **sulfuricum** 0·03—0·15 p. d. m. t. als Tonicum, bei Intermitt., Neuralg., Typhus, Puerperalfieber etc. 0·3—2·0 innerhalb 24 St. (Antipyretic. u. Antityp.), bei hochgradigem Fieber, bei Abdominaltyphus 1·0 bis 2·5 auf einmal oder innerhalb 1 St. in Pulv., Oblat., Trochisc., Pill., wässerig. u. weing. Lös., Milch; ext. als Schnupfpulv., Insufflat. in Kehlkopf, Trachea etc., in Lösung. zu hypodermat. Inject. (1·0 : 10·0 Aq. mit einig. Tpf. Acid. sulfur. o. 1 : 6 Glycerin, gelöst, [illegible] von ½—1 Spritze), Inject. in d. Nase u. Blase (1 : Aq.), bei Gonorrhoe (1 : Inhalation., Suppos[illegible]

Salb. (1 : 40—80) Pomad. (0·5—1·0 : 25) *(1 = 14).* — **aethylosulfuric.**, cut. und subc. 0·1—0·5 p. d. *(1 = 25).*

*° **C. tannicum** 0·1—2·5 (c. 2 bis 4 m. gröss. Dos. als bei den vorhergehenden) in Pulver, Pill., Schüttelmixt. *(1 = 15.)*

— **valerianicum** 0·05—0·5 p. d. in Pulv. u. Pill. *(1=26).*

Chinoidinum 0·1—1·0 - 3·0 p. d. m. t. (c. 2—3m. grössere Dos. als bei Chinin. sulfuric.), in Pulv., Pill., alkohol. u. wässerig. Lös. (Zusatz v. Säuren) *(1=2).* — **hydrochloricum** *(1=10).* — **tannicum** wie **Chinoïdin.** — **Tct. Chinoïdin.** Theelöffelweise mit Kaffee od. Wein.

Chinojodinum (Antiseptic.) 0·2—0·5 p. d. 2—3 m. t.; als Streup. und Salben (1 : 10—25) *(1 = 50).*

Chinolinum intern in Form seiner Salze; ext. als (Antiseptic.) Gurgel- und Mundwässer (0·1—0·2%) und Pinsel. (5%) in alk.-wässer. Lösung. *(1 = 8).* — **Ch. rhodanatum** ext. in 1%Lösung — **Ch. Wismuth-Rhodanat**, als Streupulv. bei Ulcus cruris u. luetisch. Geschwür. — **Ch. salicylicum** *(1 = 12)* wie **Ch. tartaricum** *(1=8).* (Antiseptic., Antipyretic.) 0·5—1·0—2·0! p. d. ad 60·0! p. die (Kindern $^1/_3$—$^1/_2$ d. Dos.) in Pulv. u. Mixt.; Gurgelw., Inhal., Pinsel. (3—10%), Inj. (1 : 50 Spir. : 500 Aq.).

Chinopyrin (Verbindung von Antipyrin mit Chinin-*chlorhydrat) zu subcut. Injectionen bei Malaria (1 = 42).*

Chinosol *(oxychinolinschwefelsaures Kali). Antiseptic.*, ext. in 0·5-1% wä Lösung., Pulver, Salb Gaze etc. *(1 = 2?).*

Chloralamid s. Chloral formamidatum.

Chloralbacid, b-i Subacidi int. 0·3-0·5 m. m. t. *(1=2*

Chloralose, als Hypnot. i 0·1—0·5 in Pulv., 0·2— in Klysma *(1 = 44).*

Chloralum Butylhydratum(C tonchloralhydrat) 0·1— (schmerzlindernd. M.) bis 1·2 (Hypnotic.) p. ad 5·0! p. die in Pul Pill., Mixt., Lösung. Spirit. od. Glyc. — **Chlo cyanhydrat.** Als Ersatz Aq amygdal. amar. gleicher Dosis. — †° **mamidatum** u. *° † **hydra** (Chloralhydrat) 0·1— (Sedativ.) p. d. 1—2 s 1·0 - 3·0. p. d. (Hypnot ad 6·0! p. die (ja sogar 4 p. d. u. 8·0! u. mehr Delirium potator. p. in Lösg., Pill., Biss Electuar., Gallertka z. Wundbehandlung aton. Geschwür., Ery etc. (1 : 10—50 Aq. o Glycer.), auch in Su (c. 3·0) in Wund. bei Tet oder Trism., Einsprit (1 : 10—50 Aq.; in Harnröhre 1 : 100), snbc Inject. 0·5—2·0 : 100 (sel 1 : 2—5 Aq.), Pinsel (1·0—4·0 : 10—30 Glyce Waschung., Umschl Verbänd. (1—10%). Kly (mit Gummischleim), S positor. (1 : 4), Salb. (1 : 5), Pflast. *(1=3).*

*° † **Chloroformium** 0·2—1· bis 25 Tpf.) p. d. ad. p. die pur od. schleim Vehik., alkohol. äther. Lösung., Em Kaps.; Inhalat. 2·0

pur od. mit Aether (1 : 1 bis 9 Aeth.), Aether und Alkohol (100 : Aeth. u. Alkoh. aa. 30) z. Narcose; als local. Anästhetic., Einreibung., Umschläg., Verbänd. pur od. in Salben, Liniment., Emuls. (1 : 2 bis 10); z. Zahntincturen, Klyst. (5—25 Tpf.); subc. Inject. 0·5—1·0 (½ bis ganz. Spritze) *(10=10).* — **Aq. chloroformiata** (1 Ccm. zu 200 Ccm. Aq.). Theebis Esslw. ad 150·0 p. die pur od. in Mixt.; zur Magenausspülung (3—10 zu 1000 Aqua) *(100=40).* — **Liniment. Chlorof.** (1 : 2—10 Ol. olivar.). — **Liquor Morph. chloroformiatus** 5—25 Tpf. p. d.; zu Mundwäss., Einreib, Klystier. (wie oben). — **Chlorodyne** (Morph. muriat. u. Extr. Cannab. Indic.), ebenso *(1 = 2).*

*° **Chlorum solutum** (Aqua chlorata) 1·0-5·0! p. d. ad. 50·0! p. die pur (m. vitro nigro); Mund-Gurgelwäs., Pinselsäft. (1 : 1—5 Aq. od. Syrup. simpl.). Verbandwäss., Waschung., Bäder; Injection. (1 : 4 Aq.), Inhalat. (5·0—50·0 zu 500 Aq.). Klystier. (1 Esslf.) *(10=5).*

Chrysarobinum (Anthrarobinum, Goapulver, Araroba, fälschlich Acid. chrysophanicum) (Brech- u. Abführmittel) 0·05—1·0 p. d. in Pill. od. alkalischer Lösung.; extern häufig in Salben (1—5 zu 20), Collodium, Traumaticin (1 : 10) od. warmer *Gelat.* (5—15%); in Pasta, *Mixtur (1 = 15).* (Wenn *Acid. chrysophanic.* verordnet wird, wird Chrysarobin. dispensirt.) — **Chrysarobinum oxydatum** zu 5- bis 10%igen Salben mit Vaselin-Lanolin aa. (Milder wirkend als Chrysarobin.)

Cichorei Hb. und **Rad.** wie Taraxac.

Cicutinum hydrobromicum 0·02! p. d. ad 0·06! p. die.

Cimicifugae racemosae Rad. 0·5—3·0 p. d. in Pulv., Dct. (10·0—30·0 : 100—500 Col.) — **Ext. C. r.** 0·05 bis 0·5 p. d. *(10=50).* — **Resina C. r.** (Cimicifugin) 0·05—0·1 p. d. ad 1·5 p. die in Pill. — **Tct. C. r.** 5—60 Tropfen p. d.

*° **Cinae Flores** (Semen) C. od. Santonini od. Contra) 0·5—5·0 p. d. in Pulv., Schüttelmixtur., Elect. Chocolad., Inf. (5·0—20·0 zu 100—200 Col.) Confection; Klyst. (5·0—20·0 zu 50—100 Aq.) *(10 = 8).* — **Ext. Cin. aether.** 0·3—2·0 in Pillen, Biss., Elect., Kaps. *(1 = 5).*

Cinchoninum purum *(1 = 10).* — **C. sulfuricum** um ½ grössere Dosen als bei Chininum *(1 = 6).*

Cinchonidinum purum. — **C. hydrochloricum.** — **C. sulfuric.** ebenso *(1 = 6).* — **C. tannicum** w. Chinin. tannic.

*° **Cinnamomi Cortex** (Cort. C. Chinensis) 0·2—1·5 p. d. in Pulv. Electuar., wässerig. od. weinig. Macerat. u. Inf. (3·0—15·0 : 100 bis 200 Col.); Consperg.; Zusatz zu Zahnpulv. etc. *(10 = 16).* — **Cort. Cinnam. Zeylanici** ebenso. — *° **Aq. Cinnam. simplex**; Corrig. und Excip. *(100 = 30).* — * **Aq. Cinnam. spirituosa** p Theelfw. oder in Mix *° **Ol. a** *(100 = 50).*

Cinnam. $^1/_2$ bis 2 Tpf. p. d.; Corrig. *(1=35).* — *° **Syrup. Cinnam.** (10·0—25·0 : 100 bis 200 Mixtur.) *(10 = 12).* — *° **Tct. Cinnam.** 10—60 Tpf. (1·0—2·5) p. d.; zu Zahn- u. Mundwasser *(10 = 8).*

Citri Fruct. als **Succus Citri.** Thee—Esslfw p. d. ad 50·0 bis 100·0 p. die pur od. in Saturat., Mixt., Molken, Brausemisch. (Limonade 20·0—50·0 : $^1/_2$ Liter-Aq.); Mund- u. Gurgelwasser, Waschm., Pinselung., Pomad., Salb. — * **Ol. C.** 1—3 Tpf. p. d.; Corrig. *(1 = 8).* — * **Syrup** (Acetositat. C.) Corrig. u. Excip. *(10=12).* — *° **Cortex, F. C.** wie **Cortex Aurant.** *(10=10).*

Citrophen, Antipyreticum, Antineuralgic., Nervinum int. zu 0·5—1·0 p. dos. bis 6·0 p. die in Pulv. *(1=20, 10=150).*

Citrureatabletten (Combinat. von Harnstoff, Citronensäure u. Lithiumbromid), 1—2 Tabletten 4—5m. tgl.

* **Cocae Folia** 0·3—1·0 p. d. 2·0 m. t. in Pulv., Species, Inf. od. Dct. 2·0–10·0 : 100 b. 150 Col. *(10=25).*

† **Cocaïnum hydrochloricum** (muriatic.) 0·02—0·10 ! p. d. ad 0·30 ! p. die in Pulv., wässerig. und alkohol. Lösung. Mixt.; als Anästhetic. in 2—20% Lös. (mit oder ohne Morphium) od. subcut. 0·025 bis 0·1 p. d. (0·1—0·5 : 5 Aq.); Zahntinct. (2—10%) Augenw. (0·1—0·3 : 10 Aq.); Collyr. (1—5%), Inject. *(0·2–0·5%),* **Umschläge** *(2–5%),* **Salb.** *(0·2—0·3 zu 10·0),* **Supposit. u. Boug.** *(0·01 bis 0·02),* auch als **Streu- u. Schnupfpulv.** (0·1 bis 0·5 mit Sacch. und anderer Zuthat) *= 20).* — **C. hydrobr.** ebenso. *(0·1 = 30).* — **hydrojodic.** z. Elektr. ästhesie (Kataphorese) **basicum** ext. Anästhetic wie Cocain. m. **C. la.** — **C. nitricum** *(0·1 = 30).* **C. oleïnic.** (10%ige Lös. gen in Ol Amygd. od. säure) zu Salb., Linime Supposit. *(0·1 = 8).* – **C. nylicum** *(0·1 = 30).* – **salicyl.** z. Instill. *(0·1=*

Coccionella Färbemittel *=12).* — **Carminium** *(1 =* ebenso.

Coccoli indici Fruct. 0·05– in Pulv. u. Pill.; ext Salb. (1 : 5—15) u. (0·5—2·0 : 100 Col.)

° **Cochleariae Hb.** als **S recent.** b. 50·0 p. die.

° **Spiritus Cochlear.** 1·0 4·0 p. die; zu Mund-, G gelwasser, Zahntinct. oder mit Aq. verd. *(10=*

Cocois Ol. zu cosmetisc Zwecken. *(10=4).* — **Coc.** wie **Sapo** *(10 = 3).*

°† **Codeïnum phosphoric.** b. 0·1 ! p. d. ad 0·4 ! p. in Pulv., Pill., Mi subc. Inj. (0·5 : 10 *(0·1=14).* — **C. hydrochlo** *(0·1=14).* — °† **C. sulfuric** ebenso *(0·1=14).* — **Syr. deïni** (0·02 : 10 Syr.) thee

Coffeae Semen (Fabae) **S** Coff. tostum, geröst. ungeröst. in **Inf. c** Dct. (2·0—10·0 : 100 C

*° † **Coffeïnum** (Theïnum) bis 0·2 ! p. d. ad 0·6 die in Pulv., Pill., Pa Syrup; subc. Inject. chloroformh. u. spirit Lös. (0·01—0·02 p. d. 25). — **C. citricum** (1= **C. hydrobromicum** (1=

C. natro-benzoïcum *(1=20).* — **C. natrio-cinnamylicum** *(1=28).*—**C. natrio-salicylic.** ebenso *(1=20).* — **Ethoxy-coffeïnum** 0·2—0·5 p. d. ad 2·0! p. die 1—2mal tägl. in Pillen oder Lös. *(1=30).*

Colchicinum 0·000 5—0·003 p. d. ad 0·009! p. die in Pulv., Pill. und Lös.; subcut. Inj. (0·02 : 10 Aq., hievon eine Spritze) *(0·01 =6).* — **C. salicylicum (Colchisal)** int. zu 0·00075 p. dos. m. m. tägl. (Antirheumaticum.) — °**Colchici Semen** (0·05—0·25 p. d. in Pulv. u. Pill.). — **Acetum Colch.** 1·0—2·5 p. d. 2-4m. t. in Saturat. Mixt. *(10=4).* —*°† **Tinct. u. Colch. semin.** 0·5—1·50! p. d. ad 5·0! p. die (Ph. G. 2·0! p. d. ad 5·0 p. die pur oder in Mixtur.) *(10=12).* — *° **Vinum Colch. semin.** ebenso *(10=20).*

***Colla pisc.** s. Ichthyocolla.

Collaform s. Glutoform.

Collargolum (Argentum solubile), eine wasserlösliche Silbermodification. In Salbenform wie Argentum nitr.

*° **Collodium** nur extern als Deck-, Klebemittel und Excip. *(10=10).* — *° **Coll. elastic.** (Coll. 50 : Ol. Ricini) *(10=10).*

*°† **Colocynthidis Fructus** (Pulpa) 0·01-0·3! p. d. ad 1·0! p. d. in Pulv., Macerat., Inf. (10·0 : 100 Aq. oder Vinum) *(1 = 8).* — **Fruct. Colocynth. praeparat.** in Pulv. od. Pill. zu Ein- [illegible] positor. [illegible] olocynth. [illegible] t und [illegible] astic.. [illegible] d 0·2! [illegible] p. d. ad 0·4! p. die) *(1=38).* — °† **Tinct. Colocynth.** 10—20 Tropf., 1·0! p. d. ad 3·0! p. die *(10=20).*

Colocynthinum 0·005—0·4! p. d. ad 0·8! p. die in Pill. *(0·1 = 50).*

*° **Colombo** (Calumba) Rad. 0·5—2·0 p. d. m. t. in Pulv., Pill., Infus, Dct. (5·0—15·0 : 100—200 Col.) *(10=12).* — ***Ext. C.** 0·3—1·0 p. d. ad 4·0 p. die in Pulv., Pill., Mixt. *(1=30).*

° **Colophonium** nur ext. als Streup., bintstill. Mittel, Constit. *(10=2).* — ***Empl. oxycroceum** (Colophonium 1 : Cer. flav. 3) *(10 = 32).*

Conchae marinae praeparatae (präpar. Austernschalen) 0·5—2·0 p. d. in Pulvern, Streu- u. Zahnpulver etc. *(10=5).*

*° **Condurango Cort.** Inf oder Macer., Dct. (15·0—30·0 z. 400 Aq. auf. 200 Col., 1—2 Essl. p. d., 2—4m. t.); zu Umschl. und Inj. in Dct. *(10=6).* — °**Ext. Cond.** 0·2—0·5 p. d. *(1=10).* — °**Vin. Cond.** Esslöffelweise *(10=18, 100=100).*

*°† **Conii maculati Hb.** 0·05 b. 0·3! p. d. ad 2·0! p. die in Pulv., Pill., Inf. (1·0 b. 2·0 : 100); zu Catapl., Inf. od. Dct. (1·0—4·0 zu 100), zu Inject., Klyst., Inhal., Wasch. (mit oder ohne Fol. Hyosciam.) *(10 =8).* — **Succ. rec.** 10—40 Trpf. p. d. 1—3 m. t. — **Conii Fruct.** 0·05—0·2 p. d. 2—4m. t. ad 0·8! p. die. — **Empl. Con. maculat.** — ***Emplastr. Con.** (10=10). — ***† **Ext. Con.** 0·02—0·20! p. die ad 0·6! p. die in Pulver, Pill., Lösung., Mixt., Augenwässern (2—4·)

Inh. (0·1—0·2 zu 100), Inj., Klyst. (0·1—0·3 : 50—150), Pflast., Salb. (0·5—1·0 : 10) *(1=14).* — **Tct. Con.** 5—15 Tpf. p. d. *(10 = 50).*

Conilinum pur. 0·0001—0·001! p. d. ad 0·003! p. die (ja bis 0·005! p. die) in Pill., Tpf., Mixt.; zu Einreib. in alkoh. Lös. und Salb. (0·01—0·1 : 10—15), subc. Injection. (0·0008—0·001!) *(0·10=34).* — **C. hydrobrom.** (0·005! p. d. ad 0·03! p. die) *(0·10=40).* (Antispasmodicum und Antineuralgicum.)

Convallariae majalis Hb. Inf. 5·0—10·0 : 100—150 Col. — **Extr. C.** 0·1—0·5 p. d. ad 2·0 p. d. **Convallamarinum** 0·005 bis 0·06! p. d. ad 0·3! p. d. *(0·01 =3).* — **Convallarinum** 0·5 bis 0·15 p. d. 1—4 m. t. ad 0·25 p. die als Purg. *(0·01=3).*

Cordol (Salolum tribromatum), int. 1·0—2·0 Grm. als Hypnoticum und Hämostaticum *(0·1=8).*

* **Coriandri Fruct.** (Semen) 0·5 bis 1·5 p. d. in Pulv., Inf., Macer. (5·0—10·0 : 100 Col.) Confect. *(100 = 16).*

Cornutinum citricum und **C. purum.** int. 0·005—0·01 p. d. et die i. Pill. *(0·01=120).*

Coronillinum int. 0·1 p. d., 0·6 p. die in Tpf. (Cardiotonicum) *(0·01 = 30).*

Cosaprin (Sulfoderivat des Antifebrin), Antipyretic., Anwendung w. d. *(1=28).*

Cotarninum hydrochloricum s. Stypticin

Coto Cort. (Antidiarrhoic.) 0·02—0·5 p. d. in Pulv. *(10 =20). Tct. C. 10—15*—50 Tpf. *p. d. 1—3 m. t. (10 = 16).* — *Cotoinum 0·005*—0·08! p. *d. ad 0·5! p. die* (sogar 1·0! *p. die*) in Kapseln, Oblat., Emuls. und *(0·01=4).* — hyp (0·1—0·25 p. d.) — **Paracoto** als Extr 10—40 Tpf. p. d. t. — **Paracotoinum** 0·1 p. d. *(0·10=6)*

*° **Crocus** (Safrannarb o. 1·5 p. d. in Pu Elect., Inf. (2·0—5 Col.); zu Catapl Pflast., Salben in *=34).* — **Tct. Cr.** Tpf. *(10 = 55).*

*° **Cubebae Fruct.** 1· p. d. ad 30·0! p. Pulv., Pillen, Tro Latwerg.; zu Inj. (10·0—15·0 : 100); (5·0—15·0 mit Eig Emuls.) *(10=12).* — **Cub.** 0·5 b. 2·0 p. d in Pill., Elect., Kap werg., Emuls. *(1= Ol. Cubeb.* 5 b. 15 T b. 0·8) p. d. m. t. in C kaps., Emuls. *(1=*

Cucurbitae Peptonum (s (geg. Tänien) 30·0—6 in Emuls. od. Pas **Cucurbit. P. semin.** ((15·0—30·0 p. d. *(10=*

Cumini Fruct. (Seme: Fruct. Coriandr.

Cuprum aceticum selt 0·006—0·06 p. d. in Pill. und Lös.; e Mund- u. Gurgelw (0·1 : 100), Inj. (zu 100), Augenw (0·1—0·5 : 100), Sa b. 1·0 : 10—25) *(10=*

— ° **aluminatum** (Lap nus) nur ext. al stift, Augenpulv. Sacchar.); in Lös Augenwäss. (0·1— 100), Instillat. (0·1 100), Gurgelw. zu 100), Inject. zu 100) (10=10)

C. bichloratum 0·005—0·01 p. d. in Lös.; ext. als Desinfectionsmittel.

— **carbonicum** 0·2—0·5 p. d. in Pulv. oder Pillen, als Antidot bei Phosphorintoxicat. in Aq. suspend. $^1/_2$stündl.

— **chloratum** wie C. bichlor.

— **nitricum** 0·005—0·007 p. d. m. t. i. Pill. u. schleim. Vehikeln (b. Syphilis); zu Verb., Inj. (0·1—0·4 zu 100).

— **oxydatum** (nigrum) 0·01 b. 0·1 p. d. in Pulv. und Pill.; in Salbe (1 : 8—20) *(1=3)*.

— **sulfo-carbolicum** w. Zinc. sulfo-carbolic.

— *°† **sulfuricum purum** 0·1 bis 0·03 p. d. u. als Br[illegible] mittel 0·05—0·4! (Kind[illegible] 0·05—0·1 p. d. m. t.) Pulv., Pill. u. Lösu[illegible] ext. als Aetzstift, St[illegible] pulv. (1 : 1—20 Sacch[illegible] in Lösung. als Aetzn[illegible] u. Adstring. z. Pinselung. (0·2—1·0 : 3—100 Aq.) Pinselsaft (0·1—0·2 : 10 Glyc. oder Honig), Mund- und Gurgelw. (0·1—1·0 : 100), Augenwäss. (0·05—0·5 zu 100), Instillat. (0·05—0·2 zu 100), Inject. (0·2—2·0 zu 100; bei callös. Fistelgeschwür. 4·0—12·0 : 100); Augensalb. (0·1—0·6 : 10). Salb. (1·0—3·0 : 10—25) *(10=6)*. — ° **C. sulfur. crud.** nur ext. ebens. — **Cupr. sulfuric.-ammoniatum** 0·01—0·1! p. d. ad 0·4! p. die in Pulv., Pill., Lösg. (Aq. od. Sy[illegible] [illegible] ct. [illegible]). [illegible]002 [illegible] in [illegible]

beginnend u. vorsichtig steigend bis 0·020! p. die (sogar 0·15! p. die). — Das Präpar. ist vor der Anwendung am Frosche zu prüfen; endermat. (0·1 zu 40 Aq. bis 1·0 : 80 Aq.) *(0·01=2)*. — **Curarinum purisa.** 0·00025-0·0007 subc. in wäss. Lös. *(0·01=100)*.

Curcumae Rad. (Rhiz.) wie Rhiz. Zingib.; z. Färben v. Salb. u. z. Reagenspap.

Cutol (Aluminium borotannicum). ext. als Streupulver (pur od. in Misch. mit Zinkoxyd od. Talk), 10% Lanolin-Salbe oder Paste *(1=40)*. — **Cutolum solubile** (Alumin. boricotannico-tartaricum) ext. in 10% Glycerinlös., 10% Resorbin-od. Lanolinsalbe.

Cyani Flor. Zusatz (weg. der blauen Farbe) zu Spec., Räucherpulv. etc. *(10=18)*.

***Cydoniae Sem.** *(10=10)* zu * **Mucilag. Cydon** (1 : 50 Aq.) *(10=6)*.

*° **Dammar Resin.** Bestandth. d. Empl. adhaes. *(10=10)*.

Damianae Extr. fluid. (Diuret., Stomachic.), 2—4 Theel., 2—4m. t. *(10=30)*.

Daturinum 0·001! p. d. ad 0·003! p. die; zu Instillat. 0·2—0·5% Lös. (mit Acid. sulfuric. dilut. und Aq.) *(0·01=16)*.

Delphininum tartar. 0·005-0·01 p. die ad 0·03 p. die in Pill.; zu Salben (0·2 bis 1·5 : 25), alkohol. Lös. (1 : 5—20).

Dermatol (bas. gallussaures Wism.), antis. Wundbhm. Als Pulv., Salbe (2—10%) Emuls. b. Verbr., nässe. Ekzem, Ulcer. etc. (10=100).

Desichthol = Ichthyol.

Desinfectol (Gemisch [illegible] Theerkohlenwasse[illegible]

akresolen). Desinfic. 5—11% Lösung.
inum 1·0 - 2·0 p. d. m. t.; Verbänden (5·0 - 100·0 500 Aq.) *(10 = 6)*.
troform. Antisept Jodoformersatzmittel 10—20% Lösungen (b. Gonorrhoe).
cetanilid int. 0·1—0·5 p. d., 1·0 p die (Antipyretic.).
amboe. Extract. fluidum. Kaffeelöffelweise m. Wein und Cognac gegen Cat. intest. und Sommerdiarrhoe der Kinder.
Diaphtherin. Oxychinaseptol, ext. z. Wundbehandlung in 1/2—2% Lös. *(1 = 10)*.
Difluordiphenyl in 10%igem Streupiv. od. 10%ig. Salb. (Wundheilm.) *(0 1 = 50)*.
Digitalinum (Germanicum) 0·001—0·002! p. d. ad 0·01! p. die (d. französische u. englische c. 0·00025 bis 0·0005 p. d. ad 0·001 p. die) in Pill., Syrup., Granul. (à 0·001); in Salbenform (mit Alkohol) *(0·01 = 6)*.
*°† **Digitalis Folia** 0·03—0·2! p. d. ad 0·6! p. die in Pulv., Pill., Inf. (0·5—1·0 [! p. die] zu 100 Col.) *(1 = 2)*. — **Acetum Digital.** 0·5—1·0 p. d. in Tpf. od. Mixt. — **Dialysat. digital.** (Bosse) 10 Tropfen pro dosi. — **Extr. Digital.** 0·03—0·2! p. d. ad 1·0! p. die *(1 = 10)*. — *°† **Tct. Digital.** 0·5—1·5! p. d. ad 5·0! p. die *(10 = 12)*. — **Unguent. Digital.** (1 : 10). **Digitoxinum crystallis. Merck.** 0·00025 p. d., 0·001 p. die, int., p. Klys. od. subcut. *(0 1 = 100)*.
Dijodoform (Tetrajodäthylen). Als Jodoformersatz z. Wundbehandl. *(1 = 120)*.
Dionin (salzsaures Aethylmorphin) int. 0·02—0·03 p. d. m. tgl. in Pulv. 0·1 wässeriger Lösung, subc 0·015—0·03 p. d. *(0 1 = 30)*.
Diphtherie-Heilserum subcut. bei Diphtherie.
Ditae Cort. Dct. (5·0—20·0 zu 100 Col.) als Febrifug. *(10 = 20)*. — **Ditainum hydrochloric.** 0·05—0·10 p. die.
Diuretinum (Theobromin Natrio-salicylicum) 1·0 p. d. 6·0—7·0 p. die innerl. in Mixtur *(10 = 300)*.
Dormiol (Amylenchloral), ölige Flüssigkeit, 0·5—3·0 in wäss. Lösung *(1 = 20)*.
Douradinha Flores. Im Infus als Diaphoreticum und Diureticum; digitalisähnlich wirkend.
Droserae Hb. Inf. (10·0—20·0 zu 100—200 Col.) — **Tct. Dr.** 10—30 Tpf. p. d. m. t. *(10 = 20)*.
Duboisinum sulfur. 0·0002 b. 0·001! p. d. ad 0·003! p. die; zu Instillat. (0·25 b. 0·5% Lösung); subcut. (0·01 : 10 Aq.) *(0 01 = 8)*. — **D. hydrobromicum** ebenso.
* **Dulcamarae Stipites** 0·5 bis 2·0 p. d. m. t. Pulv., Spec., Inf., Dct. (5·0—20·0 : 100 bis 150 Col.). — **Extr. D.** (0·5—1·5 p. d.) *(1 = 4)*.
Dulcin. (Phenetolcarbamid) zum Süssen d. Diabetikerkost *(1 = 30)*.
Duotal = Guajacolum carbonicum s. d
Dynamogen (Eisenhämoglobinpräparat) int., 3mal tägiich 1 Esslöffel.
Dysphagie-Tabletten (aus Cocain und Menthol).
Eigone (Jodei+eissverbindungen) statt Jodkali Int. und ext. als Eigon-Natrium u. Eigon-Peptonverbindung *(1 = 20—*

...tose. Bei anämi- Zuständen. Ein ...ffel voll mehrm. Suppe, Wein etc.
...rm. Durch Zusatz ...aform sterilisirtes ...m. Anwendung ...ses *(1=20)*.
...0·001—0·008 p. d. ...in Pulv., Pill., Lösung *(0·1=80)*.
...um aromaticum s. — ***E. lenitivum** ...a.
...sina zu Salben u. ...n *(10=5)*.
Ribis fruct. 4·0 bis ...Milch als Band- ...ittel.
...arum 1 Theelöffel ...slöffel p. d. 2- bis ...glich
...tiorum compositum ...el. p. d. 1—3 m. t. **...arum** 0·0005—0·002 ...ector u. 0·005 bis Emetic. in Pulv. ...sung *(0·1=10)*.
...m adhaesiv. ext. *...m.=30)*.
...num zu ext. Zweck. *...m.=40)*.
...c. s. Colophon.
...at. (Empl. diachyl. ...0+Cer. alb. 100 + ...net. 50 + Camph. ...l. Olivar. 40) *(10*
— **fuscum campho-** ...m. Mennig, Oel, ...nd 1% Campher. ... (künstl. Nähr- ...t), thee- bis ess- ...se.
...reosot. valeriani- dieses.
...hydrochloricum ...0% wässer. Lös. ...licum) *(0·01=10)*. ...ndensationspro- ...rotinsäure u. ...ol). Bei Scabies in 10%iger Lösung; bei Prurigo zur Einreibung des ganzen Körpers ohne Folgezustände; bei Herpes tonsurans in 10- bis 15%iger alkohol. Lös.
Epidermin Salbengrundlage *(10=35)*.
Equiseti Hb. Dct. (3·0—30·0 zu 150—200 Col.) *(100=20)*.
***Ergotinum** (Extr. Secal. cornut. aquosum; Bonjean) 0·1—0·5 p. d. ad 2·0! p. die in Pill., Pastill., Lösung. n. Mixt.; subcut. (inject. 0·02—0·2 p. d. (ja 0·5 p. d. ad 1·0 p. die) in aq. od. glycerin-aq. od. glycer.-alkohol. Lösung; Supposit. (0·2—0·5 : 2), Klysm. (1·0—5·0 : 100 bis 200 Aq.) *(1=10)*. — **Erg. dialysatum** (Wernich, Bombelon) ebenso *(1=18)*. — **Erg. citricum solubile** (Tanret) in subcut. Inject. 0·0004—0·0007 (1 : 1000 gel. u. hinz. 2 b. 7 Cem.). — **Ergotinol.** Subc. 1 Cem. p. d. 2 Cem. pro die.
Erythroltetranitrat. Int. 0·05 in alkohol. Lösung oder Tabletten b. Angina pect. *(0·1=80)*.
Eserinum s. Physostigma.
Eucalypti globuli Fol. 0·5—1·0 p. d. ad 16·0 p. die in Pulv., Inf. Dct. (10·0—30·0 : 100 bis 150 Col.); als Desinfic. in Streupulv., Inf.; zu inject., Klyst., Mundwäss., Inhal., Cigarett. *(10=3)*.
— **Cortex E.** ebenso u. zu **Visum E.** 1—3 Theel. —
— **Oleum E.** (Eucalyptolum depurat.) 0·2—1·0 p. d. in Pharmacoch. Vorg., zu Inhalat., Emulsio. (1·5 in 10 Ol. olivar.), Verband etc., auch subcut. 0·1—0·2 p. d. *(10=35)*. — Tinct.

Theelfw. (bis zu 40·0); zu Mundwässern, Verbänd. *(10=10).* — **Eucalyptol** int. 0·25 p. d., 1·50—2·0 p. die in Pulv. — **Eucalyptol** zu Inhalationen *(1=6).*

Eucainum A (Alpha-Eucain) loc. Anästheticum. Ext. in wässerig. $^1/_2$—1%igen Lösungen u. Salb.; subc. bis 0·05 (!) p. d. u. 0·15 (!) p. die, ebenso d. absolut reizlose u. noch weniger toxische **Eucainum B** (Beta-Eucain) *(0·1=10).*

Eucasin. Nährpräparat. 30 b. 40 *g* in Suppe *(10=20).*

Euchinin. Int. 0·2—1·0 p. dos. mehrm. tägl. in Pulv. (Als Ersatz d. Chinin) *(0·1=6).*

Eudermol (salicyls. Nicot.) ext. in 0·°/$_0$Salb *(0·1=160).*

Eudoxin (Nosophen-Bismuth) int. 0·3—0·5 p. d. m. tgl. *(0·1=8).*

Eugallol (Pyrogallolmonoacetat) ext. zu Pinselung. (mit Aceton aa.) *(1=15).*

Eugenol (0·2—0·7 p. d. ad 3·0 p. die) als Antipyretic. u. Antiseptic. mit schleimig. Vehik.; Klysm. *(1=8).*

Eunatrol (ölsaures Natron). Int. zu 0·25 in Pillen m. m. tägl. (bei Cholelithiasis) *(1=20).*

Euphorbiae pilulíferae Hb. als Antiasthm. in weinig. Dct. od. besser das alkoh.-wässerige **Extract.** E. p. 0·05 p. d. ad 0·10 p. die *(1=12)* od. — **Tct. E.** 10 bis 30 Tpf. p. d. *(10=8).*

* ° **Euphorbium Resina** zu reizenden Salben, Pflast., *Streupulv. (10=14).* — **Tct. *Euph.*** *zu Verbänden und Pinselungen.*

Euphorin *(Phenylurethan). Innerl. als Antipyr., Antirheum. u. Analget. 1·0—1·5* p. die in Oblaten oder in Wein. Ext. als Streupulv. bei Geschwüren *(1=18).*

Euphthalmin. 2—10% Lösung. (Mydriaticum) *(0·01=30).*

Euresol (Resorcinmonoacetat) ext. z. Einreib. *(1=18).*

Eurobin (Chrysarobintriacetat) zu Pinselungen in Lösungen mit Aceton od. Chloroform *(1=22).*

Europhen (Cresoljodid) in Pulver- und Salbenform (2—10%) bei Ozaena, Leucorrhoe, Ulcera *(1=54).*

Eurythrol (Organextract aus Rindermilz). 1-2 Theelöff. täglich *(1=10).*

Evonymi atropurpurei Rad. als **Extr. fluid.** (Abführm.) 1 bis 2 Theelf. *(10=50).* — **Evonyminum** (Resinoid) 0·02 bis 0·05! p. d. ad 1·0! p. die in Pill. (mit od. ohne Extr. Hyosciam) *(1=50).*

Exalgin 0·03! p. d. ad 0·12! p. d. in Pulv. Analgetic. *(1=40).*

Fabae — Farina Fabae. Nährmittel *(100=20).*

— **Calabaricae** s. Physostigma.

— **St. Ignatii** in $^1/_2$ so gross. Dos. wie Nux vomic.

Fabianae imbricatae Hb. als **Extr. fluid.** (Diuretic.) 1·0 b. 2·5 p. d. 1—2 st. in Mixt.

Fango. Mineralschlamm aus Battaglia. Ext. bei chron. u. rheum. Erkrankungen.

Farfarae °Folia u. **Flores** wie **Fol. Alth.**

Fel Tauri (recens) 5·0—15·0 p. d. m. t. (in Lösung u. Mixt. m. aromt. Wässern); zu Salb. u. Liniment. — **F. Taur. inspissatum** 0·5—1·5 p. d. m. t. u. Pill., Lös. (wie oben); zu Salb., Liniment., Klysm. (5·0—10·0 ad clysm.) *(1=3).* — **Fel Taur.**



t sicc. u. — **Natrium holicum** in ½ so n Dosen.
int. 1·0—1·5 p. d. *(1=24).*
(Ferropyrin) ext. verform, wäss. Lös. %); int. 0·2—0·3 p. Haeosacch. menth. Hämostaticum) *(1*

Malatis Extract. ct. Ferri pomatum) 5 p. d. m. t. in Pill. *(10=20).* — *°**Tinct. Ferr.** (Tinct. Ferri) 10—60 Tpf. (0·5) p. d. m. t. in Wein, auf Sac- *(10=18).* — **Vinum m** (martiat.). (1 Ext. om. : 100 bis 200 *10=16).* (Doppelverbindung Eisenoxydsaccharat Chlornatriumsac-), int. 1 Theelöffel ägl.
tin ext. in 10→40% int. 0·3—0·5 p. dos. staticum) *(1=12).*
aceticum liquid. (Li- ferr. acet.) 5—20 . d. m. t. in aromat. *10=8).* — °**Tct. Ferr. ether.** 10—50 Tpf. p. m. t. auf Sacchar., Wein *(10=14).*
etic. siccum 0·05 bis . m. t. in Pill. *(1=3).*
ninatum liquid. (Li- rr. albumin.) (1½—2 . p. d. 2—4m. t.; nject. 0·5—1·0 p. d. *100).* — **Ferr. alb. solu- lamellis** 0·5—1·0 p. d. v. u. Lös. *(1=5).*
cum oxydulat. 0·003 7 p. d. 1—2m. t. od. Lösung.

F. bromatum 0·05—0·25 p. d. m. t. in Pill. od. Lösung.; zu Pinsel. u. Inh. *(1=5).*
— *°**carbonicum saccharat.** 0·2—0·5 p. d. m. t. in Pulvern, Pillen *(10=24).* — °**Pilulae Ferri carbonic.** (Vallet'sche Pillen) 1—10 Pill. p. d.
— **chloratum** (muriatic. oxydulat.) 0·1—0·3 p. d. m. t. in Lösung. — **Liq. Ferr. chlorat.** 0·2—1·0 p. d. 2—4 m. t. in Syrup oder Wein. — °**Spirit. ferri chlorati aether.** s. Ferr. sesquichl.
— °**citricum oxydatum** 0·1—0·6 p. d. 2—4m. t. in Pill., Pulv., Syrup.; subcut. Inject. 10% Lös. (0·1 p. d.) *(1=3).* — *°**citricum ammoniatum** 0·2—1·0 in Pillen, Pulv. in Lös. *(1=8).* — **Ferr. citric. cum Chinino citrico, siehe Chinin. Ferro-citric.**
— ***hydro-oxydatum dialysatum** 5—10—20 Tpf. p. d. ext. Hämostatic. und Styptic. *(10=8).*
— **hypophosphorosum.** — **Syrupus Ferr. hypophosph.** theelöffelweis.
— **jodatum** 0·05—0·3 p. d. ad 0·5 p. die in Pulv., Pill., Lösung., Glycerin.; zu Salb. (1·0—2·0 : 5—10), Bädern (25·0—60 p. baln.), Inj. (0·1—1·0 : 100) *(1=6).* — °**Liquor ferri jodati** s. Ferr. acet. liquid. — **Ferr. jod. saccharatum** 0·25—1·0 p. d. ad 2·0 p. die in Pulvern, Pillen, Pastillen. Lösung *(1=6).* — *°**Syrup. Ferr. jodati** 1·0 b. 6·0 [illegible] m. t. i. Mixt. Syr. *(10=15).*
— ***lacticum** 0·1—0· Pulvern, Pille =4).

* **F. oxychloratum solutum** (Liquor ferri oxychlor.) s. F. sesquichlor. sol.

— **oxydatum fuscum** 0·2—1·0 p. d. m. t. Pulv., Pill.

— °**oxydatum saccharat. solubile** 0·5—3·0 p. d. (bei Arsenintoxicat. theelffw. $^1/_4$—$^1/_2$ stdl.) in Plv., Pill., Pastill., Lös. *(10=10)*.

— — °**Syrup. Ferr. oxyd. solub.** (Eisensyrup) $^1/_2$—2 Theel. p. d. 3—6m. t. pur.

— **oxydatum oxydulatum** (Aethiops martialis) 0·15 bis 0·5 p. d. in Pulvern, Pillen *(1=3)*.

— **peptonatum siccum** *(1=8)* **Liq. ferri peptonati** wie **Ferr. alb. solub. i. lamell.**

— **phosphoricum** (oxydulat.) *(1=3)* wie **Ferr. oxydat. oxydulat.** — **Ferr. Phosph. oxydat.** ebenso.

— *°**pulveratum** 0·1 - 1·0 (5·0 bis 10·0 p. d. als Antidot) p. d. m. t. in Pulvern, Pillen, Trochisc., Wein *(10=8)*.

— **pyrophosphoricum oxydat.** *(1=3)* wie **Ferr. oxydat. oxydul.** — **Ferr. pyroph. c. Ammonio citrico** 0·1 - 0·5 p. Lösung., Mixt.; als Aetzmitt. pur oder als Styptic. (1 : 3—5 Aqua), mit Charpie (gut ausgepressen) (1 : 3—5 Aq.) od. Baumwolle (Gossypium haemostatic.), Pressschwämm. zu Touchir. pur; zu Injection (0·1—5·0 : 100—500 Aq.), Verbandw. Umschl.; zu Mund-, Ohr-, Augentropfen (0·2—4·0 zu 100), *Gurgelw.* (2·0—5·0 : 100), *Inhalat.* (1·0 - 20·0 zu 500 *Aq.*); *Salb.*, Supposit. *d. in Pulv., Pill.* u. Lös. *(10=30)*. — * **Ferr. et Natrium pyrophosphor.** ebenso, subc. (1 : 6 Aq.) $^1/_2$—1 Spritze *(1=4)*.

*° **Ferrum reductum** (Hydrog.) 0·05—0·2 ad 0·5! p. d. 2—4m. t. in Pulv., Pill. *(1=5)*. — **Eisenchocolade** (5·0 zu 1000·0). — **Eisenchocoladepastillen** (à 0·06). — **Eisen-Dragées** (à 0·05).

— * **sesquichloratum crystallisat.** *(10=10)* zu *° **Ferr. sesquichlorat. solut.** *(10=8)* (Liqu. Ferrum sesquichlor.) 0·1—4, 0·5—1·0 (2 bis 15 Tropfen) m. t. in (1 : 2—10). — °**Ferr. sesquichlorat. basic. solut.** (Liqu. Ferr. oxychlorat.) 5—20 Tpf. p. d. in Mixt., Syrup, aromat. Vehik.; zu Verbandw. Injectionen. — *° **Spirit. Ferr. sesquichlorat. aethereus** (Tinct. F. chl. aethera, Tct. nervinotonica Bestuscheffii) 0·3 bis 1·5 p. d. (10—50 Tpf.) m. t. pur od. mit aromat. Vehik., Syrup., Mixtur. *(10=12)*.

— **sulfuratum** 0·05—0·2 p. d. in Pill. *(100=20)*.

— *° **sulfuricum** (oxydulat.) pur 0·05—0·5 p. d. 2-4m. t. in Plv., Pill. (Blaudii mit Kal. carb.), Pastillen u. Lös.; Streupulv. (mit Alaun, Kohle etc.) Augenpulv. (0·5—1·0 : 10 Sacch.) zu Pinsel., Inject. (0·5 b. 2·5 : 100), Umschläge (2·0 b. 5·0 : 100), Bädern (25·0 b. 100·0 p. baln.), Augenwäss. (0·05—0·4 : 25 Aq.); Salben, Liniment (1 : 10 bis 30) *(10=4)*. — °**Ferr. sulfuricum crudum** (Eisenvitriol) zu Desinfection. von Fäcalmassen (für 1 Cbm. Latrineninhalt ca. 2—3 K.) (100=4). — *° **Ferr. sulfur. siccum** 0·03—0·2 p.

d. i. Pill. *(10=8).* — **Liquor Ferr. sulfur. oxydati** 0·5 b. 2·0 (8—30 Tropf.) p. d.; dient zur Bereitung von *° **Antidotum Arsenici** (Liq. Ferr. sulfuric. oxydat. (100 + 250 Aq.) hiezu unt. Umschütteln (ohne Erwärmen!) 15 Magn. ust. + Aq. 250) ist jedesmal frisch zu bereit. (braune Schüttelmixt. pur theebis essl öffelweise $^1/_4$—$^1/_2$ stündlich) (Dosis = *230*).

F. tartaricum als **Kal. ferrotartaric. pur.** (Tartarus ferratus) 0·2—0·5 p. d. m. t. in Lös., Pill., Mixturen *(1=4).* — * **K. Ferrotartar. crud.** (Globuli martiales) nur zu Bädern 30·0 bis 120·0 oder 1—4 Kugeln p. baln. (1 Stück = *40*).

*° **Filicis maris Rhizoma** (Rad.) 12·0—20·0 p. d. 2—4 m. t. in Pulv., Latw., Schüttelmixt., selten Dct. (30·0 bis 60·0 : 100 C.) *(10=12).* — *° **Extr. F. m.** (alk. Ph. G. aether.) 2·0—10·0 p. d. in Pillen, Kapseln, Electuarien *(1=25).*

Filmogen (Acetoncollodium). Vehikel f. ext. Applicat. v. Arzneistoffen *(10=58).*

Fluorol (Natrium fluoratum). Wundantisepticum 0·5 bis 1% Lösungen *(1=2).*

*° **Foeniculi Fruct.** (Sem.) 0·5 b. 2·0 p. d. in Pulvern, Latwerg., Inf. (5·0—15·0 zu 100 Col.), Spec. (1—2 Theelöff. auf 1 Tasse) *(100=24,* pulv. *10=8).* — *° **Aqua Foenic.** thee- bis esslw., Corrig. *(100=15).* — *° **Ol. Foenic.** *1*—3 Tpf. p. d. *(1=8).* — **Syrup. Foenic.** 5·0—15·0 p. d. Corrig. *(10=6).*

° **Foenugraeci Semen** 0·3—1·0 p. d. m. t. in Pulv., Spec., zu Cataplasmen und Bähungen in Inf. *(100=1?).*

Formalin (Formaldehyd.) Antisepticum in 1—2% Lösung *(10=14).*

Formalindextrin = Dextroform.

Formalith, mit Formalin getränktes Kieselguhr (als Desinficiens).

Formanilid (Phenylformamid), 0·25 p. d. 0·5, p. die, int. als Analgeticum; ext. als 50%ige Einblas. in den Rachen und Kehlkopf, in 1—3%iger Lös. als Gargarisma, ebenso a. Injection in d. Urethra u. z. subc. Injection *(1=28).*

Formicae rufae zu Bädern ($^1/_2$—1 Kilo u. mehr) und Bähungen. — ° **Spirit. Formicar.** 20—60 Tpf. (0·5 bis 3·0) p. d. m. t.; zu Einreib., Wasch. u. Bädern *(10=10).*

Formoform, Combination v. Formalin, Zinkoxyd und Stärkemehl. Gut. Ersatzmittel d. Jodof.

*° **Frangulae Cort.** (Dct. 10·0 b. 25·0 : 100—200 Col.) (m. Cognac o. Natr. sulfuric.) esslw.; zu Clysm. in Dct. — **Extr. frangulae fluidum.** Int. theelöffelweise als Abführmittel *(10=4).*

Fuchsinum (Rosanilinum hydrochloric.) 0·025 steigend bis 0·25! p. d. ad 0·5! p. die in Pulv., Pill., arom. Wäss. od. Mixt. *(10=6).*

Fucus vesiculosus. Dct. (10·0 b. 20·0 : 150—200 Col.). — **Ext. F. v.** 2·0—5·0 p. die in Pill., Mixt. (1=6).

° **Fungus Chirurgorum** ext. als Haemostatic.

° **Galangae** (Rad.) wie Rhiz. Zingib. (100=35, pulv. 10=10).

*°**Galbanum**, Gummi resina, 0·3—1·0 p. d. in Pillen, Emuls. (2·0—8·0 : 100); zu Pflast., Klyst. 2·0—6·0 p. clysm.) *(10=16)*.

Galega officinalis int. Infus. (10·0 : 200·0). — **Extr. G. o.** int. 0·5—1·0, 2—4m. tgl.

* **Galeopsidis grandiflorae** Hb. Inf. od. Dct. (15·0—30·0 zu 100 Col.) *(10=5)*.

*°**Gallae Halepenses** (Turcic.) 0·3—1·0 p. d. in Pulvern, Inf. (5·0—15·0 : 100 Col.); Streupulver Inf. od. Dct. (5·0—20·0 : 100 Col.), zu Mund- u. Gurgelwässern, Wasch., Inject., Klyst., Bäd. (100·0—200·0 p. baln.), Salb. (1 : 5—10) *(10=8)*. — *°**Tct. Gallar.** 0·5—2·0 (10 b. 40 Tpf.) p. d. m. t.; zu Pinsel., Mundwäss., Inj. (5·0—10·0 : 100—150), Einreibung. *(10=8)*.

Gallanolum, Gallussäureanilid; ext. als Pulv. (pur od. 1 : 2 Talcum) Salb. (1—7 : 30 Vaselin) in alkohol. Lös. (1 : 5), mit Traumaticin (1 : 10), bei Psoriasis, Ekzem, Favus etc. *(1=20)*.

Gallicin (Gallussäuremethyläther), zu Streupulver bei Augenaffectionen *(1=24)*.

Gallobromolum, Dibromgallussäure. Int. 2·0—3·0 tgl. in wässer. Lösung mit einem säuerl. Syrup als Sedativ. Ext. in 1·5—2% Lös. zu Umschlägen, Injectionen u. Inhalationen *(1=20)*.

Gaultheriae procumbens Hb. Inf. (5·0—15·0 : 100 Col.). — **Oleum Gaulther.** 5 bis *10 Tpf. p. d. m. t. ad 8·0 p. die (mit Magnes. carb.) in Kaps. (1=12)*.

Geissospermi Leeve Cort. *Herzm Dct. (30·0 : 500 Col.).*

Gelanthum, externes Vehikel (Firniss) für die Dermatotherapie.

***Gelatina animal. alba** (Thierleim) Dct. (1·0—8·0 : 100 Col.) als Gelatina tabulata (Bouillon-Tafeln); ext. zu Bädern (½—2 K.), Frostbeulen, zu Klyst.; als Excipiens u. Constit. Deck- und Klebem. etc. *(10=12)*. — Ebenso ext. Gelosinum (Gallerte aus Algen, Caragaheen etc.).

Gelsemii sempervirentis Rad. 0·05—0·4 p. d. m. t. ad 1·0 p. die *(10 = 5)*. — **Extr. fluid G. s.** 0·03—0·4 pro die ad 0·5 pro die *(10=20)*. — **Tct. G. s.** 5—30 Tpf. pro die (1·0—3·0) ad 5·0 p. die *(10 =12)*. — **Gelseminum hydrochlor.** 0·001—0·005! p. d. ad 0·015! p. die in Pill. *(0·1=1?)*.

*°**Gentianae** Rad. 0·5—2·0 p. d. in Pulv., Spec. (alkoh. oder wässer.), Macerat.; Inf., Dct. (3·0—15·0 : 100° b. 200 Col.) *(10=3*, pulv. *10=8)*. — *°**Extr. Gent.** 0·5—2·0 p. d. m. t. i. Pill., Mixt. *(10 = 35)*. — °**Tinct. Gent.** 1·0 bis 2·5 m. t. *(10=8)*.

Geosot, s. Guajacol. val.

Glandulen (Organpräparate aus Bronchialdrüsen) in Tabletten zu 0·25; 1—5 Tabletten tgl.

Glutoidkapseln. Umhüllung von Medicamenten, die erst im Darme zur Wirkung gelangen sollen.

Glutoform, durch Einwirkung von Formaldehyd auf Gelatine. Als Trockenstreupulver (1=16).

Glutol (Formaldehydgelatine), pulverförmiges Anti-septicum. Gebrauch

Form des Streupulvers *(10=170)*.

*° **Glycerinum** thee- b. esslw. ad 40·0—100·0 p. die ext. pur oder mit Aq. verd. als Verbandm., Augenm., Einreib., Bepinsel., Inj., Klyst. (2·5—5·0 pur oder mit $^1/_3$—$^1/_2$ Aq. verdünnt), Inhalat. (pur oder 1:5 b. 10 Aq.); zu Tampons; als Const. u. d Excip. für verschied. Mittel. *(10=6)*. — **Glycérolés** (Glycerolate) sind conc. Lös. von Alkaloiden, Metallen, Extracten etc. in Glycerin. — **Glycelaeum** (1 Farin. Amygdalar. : 2 Glycer. : 6 Ol. olivar.) zu Salben, Verbänden. — **Glyconium** (4 Vitel.ovor. : 5 Glycer.) Deckm. — *° **Unguent. Glycerini** zu Verbänden, Augensalben *(10=12)*. — **Glycérés** s. conc. Lös. von Alkaloid, Metall etc. in Unguent. Glyc.

Glykosolvol. Antidiabeticum.

Gonorol. Gereinigtes Santalöl. Verwend. w. d. *(1=20)*.

° **Gossypium depuratum** (ger. Baumwolle).

Gossypii herbacei rad. Cort. 0·3—0·6 p. d. in Pulvern, Dct. (10·0—15·0 : 100—200 Col.). — **Ext. fluid. G.** 1·0 bis 5·0 p. d. 1–3m. t. ad 15·0 pro die *(10=20)*.

* **Graminis** (Rhizom.) Rad. Dct. (30·0—100·0 : 100 bis 200 Col.). Spec., Succ. recent *(100=18)*. — * **Extr. Gram.** (Mellago G.) thee- bis esslw. *(10=30)*.

*° **Granati (radic.) Cort.** Mac.-Dct. (30·0—100·0 : 200 bis 500 Col.) *(10=8. 10=12)*. — * **Extr. Gr.** d. 2—3m. t. in M[illegible]

Graphites depuratus zu Salb. u. Seifen *(10=2)*.

Gratiolae Hb. 0·1—2·0 p. d. ad 3·0 p. die in Pulv., Pill., Dct. od. Inf. (2·0—10·0 zu 100—150 Col.) zu Klyst. (in Dct.) *(10=4)*. — **Extr. Grat.** 0·2—1·0 p. d. in Pill., Lös. *(1=10)*

Grindeliae robustae Flor. (Anticat.) als Extr. fluid. 0·2—0·4 (1·0—2·0 b. Asthma) p. d. m. t. in Mixt. oder Milch. — **Extr. Gr.** (alcohol.) 0·10—0·15 p. d. s. m. t. in Pillen *(10=20)*. — **Tct. G.** 15—20 Tpf

Guaethol (Brenzkatechinmonoäthyläther) 0·1—0·25 p. dos., 1·0 p. die in Gelatine-Kaps. od. alkohol. Mixt. (b. Tubercul.) *(1=3?)*.

*° **Guajaci Lignum** 15·0—60·0 p. die in Spec., Pulv., am häufigsten in Dct. (15·0 b. 30·0 : 100–200 Col.) *(10=2)*. — ***Resina G.** 0·3 bis 1·0 p. d. 2—4m. t. Pulver, Pill., Latw. Emuls. (2·0 b. 8·0 : 100), Lösung., Mixt. *(10=20)*. — *° **Spec. lignorum** Lign. G. raspat. 5, Rad. Ononid. 3, Rad. Liquirit., Lign. Sassafras aa. 1, Dct. (25·0 60·0 : 500—1000 Aq.) p. die *(100=40)*. — * **Tct. G.** 15—50 Tpf. p. d. m. t. in Mixt. *(10=12)*.

Guajacetin (Brenzkatechinmonoacetsaures Natron) int. 0·5 m. tgl. in Tabletten, I[illegible]sserig. Lösung

Guajacolum [illegible] in Kapseln [illegible] gend bis in 1%ig. (0·5 : 2[illegible] dotter.) Kinzelle Lanolin

subc. 0·5—1·0 p. d. Inhalationen 25—30 Tpf. : 1000 Wasser *(10=75).*

G. benzoicum, Benzosol, int. 0·25 m. t. steigend bis 2·5 p. die als Darmantiseptic. 1—10 Grm. tgl. *(1=34).*

— **carbonicum** (Duotal) int. 0·5—1·0 p. d. steigend bis 6·0 p. die *(10=180).*

— **phosphoricum,** int. 0·4—0·6 pro die *(1=34).*

— **salicylicum** wie d. vorige *(1=35).*

— **valerianicum** (Gosot) 0·2 p. dos., 0·4—0·6 p. die in Gelatinekapseln *(1=28).*

***Guarana Pasta** 0·5—4·0 p. d. in Pulv.; bei Dyspepsie d. Kind. 0·3-1·5 p. d. 2-3m. t. (mit Sacchar.) *(1=4).*

*°**Gummi Arabicum** 1·0—10·0 p. d. in Pulv., Lösung., Mixt., Emuls., Syrup; als Excipiens für Kampfer, scharfstoff. M. etc. *(10=14,* pulv. *10=18).* — ***Mixt. gummosa** (10 G. Arab., 5 Sacch., 150 Aq.) esslw. pur ad Mixt. — *°**Mucilago G. Arab.** (1 : 2 Aq.) pur od. Mixt.; Constit. zu Mundwäss., Einspritzungen, Pinsel., Klystiren etc. *(10 = 10).* — ***Pasta gummosa albuminata** (Eibischteig), Hustenmitt. *(10=18).* — *°**Pulv. gumm.** (Amyl., Rad. Liquirit. p. aa. 1. G. A. u. Sacchar. aa. 2) theelw., Constituens. f. Pulv. u. Pill. *(10=12).* — **Syrup. gummos.** (Mucilg. G. A., Syrup. simpl. aa.).

°**Guttapercha depurata** zu *fixirend.* Verbänd. Zahnkitt *(1=16).* — ***Traumaticinum*** *(1 Guttap. : 10 Chlorof.) wie Collodium (10 = 32).*

†**Gutti** *(Gummi) 0·01—0·3! p. d. ad 1·0! p. die* in Pulv., Pill., Emul. (0·3—0·5 : 1[illegible] *(1=4).*

Gymnema silvestris. Z. H[illegible] stellung v. Kautablett.

Acidum gymnemicum z[illegible] Bepins. in 1% wäss. Lö[illegible]

Gynocardiae Oleum (Ol. Chau[illegible] moograe) 5—20 Tpf. p. [illegible] 1—3m. t. ad 1·0 p. die [illegible] Emuls., Milch; in Sal[illegible] (1 : 10—20) *(1=6).* — **Ac[illegible] gynocard.** 0·02—0·2 p. [illegible] m. t.; in Salb. (1·0 [illegible] 2·0 : 30—40) *(1=30).*

Haemalbumin int. 1·0 m. t[illegible] *(10=80).*

Haematogen Hommel, gere[illegible] (concentrirt. Hämoglobi[illegible] int. 1—2 Esslöffel tä[illegible] *(1 Fl. = 400).*

Haemogallol int. 0·5 m. t[illegible] in Pulvern *(1=25).*

Haemoglobin (Nardi). I[illegible] 0·5-1·5 mm. tägl. in Pu[illegible] oder Chocoladepas·ille[illegible] für die Kinderpraxis [illegible] sonders geeign. *(10=8[illegible]*

Haemolum 0·4 p. dos., 1·5 [illegible] die. int. *(1=18).* — **arseniatum** int. 0·1 p. [illegible] 0·3 steigend bis 1·0 p. d[illegible] in Pillen. — **H. bromat[illegible]** 1·0 p. dos., 4·0 p. die [illegible] Pulver. — **H. cuprat[illegible]** int. 0·1—0·5 m. tgl. [illegible] Pulv. o. Pillen. — **H. f[illegible] ratum** int. 0·5 p. d., 1·5 [illegible] die in Pulv. — **H. hydra[illegible] gyro - jodat.** Innerl. An[illegible] syphiliticum. 10 0 f. 50 Pi[illegible] 3m. tgl. 2 Stück *(1=34).* — **H. jodatum** 0·2—0·3 p. do[illegible] 0·6—0·9 p. die in Pille[illegible]

Haemostat in Tuben, geg[illegible] Nasenbluten (von Ha[illegible] mann, St. Gallen, d[illegible] gestellt.)

Haemotrophin (Hausma[illegible] Eisenmittel in Fla[illegible] à 250·0 Grm., fest i[illegible] bletten mit Choc[illegible]

Hamamelidis Virginicae Cort. 0·1—0·5 p. d. m. t. in Pulv., Pill., Dct. (15·0—30·0 zu 100-200 Col.) *(10=6).* — **Extr. fluid. H. V.** 2·0-8·0 p. d. 2 bis 3stündlich in Syr., Mixt. *(10=18).* — **Extr. H.V.siccum** (Hamamelin od. Hamamelidin) 0·03—0·05 p. d. m. t. in Pill.; zu Salb. (2—4 : 20 bis 30), Supposit. 0·05 b. 0·1). — **Hedonal.** Hypnoticum, bei Neurasthenie, Depressionszuständ. etc. $1^1/_2$-2 Grm. als Pulv., ev. in Oblat. Auch per Clysma.

Hefe. In Dosen bis zu 50 Grm. pro die bei Furunculose und Diabetes.

°**Helenii Inulae Rad.** 1·0—2·0 p. d. m. t. in Pulv., Inf., Dct. (5·0—15·0 : 100 Col.); zu Waschpulv., in Dct. zu Umschl., Salb. *(100=30).* °**Extr. H.** 0·3—0·6 p. d. m. t. *(1=5).* — **Helleninum** (Alantkampf.) 0·01—0·3! p. d. ad 1·0! p. die in Pulv., Pill., alkoh. oder öl. Lös.; zu Pins. (m. Lös.) *(0·1=8).* — **Alantolum** wie Helenin *(0·1=25).*

Helleb or viridis (Rad. Rhizom. 0·03—0·3) p. d. ad 1·2! p. die in Pulv., Dct., Macerat, Inf. (0·2—2·0 zu 100 Col.). — **Extract. Helleb. v.** 0·5—0·1 p. d. ad 0·3 p. d. *(1=16).* — **Tct. H.** 10-30 Tpf. p. d. *(10=20).* — **Helleborei-num** 0·01-0·03! p. d. ad 0·12! p. die in Pill. und Mixtur. *(0·1=20).*

Hemicranin int. 0·3—1·0 p. d.

***Herniariae glabrae Hb.** in Spec. u. Dct. (5·0—15·0 zu 100 Col.) *(10=4).*

Heroin (Morphindiessigsäureester) **muriat.** int. 0·005—0·01 p. d. m. tgl. in Pulv. oder Tropfen, subc. in 2% Lös. 0·005 bis 0·01 *(0·1=15).*

Hetol = Natr. cinnamylicum.

Hetokresol = Cinnamylmetakresol.

*° **Hirudines** (Blutegel) *(1 St. = 20).*

Holocainum muriaticum (Amidin). Local-Anästheticum z. Ersatz des Cocain in der Augenheilkunde. 1%ige wässerige Lös. *(0·1=10).*

Holzin (Flussigk., bestehend aus 35% Formaldehyd, 5% Menthol, 60% Methylalkohol), in Dampfform zur Desinfect. v. Krankenräumen, ärztlichen Instrumenten etc. *(10=40).*

°† **Homatropinum hydrobromic.** (Mydriatic.) 0·015—0·03 p. d. in Pulv., Pill.; zu Instill. (0·05 : 10 Aq.) tpfw. *(0·01 = 35).* — **Homatrop. muriaticum** und **sulfuricum** ebenso 0·06! p. d. ad 0·24! p. die *(0·01=35).*

Hurae Brasiliensis rad. Cort. (Drastic.) 0·1—0·4 p. d. 2—4m. t. in Pulv., Dct. (0·5—1·0 : 150—200 Col.).

Hydracetin (Antipyret. und Antineuralgicum) 0·1-0·15 (auch 0·3) pro die; äusserl. bei Hautkrankh. *(0·1=8).*

Hydrargyrum aceticum oxydat. selten int. 0·006—0·05 p. d.; meist als Cosmetic. (Sommersprr. etc.) in Lös. (1·0 - 1·5 : 100 Aq.) *(0·1=2).* — **H. acetic. oxydulat.** selten int. 0·01—0·05 p. d. 2—3m. t.; häufig in Salb. (1·0—2·0 : 25).

— **aethylochlor.** subc. (0·1 : 10 Aq.) $1^1/_2$-1 Spritze (0·1=30).

— **benz. oxydatum** in $^1/_2$%iger Lösung. + xt. und intraparenchymatös.

*°† — **bichloratum corrosivum** (Sublimat) 0·003—0·

ad 0·10! p. die in Pill. (m. od. ohne Opium) od. alkohol. u. wässerig. Lösung (0·1 : 20 u. hievon 12 bis 20 Tpf.), Glycer. od. Syr.; als Aetzm. concentr. Lös. (0·5—1·0 : 10 Aq. Alkohol, od. Collod.); verd. Lös. als Antiseptic. in Mund-, Gurgelwäss. (0·05—0·1 zu 500—1000), Augenw. (0·01 zu 25—100); Inhalat. zerstäub. (0·01 – 0·05 : 500 bis 1000); Umschläg., Verbänd., Waschung. (0·1 b. 0·5—1·0—2·0 : 100—500), Inject. (1 : 1000—2000 m. od. ohne Kochsalz); in der Urethra 0·1 - 0·2 : 100 Aq., auch 0·05 : 1000 bei frisch. Gonorrh. 3m. t.; in die Vagina 0·3—0·6 : 100; 0·01 b. 0·03 : 100 i. d. Nase etc., Pinsel. (0·5—1·0 : 100, am besten Glycerin, auch Aq. od. Alkoh.); Bädern (10·0 bis 30·0 p. baln.), Localbäd. (0·5—1·0), Salben (0·5 bis 1·0 : 25); subcut. Inject. (10 : 100 Aq.) 0·005—0·01 p. d. 1—2! m. auf verschied. Stell. zu injic. (bes. empf. wird e. 1% Sublimatlös. + 3% Salzlös. *(1=4)*. — **Aq. phagedaenica lut.** (Hyd. bichl. corros. 1 : 100 Aq. Calcis.) *(100=40)*. — **Aq. phagedaenic. decolor.** (Hyd. bichl. corros. 1 Ammon. chlor. 2 Aq. 100). Beide zu Verbänden *(100=40)*. — **Hydrarg. bichl. albuminat. solut.** int. wie oben mit Milch, Kaffee etc., häufig zur subcut. Injection 0·005 bis 0·01 p. d. — ***Hydrarg. bichl. ammoniat.** (H. praecipitat. albnm) nur ext. als *Streup. (1 : 25—50* Sacch.), *Salbe (1 : 10—25) (1=5)*. — **Hydr. bichl. carbamidat. solut.** (1 Ccm. enthält 0·01 Subl.) wie H. bichl. album. sol. Ebenso: **Hydr. peptonat. solubile** *(1=6)*. — **Hydr. bichl. c. Natrio chlorato-solut.** — Hydr. sero-albuminat. — Hydr. bichloro-jodatum wie Sublimat. — **°Ung. Hydrarg. alb.** (H. p. a. 1·0, Paraffin 9·0).

°†H. bijodatum rubrum wie Sublimat *(1=8)*.

— **carbolicum** (diphenylicum) 0·02—0·03 p. d. 2—3m. t. (Kindern 0·004—0·005 p. d. 2m. t.) in Pill. *(1=16)*.

— **°chloratum mite** (laevig. Calomel) (0·01—0·2 p. d. m. t., als Laxans 0·2 bis 1·0 p. d. in Pulv., Pill. und Trochisc.; als Streu-, Schnupf-, Schlund-, Aug.-pulver (pur oder 1 : 1—10 Sacchar.), zu Inj. (0·1 b. 0·5), Klystier. (0·10—0·50 mit schleimig. Mitteln), Salben (1 : 5—10), Suppositor. (ebenso); Räucher. (0·5—1·5 p. Räucherung), subcut. Inj. (0·01—0·02 p. d.) *(1 = 5)*. — ***H. chlorat. mit. praecipitatione parat.** 1/3 so grosse Dos. *(1=8)*. — **°H. chlorat. mit. vapore parat.** 1/2 so grosse Dos. *(1=4)*. — **Aq. phagedaenica nigra** (Calom. 1 : 60 Aq. Calc.) zu Verb. *(100=20)*.

— **colloidale** int. in Pillen zu 0·01, ext. in Salben (10%). subcut. in 2% Lös. *(1=26)*.

— **° † cyanatum** 0·005 bis 0·03! p. d. ad 0·1! p. die in Lös., Pill., Pulv.; zu Gurgel- u. Augenwäss. (0·05—0·1 : 100), Inject., Verbandwäss. (0·1—0·3 zu 100), Salben (0·5—1·5 zu 25—50), subcutan. Inject. (0·006 p. d.) (1=10).

H. (metallicum) depurat. 150·0—350·0 p. d. zu Mercurius gummos. Plenckii 0·1–0·2 p. d. (als Lax. 0·3 b. 1·0 p. d. 2–4m. t. *(10=14)*. — **Hydrarg. saccharat.** — **Pilulae coeruleae** (à 0·06 Hydrarg.) 2—8 Pill. als Lax. — °**Emplastrum Hydrarg.** (Hydrarg. 1 : 4) *(10=15)*. — °**Unguentum Hydrargyrum cinereum** (1 : 2) in Einreibungen zu local. Zwecken 0·5—4·0 p. die auf 1—6mal einzureiben (mit oder ohne Zusatz zu Sublimat, Jodkalium, Terpentin, Campher, Opium, Belladonna etc.), zu Schmiercuren (1·5—4·0 p. die); z. Suppositor. (0·2–0·5—2·5 zu Ol. Cacao, Sapo oder Cera), Pessarien etc. *(10=18)*.

— **formamidatum solut.** zu subcutan. Inj. 0·01 p. die *(10=12)*.

— *† **Jodatum flavum** 0·01 bis 0·05! p. d. ad 0·20! p. die in Pulvern, Pillen und Past.; Salb. (0·5—5·0 zu 25—50), Augensalben (0·1 bis 0·5 : 10—25) *(1=8)*.

— **nitricum oxydatum** *(1=4)* u. **oxydulatum** *(1=3)* 0·004 bis 0·015! p. d. ad 0·06! p. die in Lösung und Pill. zu Ungt. Hydr. citrini zu Einreib. und Verbänden.

— **oleïnicum** zu Einreib. 0·5—2·0 p. d. 1—2m. t. (auch m. Morph. combin.) *(10=30)*.

— **oxycyanatum** ext. in wäss. Lös. (1 : 500). (Zum Bespül. d. Augenlider) *(1=18)*.

— *† **oxydat. flavum** (via *humida parat.*) 0·006 bis *0·03! p. d.* ad 0·1! p. die *in Pulv., Pill.*; Streupulv. *pur* oder mit anderen Mitteln, Schnupf-, Kehlkopfpulv. (1 : 8—50 Sacch.), Augenpulv. (1 : 5—10 Saccharr. od. Argill.), Salben (0·5—1·0 : 10—20), Augensalben (0·1—1·0 : 10—20) *(1=6)*. — †**oxyd. rubrum** (Mercur. praecipit. rubr. ebenso) *(1=5)*. — °**Unguent. Hydr. rubrum.** — **Unguent. ophthalmicum** (Hydrarg. oxyd. flav. 0·1 : 50 Axung.).

H. oxydulatum nigrum (Merc. solub. Hahnemanni) 0·03 bis 0·2 p. d. 2—3m. t. in Pulv., Pill.; zu Salben (1—5 : 25) *(0·10=2)*.

— **phosphor. oxydat.** 0·01–0·06 p. d., allmälig steigend in Pulv., Pillen *(0·1=2)*.

— °**praecipitatum album**, siehe Hydrarg. bichlorat.

— **salicylicum** p. die 0·001 b. 0·075, allmälig steigend in Pill.; zu Injectionen (0·1 : 250 Aq. und Natrii bicarbon. 1·0) *(1=8)*.

— †**succinimidatum** 2% Lös. subcutan; 1 Pravaz'sche Spritze p. die.

— **sulfoichthyolicum** (10 Natr. sulfoichthyol. + 3 Hydr. bichlorat. corrosiv.) siehe Ichthyol.

— **sulfuratum nigrum** (Aethiops mineralis) 0·1—1·0 p. d. 2–3m. t. in Pulv., Pillen *(1=4)*. — **H. sulf. rubrum** (Zinnober), int. ebenso; ext. zu Salben, Räucher. und Cigaretten *(10=20)*.

— *†**tannicum oxydulatum** 0·05 bis 0·1 p. d. 2—3m. t. in Pulv., Pillen (auch mit Acid. tannic. oder Opium combinirt) (1=15).

— **thymolo-aceticum**, wie H. salicyl. (1=16).

Hydrargyrol (Quecksilber-paraphenylthiolnat), A. septicum.

***Hydrastidis Cannadens. Rad.,** Rhizoma (Hämostat.) *(10 = 20)* als ***° Extr. fluid.** 0·30—2·50! (5—45! Tpf.) 2st. p. d. ad 10·0! p. die mit Wein, Syrup, Mixtur *(10=34).* — **Extr. H. C. rad. siccum** 0·05—0·25 p. d. 2- bis 5stdl. *(1=20).* — **Hydrastin. hydrochloric.** 0·03—0·1 p. d. ad 0·2 p. die in Pulv., Pill. *(0·1=24).* — **Tct. H. C. rad.** 20—30 Tpf. p. d. *(1 = 4).*

Hydrochinonum 0·2—0·8! p. d. ad 1·0 p. die in Lösung, Pulv.; subc. (in frischer 10% Lös. 1–2 Spritzen); inj. bei Gonorrhoe etc. (1–2% Lös.), zu Umschl. (1–4%), Salben (1 : 30) *(1 = 8).*

Hydrocotylis Asiaticae Hb. 0·3—3·0 p. d. 3m. t. ad 10·0 p. die in Pulvern. — **Rad. H. A.** 0·1—0·4 p. die in Pulv., Pill., Dct. (0·5 zu 100 Col.) — **Extr. H. A. rad.** zu Umschl., Salben.

Hydrogenium hyperoxydatum int. als Aqua H. h. (pur od. mit 1 Tpf. Salzsäure) thee- bis esslöffelw.; bei Diphtheritis int. 2% Lös. ext. zu Verbänden, Inh., Gurgelw.; a. Desodorans, Bleichm. *(100=50).* – **Ozonäther** (Aq. H. hyperoxyd. + Aether) zur Desinfect., auch int. 6·0 p. die bei Diabet.

***Hydromel infantum** (Inf. lax. Vien 30 : Syr. mannat. 10) theelw. *(10=10).*

Hydronaphtolum wie Naphtolum.

Hydroxylaminum hydrochloric. Antisepticum *(1=22).*

Hygiama. Diäteticum.

Hygrophilae spinosae Rad. in *Dct. (20·0—30·0 : 250—500 Col.) als Diuretic.*

***°† Hyoscyami Fol.** *(Hb.)* bis 0·3! p. d. ad *1·0!* (Ph. G. 1·5! *p. d.*) Pulver, Pillen *(10 = Species,* Inf. (0·5—1·0 Col.); ext. in Inf. (5·0 10·0 zu 100 Col.) z. Um Mund-Gurgelw., Kly (1·0—2·0 : 100 Col.); Cataplasm., Cigaret — ***†° Extr. H.** 0·02—0· p. d. ad 0·5! p. die (G. 0·2! p. d. ad 1·0! die) in Pulv., Pill., Mi ext. zu Waschung., In tion. (1·0—3·0 : 100), halat. (0·05 bis 0·3 : 1 Bädern (100·0—200·0 baln.), Klysm. (0·05—0 Liniment., Salb. (1·0 2·0 : 10), Supposit. *(1=* — **°Ol. H. folior. coct.** bis 2·0 p. d. m. t. zu reib., Klyst (5·0—30 Eintröpfelung. *(10=8)*

Semen Hyosciam. 0·05—0· d. m. t. in Pulver, P Emuls. (0·3 - 1·0 z. 100) Räucherung *(10=4).*

Hyoscyaminum crystalli 0·001—0·003 p. d. ad 0·0 p. die (auch 0·03! p. in Pulv., Pill.; ext. Instillat., (0·05—0·1 bis 50 Aq. : 10—20 Spirit.), subcut. Inj (0·005—0·01); Salb. (1 3 : 10) *(0·01=30).* — **°† scinum hydrobromic.** *(0· 15)* u. **hydrochloric.** (sicht!) 0·0002 b. 0·0007 ad 0·001! p. d. in Pill. Instillat. (0·01 zu 100 *(0·01=15).*

Hypnalum, Monochloral-A pyrin (Hypnotic.) 1·0 3·0 in Pulv. od. wäss Lösung *(10=250).*

Hypnonum (Acetophe 0·2—0·5 p. d. in Ge Kapseln; Perles (a

mit Glycerin oder Ol. amygdal. gemischt). Syr., Mixt. *(1=25)*.

rgol = Hydrargyrum colloidale.

aborandi Fol. Inf. (3·0 bis 6·0 u. ad. 8·0! : 100—200 Col.); zu Klysm. (Inf. 3·0—10·0 : 100—200 Col.) *(10=14)*.

Jalapae Tuber. 0·05—0·3 p. d. m. t. (Reizm.), 0·3 bis 0·5 (Purg.) 1·0—3·0 (Drast.) p. d. m. t. auf einmal od. in dos. refract. in Pulv., Pill., Latwerg *(10=15)*. — °° **Resina Jalap.** 0·03—0·20 (Reizmittel) p. d. m. t., 0·3—0·6 (Drastic.) p. d. 1—2m. t. in Pulvern, Pillen *(1=28)*. — ° **Sapo jalapinus** (Resina J. u. Sapo med. aa. 4) 0·3—2·0 p. d. m. t. (Purgans) pur od. and. Mitt. (Cal., Aloë etc.) *(1=20)*. — ° **Pilulae Jalap.** Jalap. 1 : Sap. jalap. 3) —10 Stück als Abführmittel. — ***Pilul. laxant.** Aloë 40, Jalap. 60, Sapon. medicinal. 20, Anis. vulg. tinct. 10). 1 Pill. wiegt 0·20 *(1=40)*. — **Tinct. Resinae Jalap.** 10-30 Tpf. p. d. m. t. **Sem.** 0·2—0·3 p. d. stündl. in Pulv. bei Diabetes.

Albin (Ichthyo'albumin) int. 1·0—2·0 mehrm. **Bleich** *(1=26)*.

Kakaocolla siehe Gelatin. **Kal.**

Kalium 1·0 p. d. ad 4·0 (Kindern 0·5 p. die) **Kal.**, Kapseln; meist in Einreib. 1 : 2—5 in 1 : 10—50) Pins., Lösung., in Lösung; Inject. (0·1 : 10 Aq.) — **Ammon. sulfocyanicum** und **Lithium sulfoich**
figsten
Lösung
p. d. m.
d. Respi
organe u
apparat.;
Pasten u
Aehnlich
ichth., Zinc
Hydrarg. su
Jequirity Sem.
Imperatoriae
0·3—2·0 p. d.
Inf. (4·0—1
(100=35).
Indicum, Farbs
Ingluvin (Hühr
tract) wie **Pe**
Intestin (Bismu
talino-benzo
0·5—1·0 p. d.
septicum) *(1=*
Jodalbacid int. 1
Oblatten od. T
Jodäthyl, s. Aet
Jodipin (Jodfett)
löffel bis 1 Ess
10%*(10=75)*, 2
*† ° **Jodoformium**
p. d. ad 1·0
Pulv., Pill., I
Lösung.; ex
Streupulver
Wundbehand
suffation. (
Sacchar.) in
gen, alkoho
Glycerin, Col
15—30) zu
Einträufel.,
Umschl., Tan
Glycer.), als
Aether), Klys
weiss), Salb
Pflast., Suppo
1·0, Ol. Cac.),
Gaze, Jodofo
(1=10). Zun
d. Geruch.
bohn., Peru

Tannin, Ol. Foenicul. Dem Jodoform analog; **Jodoformin** *(1=20)*, **Jodoformal** *(1=45)*, **Jodoformogen** (Jodoformeiweiss) *(1=12)*.

Jodolum int. u. ext. wie Jodoform als Streupulv., in alkohol. od. äther. Lös. mit Collod. in Salben u. Pflast. *(1=32)*.

Jodophenin (Phenacetinum jodat.) int. 0·5 p. d. *(1=35)*.

Jodopyrinum, Jodantipyr., 0·5 b. 1·5 p. d. in Pulv. *(1=32)*.

Jodothyrin (Baumann) = Thyroidin, int. 0·3–0·5 p. dos. 1·0—2·0 bis 4·0! p. die (z. Schilddrüsm.) *(1=115)*.

*† **Jodum** 0·01—0·03! p. d. ad 0·10! p. die (Ph. G. 0·05! p. d. ad 0·2! p. die) in Lösung. (Aether, Alkohol, Glycer., wässerige Jodkaliumlösung), Pill., Pulv.; p. d. zu Inhalat. (0·001—0·01 2—3m. t.; auch mit Jodkalium) zerstäubt oder in Dampfform (auf Baumwolle); als Rauchm. (Cigaretten, Räucherkerzch.); Mund-, Gurgelwäss. (1:100—500 mit od. ohne Jodkali), Augenwasser (0·05:100), Umschlägen, Waschung. (2·0—5·0:100), Bädern (5·0 bis 15·0 p. balm. mit 10·0 bis 20·0 Kal. jodat.), Injection. (0·05—0·5:2·0—2·5 Kal. jodat.: 30—100 Aq.), Salben (0·5—1·0:10—20), Liniment., Pflast. (0·5 bis 2·0:50); in concentrirt. Lösung (wässerig., Glycerin-Collodium) als Aetzmittel *(1=10)* zu dem selben Zweck: **Sol. Jodi caustic.** (1 Jod: Kal. jodat. u. Aq. aa. 2) u. Glycerin. Jodi caustic. 2: Jod. Kal. jodat. aa. 1). — *† (1:16 Alkohol p. d. ad 1·0! G. 0·2! p. d. pinsel. der Schleimhäute Collod., Glyce (1—5:25 Aq.) (pur od. 2— wäss. (0·5— Aq.). Klyst. (Mund-Gurg halationen **Tinct. Jod.** Aeth.). — **formata.** — (1:8 Alk.).

Jodrubidium.

Jodum trichlo pepsie) (0·1:120 ext. zu 1000—15 bei Blen *(1=25)*.

*○ **Ipecacu** 0·05 (E Diapho etc.), bis 1·0 Pill., mixt. (0·1— Expe 5·0 Eme (0·5- *1=1* 0·2 Pil atu Op Ip

(10 St.=12). — °**Vinum ipec.** 10–°0 Tpf. als Expect.; ess-löffelw. als Emet. *(10=30).*

°°**Iridis** (Florentin.) Rad. 0·5–2·0 p. d. m. t. (Expec.) meist Constit., Corrig. etc. d. ganze, eigens zubereit. Rad. als Kaum. *(10=10).* — **i. versicoloris Rad.** 0·5 bis 4·0 p. d. m. t. (Cathartic., Diuretic.) — **Extract. fluid. i.** v. 5—15 Tpf. p. d. m. t. — **Iridinum** 0·05 bis 0·25 p. d. in Pill. *(1=100).*

Itrol (Argentum citricum), Antisepticum, ext. in wässerigen 0·1—0·2%ig. Lös.

p. d. 2—4m. t. in (Oblat., Capsul.), Lös

°**Kali causticum fusum** hydrooxyd. fus.

°**Kalium aceticum siccum** 4·0 p. d. in Lösung., zu Riechpulv. — **acetic. solut.** 25%ige des vorigen. (Liquor acet.) 2·0—12·0 p. d. m. ad 30·0 p. die pur od. Mixtur. (10·0—50·0 : 1 *(10=10).*

— °†**arsenic. solut.** (Liq Kal. arsenicos.) s. Ac arsenicos. *(0·1=2).*

2·0 : 10) *(10=15,* pulv. *10=18).*

*° **K. carbonicum crudum** (Pottasche) nur zu Bädern 5·0 bis 50·0 : 1000 für local. Bad. 100·0—500·0 p. baln. *(100=20).*

— *° **c. solut.** (Liq. Kal. carb.) extern zu Umschlägen, Waschung. (2·0—10·0 : 100), localen Bädern (2·0—25·0 zu 1000), Inject., Klyst. (5·0—15·0 : 1000), Linim. (1 : 2 Aq. : 3 Ol.), Salben (1 : 5—10) *(10=4).* — *° **K. c. purum** (depur.) 0·1—1·0 p. d. 2—4m. t. ad 5·0—12·0 p. die in Lösung., Saturat., Brausemischungen; zu Mundwäss. (1 : 5—50), Augenwäss. (0·05—2·0 zu 100), Inhalat. zerst. (1·0 b. 5·0 : 500) *(10=10).* — **Potio** (antiemetica) **Riveri** esslw.

— **chloratum** (Kaliumchlor.) 0·2—5·0 p. d. m. t. in Pulv., Lösung *(10=5).*

— *° **chloricum** 0·1—1·0! p. d. m. t. ad 8·0! p. die (Kindern 1·0—2·0! p. die) in Lös.; ext. als Streupulv., Mund-, Gurgelw. (2·0—5·0 : 100), Pinselung. (1 : 5—10 Glycer. od. Syr.), Verbänden, Umschlägen, Schnupfwäss., Inj. (5·0 b. 6·0 : 150 Aq.), Inhaltzerst. (0·2—1·0 : 100) *(10=5,* pulv. *10=6).*

— **chromicum neutrale** 0·1 o. 0·6 p. d. m. t. (Alterans) 0·1—0·25 p. d. (Emetic.) in Lösung.; zu Verbandw. (5·0—20·0 : 100 Aq.), Augenwäss. (1 : 10); Aetzm. *in conc. Lös., als* Streup. *(10=12).*

— **cyanatum** *0·01—0·03!* p. d. *m. t. in Lös.* (Vorsicht!); *zu Wasch- u. Verbandw. (0·05-0·2 : 25).* Salb. (0·1 bis

0·3 : 25) (Vorsicht!) *(0·1=2).*

K. ferro-cyanatum. 0·5—1·0 p. d. m. t. in Lös. *(10=6).*

°**K. dichromicum** s. K. chromic.

— **fluoratum** ebenso wie K. silicico-fluorat. 0·05—0·1 p. d. 1—2m. t. Lös. *(1=10).*

— *° **hydrooxyd. fusum** (Kali caustic. fusum, Lapis caustic. Chirurgor.) 0·01 b. 0·15 p. d. 2—3m. t. in alkohol. Lösung (Tinct. Kalina); ext. als Aetzm. in Subst.; zu Augentropfwäss. (0·05—0·1 : 25), Verbandwäss. (0·2—1·0 : 100), Waschung. (10·0—20·0 zu 500), Bädern (2·0—4·0 zu 1000 f. local. B.. 30·0 bis 100·0 p. baln.), Inject. (0·1 bis 0·5 : 100) *(10=20).* —

°**Liquor Kali caustici** $^1/_2$—4 Tpf. (0·02—0·2) ext. wie ob. nur in 2—3fach höherer Dos.; verd. Lös. zu Pinselung. u. Inhalat.

— *° **hydro-tartaricum** (Tartarus depuratus, Cremor Tartari) 0·5—2·5 p. d. m. t., als Laxans. 2·0—8·0 p. d. 1—2m. t. in Lös., Brausemisch., Bissen, Schüttelmixt.; ext. als Streu-, zu Zahn-, Augenpulv.; Bäd. (60·0—100·0 p. baln.) *(10=10).* — **Serum acidum lactis** (1 : 100 Ser. lact.) thee- bis esslöffelweise.

— *° **hypermanganicum** (permanganic.) 0·05—0·2! p. d. 2—3m. t. in Lösungen; ext. als Desinfectionsm. (1 : 100 Aq.), zu Verband-, Mund-, Gurgelwäss. (1% Lös. hievon 1—2 Theel. in 1 Glas Aq.), Inhalat. zerst. (0·5—1·0 : 100), Pins. (2—5 : 25), Inject. (0·1 b. 1·0 : 100), Wasch. (10=15).

— **hypochlorosum solut.** (Aq. Javelli) nur ext. zu W[illegible]

schung, Injection u. s. w. (3—10 : 100 Aq.) *(10=4).*

*°**K. jodatum** 0·1—0·5 p. d. ad 5·0—15·0 p. die in Lös., Pill., zu Inhalat. zerst. Mund-, Gurgelwäss. (0·5 bis 5·0 : 100), Augenwäss. (0·3—1·0 : 100), Umschläg. (1·0—2·0 : 100), Bädern (5·0 bis 10·0 : 1000 zu local. B., 50·0—120·0 p. balo.), Einreibungen (5·0—15·0 : 100 Spirit), Inject. (1·0—5·0 zu 100), Klystier. (1·0 bis 5·0 : 100–200), Salb. (1·0 bis 5·0 : 20—25), Suppositor. (0·1—0·3 p. d.); subcut. u. parenchymat. Inj. (0·5—2·5 : 500, hievon 1 b. 2 Spritz. 1—3m. t.) *(10=58.* pulv. *10=60).* — °**Ung. Kal. jod.** (Kal. jod. 20, Natr. thiosulf. 0·25, Aq. 15·0, Adip. suill. 165.)

— *°**natrio-tartaricum** (Tartarus natronatus, Sal Seignetti) 0·5—5·0 p. d. m. t.; als Laxans 15·0—50·0 in mehr. Portion., Pulv., Lösung., Latw., Mixt.; auch in Klyst. (15·0–30·0 p. d.) *(10=6,* Pulv. *10=8).*

— *°**nitricum (purum)** (Salpeter gereinigt) 0·2—1·0! p. d. ad 10·0! p. die in Lös., Pulv.; ext. wie Kal. chloricum; zu Fomentationen, zu Charta nitrata *(10 = 5).* — **Nitrum tabulatum** (Sal Prunellae), Plätzchen von c. 0·2 K. nitric. ¼—1 stdl. 1 Stück als durstlösch. Mitt. — **Pulv. temperans** (K. n. 1 : 3 K. hydro-tartar. zu 6 Sacch.) ½—1 Theel. p. d.

— *osmic.* 0·001 p. d. ad 0·015 p. *die in Pill.* (Bol.); subcut. *in 1% Lösung* (wie Acid. *hyperosmic.) (0·1=100).*

°**K. permanganicum** s. Kal. hypermanganicum.

— **picronitricum** 0·02–0·6 p. d. ad 1·0! p. die in Pill.

— **silicicum** (Wasserglas) 0·5 bis 1·0 p. d. 2m. t. in Lösung; ext. als Zahnschmerzmitt., bei versch. Insectenstichen; zu fixirenden Verb. *(100=30).*

— *°†**stibio-tartaricum** (Tartarus stibiatus, emeticus) 0·005—0·02 p. d. m. t. (Resolvent., Expector., Diaphoretic. etc.) 0·01 b. 0·03 p. d. 1—2stdl. (Nauseos. und je 10—15 Min. 2—4m. Emetic.) 0·05 bis 0·1 p. d. (Emeticum) 0·2! p. d. ad 0·5! p. die in Pulv., Lösung., Pastill., Trochisc., Schüttelmixt., zu Verbandwäss., Umschlägen (0·05—1·0 : 100), Waschwäss. (0·5—2·0 : 1000), Augenwäss. (0·1—1·0 : 100), Einreibung. (1 : 10 Aq.), Klystier. (0·1—0·3 : 50 bis 150 Aq.), Injection. (bei Blennorrh. 0·1—0·2 : 100; in die Venen 0·05—0·2 zu 50—100), zu Suppositor. (0·1—0·3 : 5—10 Ol. Cacao), Aetzpast., Salb. (Augensalben 0·03–0·1 : 10, adstring. 0·1—0·5 : 10, stark reizend und pustelbild. 0·5—2·0 : 10), Pflast. 1 : 4 bis 10 *(1=3).* — °**Unguent. Autenriethi** (U. Tartari stibiat. 1:4). — *°**Vinum stibiatum** (1 : 250 Malaga) 10 bis 40 Tpf. (0·5—1·5) p. d. m. t.; als Emetic. 15·0 bis 40·0 (kaffeelw.) (10 = 20).

— *°**sulfuratum** (Repar sulf. kal., Schwefelleber) 0·1 bis 0·4 p. d. 2—3m. t. Pill., Lös., Mixt., Waschung. (5·0—15

100), Liniment., Salben (1 : 5—10) *(10=20)*.

* **K. sulfurat.** p. balneo zu Wasch.ung. und Bädern (30°0—150°0 p. baln.) *(100 = 30)*.

— ° **sulfuricum** 0·5—2·5 p. d. m. t. ad 8·0—15·0 p. die (Laxans) in Lösung., Pulv., Pill. *(10=5)*.

— **sulfurosum** 5·0—10·0 p. die in Lös. (Antiseptic.) oder Pulver.

— ° **tartaricum neutrum** 0·5 bis 2·0 p. d. m. t. (Diur.) 15·0—30·0 p. d. in Pulv., Lösung., Mixt.; auch zu Klystieren *(10 = 20)*.

— **tartar.-boraxatum** (Tart. boraxat.), ebenso *(10=25)*.

*° **Kamala** (Glandulae Rottlerae) 8·0—15·0! p. d. in Pulv., Latw., Schüttelmixturen *(1 = 6)*.

Kawa-Kawa (Rad. Piperis methystici). Inf. u. Dct. 4·0—6·0 : 100—200 Col. p. die. — **Extr. fluid. K.-K.** 0·3—0·65! (5—40 Tpf.) p. d. ad 2·0! p. die in Pill., Mixt. *(10 = 25)*.

Kefir (Kapir) $^1/_3$—$1^1/_2$ Liter je ein Glas vor od. nach den Mahlzeiten.

°**Keratinum** aus Hornsubst. dargestellt zu Keratin-Dünndarmpil.(ammoniak. od. essigs. K.-Lös.) f. alle Medicam., die im Magen unwirks. werden *(1=40)*.

Kino wie Catechu *(1=10)*. — **Tinct. K.**, ebenso *(10=30)*.

Kola Nuces (Sterculia arcumin. P. Beauv., coffeinh.). *Inf. (50·0—100·0 zu 100-300 Col.).* — ***Extr. K. (Kolanin)*** *0·1—0·2 p. d. (1=32).*

*° ***Koso (Kuso) flor.*** *15·0—20·0 in 2 Portion. (1/2stündl.) in Schüttelmixtur (10=10, Pulv. 10=14).* — **Kossinum crystallisatum** 0·5—1·0 p. 2—3m. t. in $^1/_2$—1 Stu. in Pulv., Pill. *(1=4)*.

Kreolinum, essl. (3% Lös. mit oder ohne N. car. Pill. od. Kaps. (0·01—0 p. d. 3—4m. t.); zu V. schung., Pinsel., Fome. Inj., Verbandwäss. ($^1/_{10}$—1% Lös.). soll Carbolsäure u. d. Que. silber als Antiseptic. vorzuziehen sein *(10=*

Kreosolid (Magnesium. bindung mit Kreoso. standth.), int. 0·5 mm.

*° † **Kreosotum** (0·01 bis p. d. ad 0·5! p. die) Pill., Lös., Gallertka. Mixt.; ext. wie Ac. bolic.; zu Klyst. 0·12 0·25 p. d. 2m. t. *(1=3)*. **K. carbon.** (Kreosotal) Pill., Lös. *(10=60)*. — **tannicum** = Tannosal. — **valerian.** p. d., 4·0—6·0 in Trpf., (Eosot) 0·2 p. d. 0·6—1·8 p. die in Gelat. kaps. *(1 = 18)*. — **Kreosot. — Pillulae Kreosoti.** mit je 0·05 Kreo.

Kresalol (salicylsaures Mkresol) int. 0·25—0·5 p. 2·0—4·0 p. die ext. Jodoformersatz *(1=2*

Kresamin (Trikresol Aethylendiamin). 1 : 40 bis 400 in Salben. In Tiefe wirkendes Antis. *(1=34)*.

Kresochin (Chinolin-Kres. In $^1/_2$—1%igen Lösun. zur Desinfection *(10=*

Kresol (Metakres.) int. 0·06 0·2 p. d. Ext. in $^1/_2$% wi. Lös. (Antisept.) (1 = — **Liq. Kresoli saponat.** Ext. in 1—5%iger Lö.

Kresolid (Kreosotn. siumverbindung). verform m. m. tä.

Kristaline. Ersatz für Collodium (Schiessbaumwolle in Xylol).

Kryofin (Methylglycolsäurephenetidid) int. 0·5 p. dos. (Antipyreticum) *(1=8).*

Kumyss, Getränk, urspr. a. der Milch d. kirghisisch. Stuten bereitet; gegenw. aus versch. Milchsorten.

Lac vaccinum (Kuhmilch), Nahrungsm.; zu Milchcuren, Antidot; z. Mund- u. Gurgelwäss., Augenwäss., Foment., Bädern, Klyst. u. s. w. — * **Serum lactis** (Molken) $^1/_4$—1 Lit. p. die. zu Molkencuren. S. l. **tamarindinatum.**

Lactopheninum, int. 0·5—1·0 p. d. bis 6·0 p. die in Amylumkapseln als Antipyreticum u. Antirheum. *(10=180).*

Lactose int. 100·0 p. die in Wasser *(1=30).*

Lactucae viros. Hb. *(10=18).* **als Extr.,** Lact. 0·03—0·6! p. d. ad 2·5! p. die in Pill., Lös., Mixtur. *(1=8).* — *°†**Lactucarium** 0·03—0·3! p. d. ad 1·0! p. die (als Hypnotic. 0·5 p. d. ad 2·0! p. die) in Pulv., Pill., Emuls., Linct.; zu Collyr. (0·1—0·3 : 25) *(1=20).*

Laevulose int. 25·0—100·0 p. die (Diätetic. b. Diabetes) *(1=5).*

Laminaria (digitata) statt d. Pressschw. z. Erweiter. d. Cervicalcanals *(1 St.=40).*

Lamii flores. Innerlich als Hämostaticum. Zu Thee oder Tinct. (1 : 3). Tropfenweise in Zuckerwasser.

***Lanolinum** (23—25% Wasser), *Salbengrundlage* und zu *cosmet.* Zwecken in den *mannigfaltigst.* Formen *(10=15).* — **Wasserfreies L.** (L. anhydricum) durchscheinende gelbl. Masse *(10=20, 100=150).* — **Agnine,** wahrsch. Destillationspr. d. L., sehr reich an fr. Fettsäuren (33%).

Lapides Cancrorum (Krebssteine) s. Calc. carbonic.

Lapis Pumicis (Bimsstein) z. Zahn- und Waschmitteln *(10=5).*

Largin ext. in $^1/_4$—$1^1/_2$% Lös. (Antigonorrh.) *(1=75).*

Lathyrismus Ol. 0·1—1·0 p. d. pur oder in Emulsionen, Elaeosacchar. (Drastic.).

Lauri Fol. wie Fol. Aurant. — *°**Fruct. Lauri** (Baccae L.) 0·2—1·5 p. d. in Plv., Inf. (5·0—20·0 : 100 Col.) *(100=30).* — *°**Ol. Lauri** zu Salb., Linim. *(10=5).*

*°**Lavandulae** Flor. zu verschied. Spec., Räuchersp., Bädern etc. *(10=14).* — *°**Ol. Lavand.** Corrig. zu Salb., Liniment. etc. *(1=6).* — *°**Spir. Lavand. simpl.** *(10=10)* u. **compos.** Corrig., Riechmittel, zu Einreibungen, Waschungen, Bädern etc.

Ledi palustris Hb. Inf. (5·0 b. 25·0 : 100—200 Col.) *(10=4).*

Lenigallol (Pyrogalloltriacetat) ext. in Salb. u. Paste *(1=12).*

Lenirobin (Chrysarobintetraacetat). Anwendnng wie Chrysarobin *(1=16).*

°**Levistici Radix** 10·0—15·0 p. die als Species od. Infus. Diureticum *(10=6).*

Liantrol, pur oder in 5- bis 20% Salben bei Hautkrankheiten (10=60).

*°**Lichen islandicus** 15·0—30·0 p. die in Spec. Dct. (1 zu 10—15—20) Inf. (1 : 10—15 Gallert. (1 : 3—6) (100 20). — **L. pulmonarius** e 80. — **Gelatina Lic**

isl. *(10=12)* und **Gelat. L. i. pulverata.**

Lignosulfit. Zur Inhalation *(1 Fl.=200).*

Lignum Campechianum Dct. 5·0—15·0 : 100 Col. — **Extr. L.** 0·5—1·0 p. d. m. t. in Pulv., Pill. *(1=4).*

* **Lini Semen Dct.** (5·0—30·0 zu 100—300 Col.); ext. Dct. zu Gurgelwässern, Klystier, Injection., Kataplasm. *(100=14).* — *°**Lini semin. placentae** *(100=10).* —**Farina L. semin.** — *°**Ol. Lini** zu Klyst., Einreib., Liniment., Salben *(100=20).* — **Ol. Lin. sulfuratum.** Verbandm., Einreib.

* **Linimentum ammoniat.** *(10=6)* u. °**L. ammoniato camphorat. s. Ammonia.**

— *° **saponato-camphoratum,** ext. zu Einreib. *(100=60).*

Lipaninum wie **Ol. jecor. Aselli.** *(10=20).*

Lippiae Mexicanae Hb. als **Extr. fluid.** L. M. 2·0—3·5 p. d. m. t. pur od. in Mixt., Lösung. (Expect.) *(1=8).* — **Lippiolum** 0·005 bis 0·01 p. d. m. t. in Pillen.

*° **Liquiritiae Rad.** (Hispanica u. Rossica; erster. ungeschält, letztere mundirt), Kaumitt.; i. Pv. a. Consp., Corrig., in Ipec. (Dosis bel.); Inf. (5·0—20·0 : 100 Col.) *(10 = 10).* — ***Ext. Liquirit.** als Corrig., Const. und Expect. (Dos. beliebig.) *(10=32).* **Succus Liquirit.** (Lakriz) zur Darst. des *° **Succ. Liquirit. depurat.** *(10=14)* u. °**Elixir e Succo Liquirit.** – ***Gelatina Liquirit. pellucida** *(10=12).* — ***Pasta Liquirit. flava** *(10 = 12).* — *°**Pulv. Liquirit. compositus.** (Fr. Eosanioli, Sulf.

depurat. aa. 1, Rad. Liq., Fol. Sennae aa. 2, Sacchar. 6) *(10=12).* — °**Syrup. Liquiritiae.** — **Tabulae Liq.**

* **Liquor acidus Halleri** (Mixtura sulfurica acida Ph. G., Acid. sulfuric. conc. 1 : Spirit. Vini 3) 3—20 Tpf. (0·3—1·0) p. d. m. t. pur. in Mixt. (1·0–5·0 : 100), Getränk. (5·0–10·0 : 1 Lit.), zu Wasch. (0·5—1·0 zu 100), Pinselg. (1 : 10), Einreib. *(10=10).*

— °**corrosivus** (Cupr. sulfuric., Zinc. sulfuric. aa. 6, Acet. 70, Liq. Plumb. subacet. 12) zu Aetzm.

°**Lithargyrum** s. Plumb. oxydat. fusum.

Lithiopiperazin. 1–3 Grm. tägl. in Mineralwässern bei harns. Diathese *(0·1=13).*

Lithium bromatum 0·2–5·0 p. d. m. t. in Lös. *(1=12).*

— **benzoicum** 0·05—0·2 p. d. m. t.; in Pulv., Pill., Lösung, Inhalation. (0·5 bis 2·0 : 100) *(1=12).*

— *°**carbonicum** 0·03—0·3 p. d. ad 2·0! p. die in Pulv., Pill., Pastill., in Lösung als Aq. Lith. carb. (0·15 zu 100 Aq.) u. Mineralwäss. (mit od. ohne Kal. od. Natr. bicarb.), Saturat.; ext. zu Gurgelw., Inh., Inj., Wasch., Bähung. (1—3% Lösung) *(1=15).*

— **citricum** ebenso *(1=8).*

— **hippuricum** 0·05 0·1 p. d. m. t. ad 10·0 p. die, in Pulv., Pill., Lös. *(1=50).*

— **salicylicum** 0·1—0·5 p. d. ad 5·0 p. die in Plv., Lös. *(1=6).*

— **sulfoichthyolicum** s. Ichthyolum.

*° **Lobeliae inflatae Hb.** in Dct. od. Inf. (2·0—6·0 zu 100—150 Col.); als Rauch

selöl) *(100=50).* — **Sp. Frumenti** (Kornspir., Whisky) *(100=40).* — **Sp. Oryzae** (Arrac), **Sp. Sacchari** (Rum) *(10=14),* enthält ebenfalls Weinfuselöl, daher angenehm riechend. — **Sp. Solani tuberos.** (Kartoffelspiritus, enth. Kartoffelfuselöl). Zur int. Verw. kommen mit Ausnahme des Kartoffelspiritus alle anderen ½—1 Theel. bis 1 Essl. p. d. m. t. pur, mit Zucker oder Aqua verd.; ext. zu Mund- u. Gurgelw. (1 : 5-10), Augenw. (0·5-2·0 zu 10), Pinsel., Wasch., Umschl., Einr., Bädern; Inj. (1 : 3—5 und darüber Aq.); zur Wundbehandl., parenchymat. Inj. (½—1 Spritze), Constit. u. Excip. für die versch. pharmac. Zubereit. und Medicam.

Spongia compress. (Pressschw. *(1=24).* — **Sp. carbolisata.** — **Sp. cerata** (Waschschwamm). — **Sp. marina** (Badeschwamm). — **Sp. tosta** (Carbo Sp.) *(10=12).*

Stannum chloratum 0·005—0·03 p. d. 2—4m. t. in Pill., Lös.; zu Verb. u. Umschl. (0·1—0·2 : 100) *(10=10).*

Staphysagriae Sem. nur ext. in Streupiv., Salb., in Dct. (10·0—15·0 : 100) als Antiparas. (Vorsicht!) *(10=8).* — **Delphinium** wie Veratrin.

Steresol (antisept. Wundm.), zum Bepinseln *(1=30).*

Steriform (Gemenge von Milchzucker mit 5% Formaldehyd), int. Antisepticum b. Infectionskrankh.

Sterisol, int. 0·015—0·08 p. d. (Antisept.).

Stibium chloratum (Liqu. Stib. chlorat.; *Butyr. Antimonii*) *Aetzm. (10=36).*

****St. sulfuratum aurant.** 0·015 bis 0·2 p. d. 2—3m. t. in Pulv., Pill., Trochisc. (à 0·03), Linct. *(1=10).* — ****St. sulfur. nigrum** (laevigatum) 0·2-1·0 p. d. 2-3m. t. in Pill., Pulv., Trochisc. (à 0·18) *(10=6).*

— **sulfur. rubrum** wie Stib. sulfur. aurant. *(10=35).*

*†°**Stramonii Fol.** wie Fol. Belladonna *(10=4).* — **Extr. Str.** 0·01—0·1! p. d. ad 0·4! p. d.; ext. zu Augenwäss. (0·5—2·0 : 100), Inh., Inj. (0·5—1·5 : 100). Salben (1·0 bis 1·5 : 25), Pflast. *(1=14).* — **Sem. Str.** 0·01—0·1 p. d. 2—3m. t. — **Tct. Str.** 5 bis 10 Tpf. — 0·5! p. d. ad 2·0! p. die *(10=50).*

Strontium bromatum, int. 1·0 vor oder sofort nach dem Essen bei nervös. Erbr. *(10=40).* — **St. lacticum,** int. 0·3—0·6 p. d., 3·0 p. die *(10 - 50).* — **St. salicylic.,** int. 0·3-0·9 m. tgl.

***Strophanti hispidi u. Kombé Sem.** zu *°†**Tinct. Stroph.** (1:20), 5-15 Tpf. p. d. 2- bis 4m. t. ad 40! Tpf. p. die in Mixtur, Tabl *(1=3).*

Strophantinum 0·0001—0·0005 p. d. 1-2m. t. ad 0·001-0·002 p. die in alk.-wäss. Lös. o. Pillen *(0·01=5).*

*†°**Strychnos Nux vomica** (Semen Strychni) 0·03 bis 0·12! p. d. ad 0·5! p. die (P. G. 0·1! p. d. ad 0·2! p. d.) in Pulv. *(1=2).* — *†°**Ext. N. v. spirit.** (Ext. Strychni) 0·01 bis 0·05! p. d. ad 0·15! p. die in Pulv., Pill., Mixt. *(1=28).* — **Extr. N. v. aquos.** in 2—4mal gröss. Dosen (0·2! p. d. ad 0·6! p. die). — *†°**Tct. N. v.** (T. Strychni) 0·1—1·0 ad 3·0! p. die (2-h.

M. salicylicum 3·0—6·0 p. die bei Typhus; 6·0—8·0 als Laxans in Pulvern, Lös. *(1=8)*.

— *° **sulfuricum** (Sal Seidlitzenses, Saidschitzense) 1·0—3·0 p. d. m. t., als Laxans 10·0—50·0! in Plv., Lös., bes. kohlensäureh. Wässern; zu Klystieren (15·0—30·0 p. clysm.) *(100=20)*. — *° **M. sulfur. siccum** in circ. $^2/_3$ kleineren Gab. *(10=6)*.

— **sulfurosum** 0·5—2·0 p. d. m. t. in Pulvern v. (ad 20·0 p. die).

— **tartaricum** 0·5—1·0 p. d. 2—4m. t. in Pulv.

Malakin, Salicyl-Paraphenetidin (Antipyret.), int. 0·5 bis 1·5 p. d., 4·0—6·0 p. die in Oblaten *(1=32)*.

Malarin (Acetophenonphenetidinum citricum) int. 0·4 p. d. (Antipyret.) *(1=70)*.

***Maltum Hordei** in Pulv. 0·5 bis 1·0, Inf., Dct. (10·0 bis 20·0 : 100 Col.); zu Gurgelwässern, Klyst., Bädern (1-2 Kl. p. baln.) *(100=24)*. — **Ext. Malti,** thee- bis esslöffelw. pur od. mit Milch, Wein etc.; ein Excipiens für verschied. Medicam. *(10=4)*. (Extr. M. ferratum, jodatum etc.). — **Syrupus M.** — **Elixir M.**

Malvae *° **Fol.** *(100=30)* und *° **Flor.** *(10=6)* zu Species Dct. (5·0—15·0 z. 100 Col.).

Manganum chloratum 1·1—0·75 p. d. in Lös.; zu Mund- und Gurgelwäss. (1·0—4·0 zu 100) *(10=10)*.

— ***hyperoxydatum nativum*** *(Braunstein) 0·1—1·0 p. d. in Plv., Pill.; zu Salb. (1—3 : 10).*

— ***sulfuricum*** *0·1—0·6 p. d. 2—4m. t.; als Laxans* 2·0—4·0 (8·0!) in 2—4 Dos. innerhalb einiger Stun. in Pulv., Pill., Lös.; in Salben (1 : 5 - 10) *(10=10)*.

*° **Manna** 4·0—10·0 p. d. m. t., als Laxans 50·0 - 100·0 (Kindern 30·0—50·0) in mehreren Dosen als M. tabulata in Latw., Lö. *(10=14)*. — **Mannitum** 30·0 b. 50·0 als Lax. *(10=35)*. — *° **Syrup. sennae c. manna** *(10=5,* (Mannae), theelw., Corr.

* **Mastix** (Resina) als Kaumittel, Zahnkitt, Räuch., spec. Pflastern *(10=24)*

Matico Fol. 0·5—2·0 p. d. in Pulv., Latw., Pill., Inf. (10·0—30·0 : 100 Col.); in Inf. zu Inject *(10=10)*. — **Oleum M.** $^1/_2$—1 Tpf. p. d. m. t. *(1=50)*. — **Tct. M.** 20—40 Tpf. p. d. 2—4m. t. *(10=14)*.

Maydis Stigm. Dct. (5·0—15·0 zu 100 Col.) als Diuret. — **Extr. fluid. M. St.** 0·5 b. 1·0 p. d. 2—4m. tägl. *(10=50)*. — **Ustilaginis M. Extr. fluid.** (statt Secal. cornut.) 10—20 Tpf. p. d. ad 4·0 p. die.

Medulladen (Knochenmarkextract) 2·0—3·0 p. d., 5·0 bis 15·0 p. die *(1=40)*.

Mel crudum u. *° **depuratum.** Laxans 50·0—100·0 p. d. pur oder in Lös., Latw., Pill.; kleinere Dosen als Expector., Demulc.; zu Mund- u. Gurgelwässern, Pinselsäften, Cataplasm., Klyst. ($^1/_2$—1 Esslöffel p. clysm.) *(100=44)*. — *° **Mel rosatum** ebenso *(10=8)*.

*° **Melilоti Hb.** zu Spec. und Pflast. *(100=18,* Pulv. 10=5). — ***Empl. de Melilоto** (Melilоti) (10=8).

*° **Melissae Fol.** Inf. (5·0 bis 15·0 : 100), Spec.; zu Foment., Bädern (10=5).

— *° **Spir. M. compos**

Plasmon (Siebold's Milcheiweiss), neues, aus Buttermilch gewonnenes, pulverförmiges Eiweisspräparat.

b) Die Peptonpräparate, meist aus Fleisch gewonnene Eiweisspräparate, welche zum grössten Theil nicht eigentlich reines Pepton, sondern Albumosen (Vorstufen des Peptons in der Eiweissverdauung) enthalten. Zu nennen sind:

Antweiler's Albumosen-Pepton: esslöffelweise als Zusatz zu N-armen Nahrungsmitteln.

Nährstoff Heyden; als Zusatz zur gewöhnlichen Kost.

Kemmerich's Pepton; mit heissem Wasser als Brühe verrührt, angenehm schmeckend.

Somatose, geruch- und geschmacklos, in Wasser lösliches Pulver, in kleinen Dosen appetitanregend, bei Kindern bis 15 Gramm, bei Erwachsenen bis 30 Gramm täglich in Einzeldosen von 3—5 Gramm; man löst erst in heissem Wasser und gibt die Lösung als Zusatz zu Milch, Kaffee, Cacao, Bouillon, Schleimsuppen. Auch als Eisensomatose in Verbindung mit Fe-Präparaten erhältlich.

Sanose; weisses, geruch- und geschmackloses Pulver, am besten als Zusatz zu Milch, Cacao und Leguminosensuppen gegeben (5 Gramm auf eine Tasse, resp. Teller).

Sanatogen; weisses Pulver, fast ohne Geschmack und Geruch, in Wasser löslich, am besten als Zusatz zu Milch, Cacao, Bouillon. Es wird von einer Reihe neuerer Autoren als eines der wirksamsten Kräftigungsmittel für Reconvalescenten, nervöse Individuen und Geisteskranke mit Depressionszuständen, neuestens auch von verlässlicher Seite als wirksam bei Rachitis empfohlen.

Tropon; billiges, pulverförmiges Eiweisspräparat, mit Milch und Bouillon aufzukochen, ferner als Zusatz zu Backwaaren mehrfach benutzt (Troponcakes, Troponzwieback etc.).

B. Aus Vegetabilien hergestellte Präparate.

a) **Mehlpräparate:**

Hartenstein's Leguminosenmehle; in verschiedenen Zusammensetzungen in den Handel gebracht.

Knorr's Mehle (Hafermehl, Reismehl, Gerstenmehl, Hafergrütze, Tapioca, Bohnenmehl, Erbsenmehl, Linsenmehl).

Kindermehle; Mehlpräparate, deren Kohlehydrate in grossem Procentsatze aufgeschlossen sind. Meist unter Zusatz von Milch bereitet:

Kufeke's Kindermehl.

Löflund's Zwiebackmehl.

Nestle's Kindermehl.

Theinhardt's lösliche Kindernahrung, aus Kuh- ren Eiweissstoffe durch ein Pflanzenferment leicht ver- emacht sind, und aus Weizenmehl, dessen Stärke- rch Diastaseferment zum Quellen gebracht sind. In- nthält Wasser 5·0, Eiweiss 18·5, Fett 3·4, Kohlen- 3, davon löslich 57·1.

*°† **M. hydrochloricum** 0·005 b. 0·03! p. d. ad 0·12! p. die (Ph. G. 0·10! p. die) in Pulv., Pill., Past., Lös.; ext. zu Pinsel. (0·5—1·0 zu 20—100), Trpf., Klyst. (0·01—0·03 p. d.), Inhal. zerst. (0·02 – 0·10 : 100), Schnupfpulv., Insufflat. 0·5—1·0 : 2—10 Sacchar., Gum. arab. etc., Supp. (0·005—0·02), Salben (1—5 z. 50), Linimenten (5—10 zu 50—100), subcut. und parenchymat. Inject. (2% Lös.) 0·005—0·02! (0·05!), Antidot. bei Chloroform 0·008—0·012; in Combin. mit Chlorof. zu allgem. Anästhes. *(0·1=8).*

— **M. oleïnicum** Lös. v. M. hydrochloric. in Acid. oleïnic. (0·05 - 0·1 : 3) zu Einreibungen.

— **phtalicum** zu subc. Inj. (1 : 5—10 Aq.) *(0·1=28).*

— **saccharinicum** (in 100 Th. 60·4% Morphin).

— **sulfuricum** wie M. hydrochloric. *(0·1=8).*

Morrhuolum (wirks. Bestandtheil von Ol. jecor. As.) 0·2 p. d. in Kapseln, 4—6 Kaps. p. d. für Erwachs., für Kinder 2—4 *(1=15).*

°**Moschus** 0·01—0·6 p. d. m. t. in Pulv., Pill., Elect., Schüttelmixt., Emuls.; Zahnpulv. (0·01—0·05 : 25), Klyst. (0·5—1·5 p. clysm.); enderm. Inj (0·3—0·6) *(0·10 = 1·30).* — °**Tct. M.** *(1=50).*

Mucar Rad. (Alterans) 0·20 bis 0·60 p. d. m. t., als Emetic. 2·0—4·0 in Pulv.

Mulrae Puamae. Extr. fluid. *3—4mal 15—20 guttas.* Als *Excitans, Aphrodisiacum, Tonicum.*

ecarinum *0·0005—0·002 p. ad 0·005 p. die* in Pill. oder subc. Inj. (1% L *(0·01=48).*

Musenae Cort. 30·0—60·0 p. m. t. in Pulvern (ge Taenien), Latw., Ho Schüttelmixt.

Mydrin (Combination Ephedrin u. Homatro Mydriaticum in 10% w seriger Lös. zur Aug spiegelunters. *(0·01=*

Mydrol (Phenylpyrazolj methylat), Mydriatic in 5 - 10% wässerig. I

*°**Myristicae Semen** s. N moschata.

Myronin, Salbengrundlag

*°**Myrrha** (Gummi resina) bis 1·5 p. d., 2—4 m in Pulv., Pill., Emu Latwerg, Schüttelmix zu Zahnmitteln, Mu und Gurgelwäss., Sa Liniment., Pflast. *(1 14).* — **Extr. M.** ebe *(1=6).* — *°**Tct. M.** bis 40 Tpf. p. d. m. Mund-, Gurgelwäss. (10 : 100), Pinsel. (1—3 Mel), Zahnmitt., Inj (1—10 : 100), Verbänd. bis 20 : 100), Salben (1 bis 10), Liniment *(10=1* — **Myrrholin** int. 0·3 p. in Gelatinekapseln.

Myrti Chekan Fol. Inf. (1 bis 15·0 : 100 Col.); zu halat. u. Inject. — **E fluid. M.** 2·0 – 12·0 p. d. m — **Myrtolum** 0·15 p. d. Kaps. 4—10 St. t. *(1=2*

Myrtilli Extr. ext. zum E pinseln *(10=50).*

Naftalan, Anwendung äh wie die d. Theerpräpar in Salbenform *(10=3*

Napellinum (Sedativ.) 0·01 0·07 p. d. m. t. in P Lösung; subcut. Ir (1/10% Lös.) 0·01—0·02 *(0·01=20).*

	Ph. austr.		
	p.dosi	p.die	p
Lactucarium	0·3	1·0	
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12	0
Oleum croton	0·05	0·1	0
Oleum phosphoratum	1·0	5·0	
Opium	0·15	0·5	0
Paraldehydum	—	—	5
Phenacetinum	1·0	3·0	1
Phosphorus	0·001	0·005	0
Physostigminum salicylicum	0·001	0·003	0
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06	0
Plumbum aceticum	0·1	0·5	0
Radix aconiti	0·1	0·5	0
„ belladonnae	0·07	0·3	
Resina Podophylli (Podophyll.)	0·05	0·2	
Resorcin	0·5	3·0	
Santoninum	0·1	0·3	0
Scopolaminum hydrobromic.	—	—	0
Secale cornutum	1·0	5·0	
Semen strychni	0·12	0·5	0
Solutio arsenicalis Fowleri (Ph. austr.)	0·5	2·0	0
Stibium kalio-tartaricum (Ph. austr.) — Tartarus stibiatus (Ph. germ.)	0·2	0·5	0
Strychninum nitricum	0·007	0·02	0
Sulfonal	2·0	—	2
Thallinum sulfuricum	—	—	0
Theobrominum natr. salicyl.	1·0	6·0	1
Tinctura aconiti radicis	0·50	1·5	0
„ belladonnae folior.	1·0	4·0	
„ cantharidum	0·5	1·0	0
„ colchici	1·5	5·0	2
„ colocynthidis	—	—	1
„ digitalis	1·5	5·0	1
„ jodi	0·3	1·0	0
„ lobeliae	1·0	5·0	1
„ opii crocata	1·5	5·0	1
„ simplex	1·5	5·0	1
trophanti	0·5	2·0	0
rychni	1·0	3·0	1
	2·0	—	
ti	—	—	0
	0·005	0·02	0
i	1·50	5·0	
na emeticum	0·80	—	

Anleitung zur Untersuchung von M

b) **Congopapier** färbt sich — in den Magensaft gebrach
ren, nicht für HCl allein beweisend; auch durch an
c) **Tropaeolin** färbt sich mit freien Säuren rubinroth
d) **Methylviolett** färbt sich (in stark verdünnter Lösu
blau.

3. Milchsäure.

Uffelmann'sche Probe. Man bereitet sich ein Rea
aus 10 Cubikcentimeter 5%igem Acid. carbol., 25 Cu
centimeter Aq. destillat. und 2 Tropfen einer 5%igen Ei
chloridlösung. Diese blaue Mischung wird durch Milch s
momentan zeisiggelb gefärbt.

4. Pepsin.

Zum salzsäuren Mageninhalte bringt man ein Flöckch
Fibrin und lässt im Brutschranke oder im Wasserbade
40° C. 1/2 Stunde stehen. Bei Anwesenheit von Pepsin wird
Fibrin gelöst.

III. Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum.

Ein kleines Partikelchen aus eitrigen (käsigen) Antheil
Sputums wird zwischen zwei Deckgläschen fein vertheilt, die
gläschen werden an der Luft trocknen gelassen und dann
Sputumseite nach oben — 8mal rasch durch eine Flamme
Nach der Abkühlung tropft man auf das Deckg
3—4 Tropfen von:

Fuchsin. 1·0,
Spirit. vin. 10·0,
Acid. carbol. 5·0,
Aq. destill. 100·0,

lässt 10 Minuten liegen, spült energisch im Wasse
trocknet zwischen Filtrirpapier. Nunmehr tropft ma
Sputumseite:

Methylenblau 2·0,
Acid. sulfur. 25·0,
Aq. destillat. 100·0,

lässt die Farblösung nach 5 Minuten ablaufen, sp
glas leicht mit Wasser ab und trocknet aberm
Filtrirpapier. Die blaue Lösung muss nochma
werden, falls noch Rothes sichtbar ist; die Färbun
wenn die ganze Sputumschichte schwachblau
trockene Deckgläschen wird in Nelkenöl, Canada
gebettet und mikroskopisch untersucht (Zeiss F
oder Oelimmersion mit Condensor bei offener Ble
sind roth, Zellen und andere Bakteri

20. Die Bade- und Curorte nach ihrer Charakteristik.

Alkalisch-muriatische Quellen:

Ems, Gleichenberg, Luhatschowitz, Neuenahr, Offe
Tönnisstein, Weilbach.

Alkalisch-sulphatische Quellen:

Bertrich, Karlsbad in Böhmen, Marienbad in Bö
Rohitsch-Sauerbrunn, Tarasp-Schuls-Vulpera.

Bitterwässer:

Ober-Alap, Franz Josef Bitterwasser, Friedrichshall, H
János, Kissingen, Mergentheim, Ofen, Pillnau, Saidschütz,
tica, Sedlitz.

Einfache alkalische Quellen u. Lithion-Wä

Bilin, Cudowa, Fachingen, Fellach, Franzensbad, G
Giesshübl, Krondorf, Kronenquelle Salzbrunn, Ober-Sal
Preblau, Römerquelle, Salvator, Teinach, Vichy.

Eisenwässer:

Alexanderbad, Alexisbad, Antogast, Augustusbad, Bo
Bocklet, Brückenau, Cudowa, Doberan, Driburg, Fla
Franzensbad, Freienwalde, Freiersbach, Godesberg, Gri
Alt-Heide, Homburg, Imnau, König Otto-Bad bei W
Königswart, Langenau, Levico, Liebenstein, Liebwerda,
stein, St. Moritz, Muskau, Pejoquelle, Peterathal, Polzin, Pyr
Pyrmont, Reinerz, Rippoldsau, Roncegno, Sangerberg, Sch
Schwalbach, Schwarzwald, Spaa, Steben, Sylt, Szlacs, T

Erdige Wässer:

Contréxeville, Inselbad, Leuk, Lippspringe, Neuenah
ladis (Tirol), Rappoltsweiler, Vittel, Weissenburg, Wild

Glaubersalzwässer:

Balaton-Füred, Bertrich, Elster, Franzensbad, Ka
Marienbad, Rohitsch-Sauerbrunn, Tarasp.

Einfache Kochsalzwässer:

Aibling, Arnstadt, Aussee, Baden-Baden, Berlin, Bour
les-Bains, Cannstatt, Colberg, Dürrheim, Frankenh
Greifswald, Schwäb.-Hall, Hall (Tirol), Hamm in We
Harzburg, Herzog Ludolfbad, Homburg, Hubertusbad,
Jaxtfeld, Kissingen, Königsborn, Kösen, Kronthal, Na
Neuhaus, Niederbronn, Oeynhausen, Orb, Neu-Rakoczy, R
hall, Rheinfelden, Rosenheim, Rothenfelde, Salzhausen, Sa
Salzuffeln, Schmalkalden, Soden, Sooden, Suderode, Sul
Traunstein, Werne, Wiesbaden, Wittekind.

(10=26). — *° **Ol. N. m. express.** zu Salb., Liniment., Pflast. etc. *(1=3).* — ° **Balsamum Nucistae** ebenso.

Oleum animale aethereum (O. a. Dippelii) 5–20 Tpf. allm. steigend in Pillen, Kaps. *(1=5).* — **Ol. anim. foet.** ext. zu Klyst., Lin., Salb.

— * **Bergamottae** 1–4 Tpf. p. d. m. t.; Corrig. *(1=6).*

— * **cadinum** s. O. Juniperi empyreumatic.

— ° **Cajeputi** zur Ber. d. Ol. Cajep. rectificat. 1–3 Tpf. p. d. m. t. in Pulv., Pill., Lös.; als Zahnm., Augenmittel, Riechm., Einr. (m. Alkoh. od. fett. Oel), Salb. (1 : 5 bis 20) *(1=4).*

— *°† **Crotonis** 0·008—0·05! ($^1/_2$—2! Tpf.) p. d. ad 0·1! p. die in Pulv., Pillen, Kapseln, ölig. Lösung., Emuls.; Einr. (5—20 Tpf.), Klyst. (0·05—0·1 : 100—500 Emuls.) *(1=8).* — **Sapo crot.**

— *°**Jecoris Aselli** 1–8 Esslf. (1—4 Theelf. Kindern) p. d. 2–3m. t. pur, Kaps., Emuls., Gelée (solidific. Leberthr.); mit Eidotter u. 10 Tpf. Pfefferminzöl, mit 5% Gum. arab.-Lös.; ext. zu Einr., Injection, Augenm., Excip. f. versch. Mittel, z. B. Ol. Jec. A. ferratum ($^2/_{10}$% Fe), Ol. Jec. A. jodoferrat., Ol. Jec. A. jodat. etc. *(100=24).*

— * **Juniperi empyreumatic.** (Ol. cadinum) 3–6 Tpf. p. d. m. t. in Kaps., Pill., äther. Lös.; zu Einreib., Salb. (1 : 2–5), Kaliseifen *(10=22).*

— *Olivarum (*°Provinciale u. *°commune), ei steres int. esslw. m. t. pur., Linim., Emulsion.; leide zu Einreibungen, Injectionen, Linim., Salben, Pflast., Klystier (10=8).*

O. Petrae Italicum wie Petrol. *(10=8).*

— **Pini Pumilionis** (Latschenöl) ext. zu Einr., Inhal., Zerstäub. (z. Desinfect.) *(10=40)*

— ° **Rapae** (Rüböl) wie Ol. Olivar *(100=22).*

— *°**Ricini** $^1/_2$–3 Esslf. (8·0 bis 30·0) p. d. m. t. pur in Milch, Thee, Kaff. etc., Emuls., Kaps. (Gallertkaps. à 5·0), Gelée, Schüttelmixt.; ext. zu Klyst. (1–4 Esslf. p. d.), Haaröl *(100=38).*

— * **Santali** 0·3 p. d. und 0·9 p. die in Gelatinekaps. innerlich gegen Gonorrh. *(1=8).*

— **Terebinthinae** (°**commun.** und *°**rectificat.**) *(10=4)* 0·25–1·0 (10 bis 30 Tropfen auch bis 10·0) p. d. pur, in Emulsion., Kaps., Pill., Mixt.; Antidot bei Phosphorverg.; ext. zu Inhalat. (theelfw. z. Inhal.), Mund-, Gurgelwäss., Zahnm., Klystier. (3·0—15·0 : 150—200 Emul.), zu Einreib., Verbandm., Bepinsel. d. Haut, Linim., Pflast. (1 : 5—8 Harz), Salb. (1 : 3–5); Cataplasm., Seif. — **Ol. T. ozonisatum** 5–20 Tpf. p. d. 2 stf. m. Honig, Eigelb; ext. wie oben, wirkt intensiv.

* **Olibanum** (Gummi resina, Weihrauch) 0·2—1·0 p. d. m. t. in Pill.; zu Räucherspec., Pflastern, Salben *(10=10).*

*°**Ononidis spinos. Rad.** 1·0 bis 3·0 p. d. m. t. in Pulv., Dct. (10·0—50·0 : 100—500 Col.), Spec. (100=38).

Oophorin s. Ovarin.

* ⁰†**Opium** (10% Morphin.) 0·008—0·15! p. d. ad 0·5! p. die in Pulv., Pill., Trochisc. (à 0·007) Mixt., Emuls.; ext. als Streupulv. (pur od. Sacchar., Gum. arab. etc. 1 : 5—10), Zahnpillen (pur od. mit arom. Stoff.), Cataplasm., Pasten, Rauchm. (Cigaretten pur od. m. anderen Rauchm.), Salben (1 bis 5 : 10—25), Pflast. (1 : 8 bis 16), Linim., Suppos. (0·1 bis 0·2 p. d.), Vaginalkug. *(1=10).* — **Op. tostum** (Chandu) milder wirk. — ***Electuar. Theriac.** (Elect. arom. c. Opio) ½b. 1 Theel. 3—4m. t. *(10=8).* — **Emplastrum opiat.** (odontalgicum; 1 : 20). — * ⁰†**Extract. Opii** 0·005—0·1! p. d. ad 0·4! p. die (Ph. G 0·15! p. d. ad 0·5! p. die) in Pulv., Pill., Pastill., Lös.; zu Mund-, Gurgelw. (0·2 bis 1·0 : 150), Inhal. zerst. (0·05—0·2 : 100), Augenw. (0·05—0·5 : 25), Zahnpill., Injection. (0·1—0·5 : 50), Klystier. (0·05—0·1 p. d.), Supposit. (0·05—0·1 p. d.), Salben (0·5—1·5 : 10), Tamponad. (0·5—2·0 : 100); subcut. Inject. (1 : 2—10 Aq.) *(1=30).* — *⁰†**Tinct. Op. simpl.** *(1=2)* u. *⁰†**Tinct. Op. crocata** *(1=4)* (1 Grm. = 0·01 Morphin) 0·1—1·5! p. d. (3 b. 25 Tpf.) ad 5·0! p. d. pur od. in Mixt.; ext. zu Mund- u. Gurgelw. (0·5—2·0 : 100), Inhalat. zerst. (0·2—2·0 zu 100), Zahntpf., Pinsel. (pur oder 1 : 1—2 Aq.), *Augenwäss.* (pur od. 1 : 1 *bis 2 Aq.*), zu Fomentat. *(1—6%)*, Inject. (1—12%), *Verbandw* (2—6%), Klyst. (3 *bis 20* Tpf. p. clysm.), Rauchmittel (Cigaretten), Salben (1—5 : 25), Linim. — ⁰**Tinct. Opii benzoica** 1·0 bis 3·0 p. d. (20—60 Tpf.) 2—4m. t. (Kind. 5—20 Tpf.) pur, Mixt., Syrup *(10 =30).* — * ⁰**Pulvis Doweri** (Pulv. Ipecacuanhae opiatus; Opii u. Rad. Ipecacuanh. aa. 1, Sacchar. 8). 0·1—1·5! p. d. ad 5·0! p. die *(1=4).* — **Unguent. Opii** (Extract. Op. 0·1 : 20).

Opodeldoc = Linimentum saponato-camphoratum.

Opotoprarenin. Extr suprarenale haemostaticum. Alkoholfr. Nebennierenextract.

Orexinum basicum *(1=70)* u. **muriaticum** 0·1—0·5 1m. t. 2 Stdn. vor dem Essen in Oblat. *(1=65).* — Ebenso **O. tannicum** *(1=60).*

Organsäfte. Aus Thyreoidea, Thymus, Ovarien, Nervensubst., Milz, Knochenmark hergestellt, meist in Tablettenform; der Mehrzahl nach theils wirkungslos, theils noch wenig erprobt.

***Origani Hb.** zu Spec., Cataplasmen *(100 = 28).*

Orphol (β-Naphtholwismut). Int. 1·0—10·0 p. d. in Pulv. m. Milch. Syr. etc. *(1=20).*

Orthoform (*p*-Amido- *m*-Oxybenzoesäuremethylester). Locales Anästheticum, in Pulverform oder 10- bis 20%iger Salbe (bei Substanzverlusten); in 3%iger wäss. Suspens. zu subcut. Injectionen *(10=330).*

Oryzae Amylum u. **Farina** zu Nähr-, cosmet. Zwecken.

Ossa Sepiae zu Zahnpulver *(10=6).*

Ovum gallinaceum. — **Albumen** und **Vitellum Ovi.** — **Oleum**

rum, Haar- und Augenmittel, Acet.

Oxycampher int. 0·5-1·0m. tgl. — **Oxaphor** = 50% alk. Lös. d. Oxycamphers *(1=80)*.

* **Oxymel simplex** (1 : 2 Mel depurat.) Zusatz zu Mixt. (15—30 : 100) u. Getränken (50—100 : 1000); ext. zu Mund- u. Gurgelw., Klyst. (60·0 — 120·0 p. clysm.) *(10=8)*.

* **Paleae haemostatic.** (Pengawar-Djam), ext. *(1=10)*.

Pankreatinum. Grosse Verschiedenh. in d. Präpar.; theelfw. od. 0·5—15·0 p. d. pur. in Pill., Fleischbr.; in Klystier *(1=10)*.

* **Papaveris Fruct. (Capsul.) immaturi.** Dct. (5·0—15·0 zu 100—200 Col.); zu Breiumschl.; in Dct. (10·0 bis 20·0 : 100 Col.), zu Gurgelwässern, Waschw., Klyst. *(10=10)*. — ***Flores Papav. rhoeados** zu Species *(10 =10)*. — °**Oleum Papav.** wie Ol. Amygdalar. *(10 = 5)*. — °**Semen Papav.** intern. in Emuls. (5·0—15·0 : 100); extern in Emuls. (10·0 bis 30·0 : 100), zu Gurgelw., Injectionen *(100=30)*. — * °**Syrupus Diacodii** (S. Pap. alb.; Fruct. P. 50, Rad. Liquirit. 25, Aq. com. f. 350 ad Col. 250 + Sacchar 400) theelfw.; Corrig. *(10=8)*.

Papayotinum (Papainum) 0·05 bis 0·5—1·0 p. d. in Lös., Pulv., Pill.; zu Insufflat., Pinsel (0·1 : 2 Aq. od. 5 bis 10% Lös.), subcut. (10%) *(1=80)*.

°*Paraffinum liquid.* (Vaselinöl). *Const. für Salben, Linim. (100=50)*. — °*P. solidum. Const. für Salben, Cerat., Pflastern, Contentivverbänden etc. (10 =8)*. — **Charta paraffin u. Ch. p. phenylata.** — **guent. paraffini** (Vasel Paraff. solid. 1 + Par liquid. 4) wie vorher.

°† **Paraldehydum** 1·0—2·0 p (Sedativ.), als Hypno 5·0! p. d., 10·0! p. die mehr. Einzelgab. in Mi schl. M., Kaps., Emu Antidot bei Strychn vergiftung.; ext. in S posit. u. Klystier. (c. p. clysm.) *(10=44)*.

Pareirae bravae Rad. I Dct. (15·0—30·0 : 100— Col.); ext. in Cataplas (aus d. Tinct. P. b. Farin. sem. Lini.) *(10=*

Pasta dentifricia dura (Pu Sapon. venet. 20, C carbon. 8, Carmin. 0 Ol. Menth. pip. 0·5, Spi Vin. 90% 5). — **P. d. mo** (Pulv. Sapon. venet. Calc. carbon. 20, Carm 0·2, Ol. Menth. pip. Spir. Vin. 2, Syr. simpl

Pelletierinum sulf. *(0·01=* **u. tannicum** *(0·1=25)* 0·1 0·5! p. d. ad 5·0! p die Lösung (bes. Sennainfu

Pellotinum hydrochlor. 0·05—0·08, subcutan 0 (Hypnoticum.)

Pengawar-Djambi Blutst mittel.

Pental. Narcotic. nur f. k dauernde Narcosen. bis 15 0 *(1=20)*.

* ° **Pepsinum** (solubile) 0·1 0·5 p. d. 2—4m. t. in Pu Lösung., Kaps. (mit o ohne Citron.-Weinsäu Milch-Salzsäure); zu s cutanen Injection. *(1 =* — **Lacto-Peps.** (ein Ge von Pepsin, Paukr Milchzucker u. Malze *(1=8)*. — ° **Vinum** Esslw. n. d. Mahl zu

Verlag von Urban & Schwarzenberg in Wien und Berlin.

Anatomischer Atlas für Studirende und Aerzte.

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Alois Dalla Rosa
Herausgegeben von
Dr. Carl Toldt,
k. k. Hofrath, o. ö. Prof. der Anatomie an der Univ. Wien.

Mit 1470 zum Theil mehrfarbigen Holzschnitten und erläuterndem Text.

1. Lieferung (= 1. und 2. Lieferung der ersten Auflage).

A. Die Gegenden des menschl. Körpers.

B. Die Knochenlehre. Zweite Auflage. (Figur 1—377 und Register.)
Preis K 9.60 = M. 8.— geh.; K 11.04 = M. 9.20 geb.

2. Lieferung (= 3. Lieferung der ersten Auflage).

C. Die Bänderlehre. Zweite Auflage. (Figur 378—486 und Register.)
Preis K 6.— = M. 5.— geh.; K 7.44 = M. 6.20 geb.

3. Lieferung (= 4. Lieferung der ersten Auflage).

D. Die Muskellehre. Zweite Auflage. (Fig. 487 bis 616 und Register.) Preis K 8.40 = M. 7.— geh.; K 9.84 = M. 8.20 geb.

4. Lieferung (= 5. Lieferung der ersten Auflage).

E. Die Eingeweidelehre. Zweite Auflage. (Fig. 617—903 und Register.) Pr. K 9.60 = M. 8.— geh.; K 11.04 = M. 9.20 geb.

5. Lieferung (= 6. und 7. Lieferung der ersten Auflage).

F. Die Gefässlehre. Zweite Auflage. (Fig. 904 bis 1092 und Register.)
Preis K 14.40 = M. 12.— geh.; K 15.84 = M. 13.20 geb.

8. Lieferung.

G. Die Nervenlehre. *a)* Centrales Nervensystem u. Rückenmarksnerven. (II. Fig. 1—168.) Preis K 8.40 = M. 7.— geh.

9. Lieferung (Schluss des Werkes).

G. Die Nervenlehre. *b)* Hirnnerven u. sympathisches Nervensyst. (II. Fig. 169—378 u. Regist.)
H. Die Sinnesorgane. Preis K 9.60 = M. 8.— geh.

Lieferung 8 und 9 in einem Band geb. K 19.44 = M. 16.20.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie von der Verlagshandlung
Urban & Schwarzenberg in Wien und Berlin.

in Pill., Lösung. (1% Aq. od. Glycerin. 5—10 Tpf. p. d. 2—4m. t.); zu Einträufel. in's Auge (1 Glyc.; Aq. 10—15). — **Tinct. Ph.** 5—10 Tpf. p. d. 2—4m. tägl. — ***°†Physostigmin. salicylicum** (Eserinum sal.) 0·001! p. d. ad 0·003! p. die; subcut. Inject. (1% Lös.) 0·0005—0·001 p. d. ad 0·003 p. die; Einträuf. in's Auge (0·02—0·05 : 10 Aq.) *(0·01=10)*. — **°Ph. sulfuric.** *(0·01=8)*.

Phytolaccae decandrae Rad. 0·05—0·4 p. d. als Alterans, 0·5—2·0 p. d. als Emetic. in Pulv. — **Extr. fluid. Ph. dec.** 0·2—2·5 p. d. m. t. — **Phytolaccinum** 0·05—0·3 p. d. m. t. (Laxans).

Phytoxylinum 5% äther. od. alkohol. Lös. wie Collod. *(1=90)*.

Pichi-Pichi Extr. fl. int. theelöffelweise *(1=8)*.

Picrotoxinum 0·0005—0·006! p. d. ad 0·02! p. die in Pill., Pastill., Lösung.; in Salb. (0·1—0·5 : 5—25) *(0·1=20)*.

Piliganinum 0·01—0·02 p. d. in Verbind. mit Chloralhydrat bei Asthma in Pulv., Pill., Lös.

***°†Pilocarpinum hydrochloric.** 0·03! p. d. ad 0·06! p. die in Pill.; z. subcut. Inject. (2% Lös.) 0·015—0·03! p. d. (Kindern 0·001—0·01); Augenwäss. (0·1—0·2 : 10 Aq.) *(0·01=4)*.

Pimpinellae Rad. wie Rad. Imp. *(100=35)*. — **°Tinct. P.** 10—30 Tropfen p. d. m. *tägl.; zu Mund- u. Gurgelwäss., Zahntinct. (10=8)*.

Pini Fol. zu Kiefernadelbäder, ebenso Ext. P. fol. (500·0—500·0 p. baln.) u. Ol. Pini fol. (Kiefernadelöl) *(1=6)*; letztere auch Einreib., Inhalat. wie Tereb. — **Resina Pin.** *(1=8)*, s. **Terebinth. cocta**

Piper album — **P. nigr** 0·2—1·0 p. d. m. tägl. Pulver, Pillen, Macer (5·0—10·0 : 100 Spiritu Wein); ext. in Macer zu Gurgelwass.; Salbe Kaumittel. — **Piperin** 0·1—0·6! p. d. ad 1·2! d. in Pulv., Pill. *(0·10=*

Piperazin (Piperazidin) bis 3·0 p. d. in wäss. L als harnsäurelös. Mit *(1=100)*.

Piperonal. Heliotropin.

Piscidiae erythrinae rad. Co (Sedativ., Hypnotic.) bis 1·0 p. d. 2—4m. t. Pulv. — **Extr. P. sicc** 0·25—0·5 p. d. m. t. Pill., Mixt. — **Extr. P. fluid.** 2·0—6·0 p. d. ad 1 p. d. *(10=20)*. — **Tinct. P.** 40—50 Tpf. p. die. — **P cidinum** wie die Extr. s

***°Pix liquida** (Holzthee 0·3—1·5 p. d. 2—3m. in Pill., Kaps.; ext. Einreib. (pur od. Alkohol, Fett, Seifen 1 2—10), zu Räucherun Inhal.; Pflast. (1—2 Cer Salb. (1 : 4—6) *(100=20)*. °**Aq. Picis** (A. picea) essf bis tassenw. 2—4m. z. Inhal., Inj., Verband *(100=20)*. — **Emulsion Goudron** (Pix l. + Na carbonic. + Aq.), Emu de G. végétale (Pix l. Eigelb + Aq.), Liqueur d. Goudr. 1 Theelf. in Glas Wasser m. t.; Waschung., Inject. (1 4 Aqu.). — **Sapo. P** (piceus) Wasch. und reib. (*10=8*!. — **Unq Pic. sulfur.** — **Pix L**

(Steinkohlentheer) xt. als Desinfectm. ös. alkohol., Seifen. . L. ebenso.
is Hb. Dct. (15·0 bis 00—200 Col.).
natrio-chlorat. wie **atr.-chlorat.**
ibum aceticum 0·008 10! p. d. ad 0·50! in Pulvern und Lösung., Emuls., Schlund-Kehlkopf- (1 : 5—10 Sacch.), Gurgelwäss. (0·1 bis 0), Pinsel. (1—2 : 10), t. (0·1—1·0 zu 100), (0·2 - 0·6 zu 100), wäss. (0·2—2·0 : 100), läg., Wasch. (0·5 : 100), Klyst. (0·1 bis 5! p. clysm.), Salben 10) *(10=4)*. — **Pl. olutum** (1 : 6 Aq.) — **acetic. basic. solut.** r Plumb. subacetic sig) zu Mund- lw. (0·5—1·5 : 100), ., Umschl., Wasch., ndw. (in 3—5mal r Dosis als Pl.). Augenwäss. (0·5 0 : 100), Injection. ·0 : 100), Klystier. ·0 p. clysm.) Linim. ·0 : 25), Salb. (1 : 5 b. =3). - *°Aq Plumbi** (Pl. . 1:Aq.49) *(100=14)*. **Pl. spirituosa** (Aq. di; Pl. a. b. s. 2 zu n. 5, Aq 100) zu nden, Waschung., wäss., Fomentat., , Klystier. (100·0 ·0 p. clysm.) *(100=* ***Unguent. Pl. acet.** *(10* ·. °**Ung. Plumb.**
onicum (Cerussa) ulver., zu Salben, *(10=8)*. — ***°Empl.** (Empl. diachyl. simpl. u. Cerussae aa. 1 : 70 Ung. simpl.) *(10=10)*. — ***°Unguent. Ceruss.** (Empl. diachyl. 1 : 3 Cerussae : 5 Axung.) *(10=10)*.
P. jodatum 0·05—0·5 p. d. m. t.; in Pulvern, Pillen; zu Salben (1 : 5—10) u. Pflast. *(10=80)*.
— **nitricum** wie Pl. acetic. *(10=10)*.
— ***oxydatum fusum** (Lithargyrum; Bleiglätte) zu ***°Empl. Diachylon simpl.** (Empl. Lithargyri) *(10=6)*; dieselben zu ***°Empl. diachyl. composit.** (= adhaesivum: Empl. Pl. gummi resinae) *(10=10)*. - **Empl. diachyl. linteo extensum.** — **Ung. diachyl. Hebrae.**
— ***° oxyd. (hyperoxyd.) rubrum** (Minium) *(10=6)* z. ***°Empl. Minii ad.** (Empl. fusc. camphorat.) *(10=10)*.
— **tannicum** *(10=30)* zu **° Ung. Pl. tannic.**
Podophylli peltati Rad. 0·5 bis 1·0 p. d. als Purgans, 1·0 bis 2·5 p. d. in Pulv. (Drastic.) — **° Podophyllinum** (Resina P.) 0·005—0·02 (bei habituell. Verstopf.), als Drastic. 0·03—0·1 (Kind. 0·005—0·02), in alkohol. Lös., Mixt., Pill., Pulv. *(1=15)*. — **Podophyllotoxin.** 0·015—0·02! p. d. ad 0·06! p. die in alkohol. Lös., Pill., Pulv. *(1=30)*.
Polygalae amarae Hb. wie Hb. Centaur. *(10=6)*.
Populi Turiones zu **Unguent. Populi** *(10=10)*.
Potio Riveri aus Acid. citr., mit Natr. carb. gesättigt. Int. essl öffelw. bei Fieber.
Propylaminum (Trimethylamin) 0·1—3·0! p. d., 10·0! p. die in Kaps., Mixt. (1=6).

Protargol (Antigon. und bei Conjunctivitiden, auch intern bei Ulc. ventriculi in $^1/_4$–1% wässer. Lösung *(1=40)*.

Protonuclein int. 0·2–0·5 m. 1gl., ext. wässer. Lös (1 : 8). *(1=20)*.

Pruni Virginianae Cort. zu Extr. fluid. P. V. 2·0 bis 4·0 p. d. m. t. (Tonicum).

Pulmonariae Fol. w. Fol. Alth.

* **Pulpa pruhorum** s. Senna.

Pulsatillae Hb. *(10=4)* zu **Extr.** P. 0·05–0·2 p. d. ad 1·0 p. die in Mixt., Pill. *(1=10)*. — **Tct. P.** 10–40 Tpf. ad 3·0 p. d. u. 10·0 p. die pur, in Lös., Mixt.; ext. zu Einr. u. Wasch. *(10=40)*.

*° **Pulvis aerophorus** s. Natr. hydrocarbonic.

— *° **Ipecacuanhae opiatus** (P. Doweri; s. Opium).

Puro (Fleischsaft, Succus carnis express.). Kräftigungs- und Ernährungsmittel, int. Esslöffelw. in Suppe, Milch etc.

Pyoktaninum coeruleum, Methylviolett. Ext. als Streupulv., Anthrophore, Bougies *(1=24)*.

Pyoktaninum aureum, Auramin. wie d. V. *(1=36)*.

Pyramidon 0·3–0·5 p. dos., 0·6–1·0 p. d. (Antipyret.) *(1=50)*.

Pyrantin int. 1·0–3·0 (Antipyreticum) *(1=40)*.

* **Pyrethri Romani Rad.** als Kaum., Zahnm., Mundw., Gurgelw. in Dct. od. Inf. (3·0–10·0 : 100–200 Col.) *(10=5)*.

Pyridinum purissim. (Antiasthmatic.) 3·0–5·0 werd. auf ein. Teller bei ein. Zimmertemperat. (kleines Zimmer) v. 20–25° verdunsten gelass. (mit od. ohne Aq.: auf 5–20 Tp. c. 40 Ccm. Aq.). In c. 1 S ist die obige Quantit verdampft. Der Pat. blei 20–30 Min. im Zimme Die Proced. wird 2–3m im Tage wiederh. *(1=*

*° **Pyrogallol** s. Acid. pyro

*° **Quassiae Lignum** 0·5–2 p. d. m. t. in Pulv., Inf. (5 bis 10·0 : 100 Col.), Mac rat (3·0–5·0 : 100 Wein Quassia-Becher; zu Klys in Inf. *(10=3, pulv. =10)*. — **Cort. Q.** ebenso.

*° **Ext. Q.** 0·2–0·6 p. d. t. in Pillen, Lös., Mix *(1=24)*. — **Tct. Q.** 20– Tropfen p. d. 2–4m. *(10=8)*. — **Quassinum** 0· bis 0·1 p. d. 1–3m. t. Pulv., Pill. *(0·1=30)*.

* **Quebracho Cort.** *(10=5)* **Lign.** 0·30–0·50 p. d. Macerat. od. Decoct Pulv (5·0—15·0 : 100—300 Co esslöffelweise zu Inhal.

* **Extr. fluid. Q.** 1–2 Thee p. d. ad 8·0 p. die *(10=2*

— **Tinct. Q.** ebenso ad 5 p. die *(10=10)*.

*° **Quercus Cort.** Dct. (10 bis 25·0 : 100—150 Col. ext. in Dct. zu Mun Gurgelwäss., Inject., Ui schläg., Waschung., Bä ($^1/_2$–1 No.), Salb. *(100=2 pulv. 10=8)*. — ***Sem. (Gla dulae) Q. tostum** (Eichlk 1—3 Thlf. zu 1 Tasse Ac *(100=30)*.

Quillajae Saponariae Co Dct. (3·0–5·0 : 200 Co esslfw. *(10=3)*.

*° **Ratanhae Rad.** 0·5–1·5 d. m. t. in Pulv., Pil Dct. (5·0–15·0 : 100 Col z. Zahnm., Streup., in l zu Mund-Gurgelwäss Klyst., Injection (10 gepulvert 18). —

Ratanh. 0·2—1·0 p. d. m. tägl. i. Pillen, Trochisc., Mixt.; zu Mund-Gurgelw. (5·0—10·0 : 100). Pinselung. (1·0—5·0 : 25), Inject. (1·0 bis 2·0 : 100). Umschläg., Waschung., Zahnmitteln, Salben *(1=14)*. — *° **Tinct. Rat.** 20—40 Tropf. p. d.; zu Zahntinct., Mund-Gurgelwasser *(10=8)*.

Renaden (Nierenextr.) int. 2·0 p. d., 6·0—8·0 p. die.

Resol, Desinficiens.

Resorbin, Salbengrundlage *(10=18)*.

Resorcinol extern. als 25% Streup. v. od. 6—2% Salb.

°**Resorcinum** crystallisat. pur (Antifermentativ, Antiseptic., Antipyretic.) 0·2 bis 0·5—3·0! p. d. m. t. ad 10·0! p. die in Oblat., Mixt., Kaps.; ext. in Substanz od. conc. Lösung zu ätzend. Pinsel. bei Diphtheritis, verdünnte Lös. zu Inhalat. (½—2%), Inject. (½—3%). Wasch., Einr. (entstehende braune Fleck. werd. m. Citronens. entfernt), Salb. (5 : 30), z. Wundbehandlung (auf Watte oder Gaze) *(10=90)*.

°**Rhammi catharticae Fruct.** zu °**Syr. Rh. c.** als Laxans 1—4 Esslöffel, Zus. zu Mixt. (10·0—20·0 : 100).

— °**frangulae Cort.** Inf. (10·0 bis 30·0 : 100—200 Col.). — **Extr. fl. Rh. f.** (Rhamnin) int. 15·0—20·0 *(10=14)*.

— * **Purshiani cortex** (Casc. Sagrada) 0·5—2·0 p. d. Inf. *(10=5)*. — *°**Extr. fluid. C. S.** ½—1 Thlf. m. tägl. ad 4·0! p. d. u. 10·0! p. die pur od. Syr. *(10=22)*. — **Extr. alkoholic.** 0·2—0·5 p. d. m. t. — **Cascarin** int. in Pill. à 0·1 *(1=40)*.

*°**Rhei Chinensis Rad.** (Rhabarber) 0·1—0·5 p. d. als Digest., 0·5—5·0 p. d. als Abführm. m. t. in Pulv., Pill., Kaps., Inf. (2·0—5·0 : 100 Col.); ext. als Streup., Klyst. (10·0—20·0 : 100 Col.) *(10=30 pulv. 1=5)*. — *°**Extr. Rhei** 0·05—0·3 p. d. (Tonic.), 0·5—1·5 (Laxans) p. d. m. t. in Pill., Lösung *(1=12)*. — °**Ext. Rhei compositum.** (Ext. Rh. 30 zu Extr. Aloës 10 zu Res. Jalap. 5 zu Sap. med. 20) 0·1- 0·3 p. d.; als Laxans 0·3—0·5 p. d. in Pill. *(1=10)*. — *°**Syrup. Rhei** theelf. bis esslw., zus. zu Mixt. *(10=6)*. — *°**Tinct. Rh. aquosa** ½—4 Theelf. p. d. m. t. *(10=8)*. - *°**Tct. Rh. vinosa** (Vinum Rhei Darrhelii) *(10=24)*. ½—4 Theelöffel und noch mehr.

Rhinalgin (Thomalla), aus Alumnol, Menthol Ol. Valerianae und Ol. Cacao bestehende Stäbchen; in die Nase einzuführen bei Schnupfen u. s. w.

Rhodododendri Fol. 0·5 bis 1·5 p. d. in Pulver, Inf. (5·0—15·0 : 100—200 Col.). **Tinct. Rhois arom.** von Rhus arom. S. dieses.

Rhus. aromat. Extr. fluid. int. 0·5-2·0 3m. tgl. *(10=70)*. — **Tinct. R. a.** 10 Trpf. m. tgl.

*°**Rosae Flor.** *(10=10)* zu Species u. Bereit. von *°**Ac. Rosar.** *(100=20)*. — *°**Ol. Rosar.** *(0·1=20)*. - **Spirit. R.**

* **Rosmarini Fol.** z. Spec.; ext. in Inf. z. Bähung., Waschung., Umschläg. etc. (10=2). — *°**Ol. Rosmar.** Corr. t. Salb., Linim., zu reiz. Einreib. gegen Filzläuse (1 = 2 — **Spirit. R.** u. °**Ung. R.** ex ext. z. Einr. (10=6)

Rotterin. (Rotter'sche Pastillen) aus Zinc. sulfocarb., Zinc. chlorat., Acid. boric. salicyl. citr., Thymol, Natrium chlor.; je 1 Stück in 1 Liter Wasser gelöst als Desinficiens.

Rubi Idaei Fruct. zu **Acetum** R. I. — ***Syr. R. I.** *(10=6).*

Rubi Chamaemori Fol. Inf. (10·0—15·0 : 200—300 Col.) als Diuretic.

Rubiae tinctor. Rad. 0·5—1·5 p. d. in Pulvern, Dct. (15·0—30·0 : 150—300 Col.) *(100=40).*

Rubidium bromatum int. 0·18 b. 0·3 3m. tgl.

— **jodatum** int. 0·06—0·3 p. d. ext. zu 5% Augentropf. *(1 40).*

— **tartaricum** wie R. bromat.

Rutae Fol. 0·5—1·5 p. d. m. t. in Pulv., Inf. (10·0 bis 15·0 : 100—200 Col.); zu Mund-Gurgelw., Klyst. in Inf. *(10=5).* — **Aq. Rut.** ebs. — **Ol. Rutae** 1—3 Tpf. p. d. m. t. *(1=12).*

***Sabadillae Fruct.** (Semen) 0·1—0·25! p. d. ad 1·0! p. die in Pulv., Pill., Inf. (0·5—1·0 : 100 Col.); ext. als Streup.; in Inf. oder Dct. (1·0—5·0 : 100 Col.) zu Waschung., Clysm.; Salb. (1 : 4—10) *(10=12).* — ***Ungt. Sab.** (1 : 4). *(10 = 12).* — **Tinct. S.** 0·15 bis 0·5! p. d. m. t., ext. zu Einreib.

***Sabinae Summitates** (Frond.) 0·2—1·0! p. d. ad 2·0! p. die in Pulv., Pill., Inf. (2·0—8·0 : 100 Col.; ext. zu Streup., Salb.; in Inf. *(5·0—10·0 : 100) zu* Mund-, *Gurgelwäss., Inject.,* Umschlägen *(10=6).* — **Extr. S.** *0·05—0·2! p. d. ad 1·0! p. die (1=20).* — **Ol. Sab.** *½—3 Tpf. p. d. 2—3m. t.* in Elaeosacchar., Pill. *(1 =3).* — **Tinct. S.** 20—60 Tpf. — **Ungt. Sab.**

Saccharinum (Benzoësäure-Sulfinid), Ersatzm. des Zuck. (bes. f. Diabetiker) u. Corrig. (280mal süsser als Zucker) f. bitterschm. Arzneim., z. B. Strychn., Chinin *(1=15).* — **Morphin. saccharinic.** etc. Es ist in Aq. m. Hilf. v. Natr. carbonic. lösl.; 5·0 p. d. soll. ohn. Nachtheil genomm. werd könn. — **Saccharinsyrup** — **Saccharintabletten.**

***° Saccharum albissim.** Expector.; Constit. Corrig.; ext. Constit. für Augen-, Schnupf-, Schlund-, Kehlkopfplv.; zu Klyst *(10=4).* — ***° Sacchar. Lactis** ebenso, weniger hygroskop., als mildes Laxans 10·0 bis 20·0 p. d. mit Milch *(10=10).* — ***°Syr. simplex** *(10 =4)* ebenso. — **° Rotulae sacchari,** Constituens.

° Sal Carolinum factitium s. Natr. sulfuric.

— **Seidlitzensis** s. Magn. sulfuric.

— **Seignetti** s. Kal. natriotartaric.

Salacetolum (Salantol), int. 2·0—3·0 p. die in 20·0—30·0 Ricinusöl (b. infect. Darmcatarrh). 2·0 p. d., 4·0—8·0 p. die als Antirheum. in Pulvern *(10=320).*

***° Salep Tuber** 0·5—1·0 p. d. ad 10·0 p. d. in Pulv., Dct. (0·5—1·5 : 200—300 Col.); z. Klyst. in Dct. (2·0 : 100 Col.) *(10 = 16. pulv. 10=22).* — **° Mucilago S.** (1 : 100 Aq.) theelf. b. esaltw., Zusatz zu Mixt., zu Klyst.

***Salicis Cort.** Inf. Dct. (10·0 bis 25·0 : 100—200 Col.); wie Cort. Querc. *(100=22).* — **Salicin.**

0·5—2·0 p. d. ad 10·0 p. d. in Pulv., Pill., Mixt. *(1=10).* — **Salic. nigrae Extr. fluid.** (Antiaphrodisiac.) 3·0—5·0 p. die. *(1=6).*

Salliformin (Urotropinsalicylat), int. 0·5 3m. tgl. in Wasser gelöst *(1=30).*

Saligallol (Pyrogallodisalicylat), ext. wie Pyrogallol.

Saligenin (Ortho-Oxybenzylalkohol) int. 0·5—1·0 m. tgl. in wässer. Lös. (Antirheumaticum) *(1=60).*

Salipyrin (Salicylat d. Antipyrin) 1·0 p. d. 6·0 p. d. in Schüttelmixt. Febrifug., Antirheumatic. *(10=70).*

Salocoll (Phenocoll. salicyl.) int. 0·5—1·0 p. d. (Antineuralgicum) *(1=32).*

°**Salolum** (Salicyls. Phenyläther) 1·0—2·0 p. d. ad 10·0 p. die in Pulv., Tabl., Mixt.; Streupulv. (pur oder mit Amyl.) in alk. od. äther. Lös. zu Zahnm., Mundwäss., Umschlägen z. Wundbehandl. (Watte, Gaze 50%; Collod.), Lin., Salb. (0·5—1·0:10) *(10=35).*

Salophen (Antirheum.), 1·0 p. d., 3·0—5·0 p. die in Pulv. *(1=30).*

Salosantal, int. 10—20 Trpf., 3m. tgl., od. in Kaps. *(1=10).*

Salubrol, Ersatzmitt. d. Jodoform. Anw. w. d. *(1=25).*

Salumin (Alumin. salicylic.) ext. als Streupulv. (antisepticum) *(1=30).*

Saluminum solubile (Aluminium salicylicum ammoniatum), ext. zu Pins. (20% mit Glycerin u. Wasser).

*°**Salviae Fol.** 0·5—2·0 p. d. in Pulv., *Inf.* (5·0—15·0 *zu 100—200* Col.), Spec.; *zu Zahnpulv.*, Streupulv., *in Inf. zu* Mund-Gurgelw., *Inj.*, Wasch. etc. *(10=4, pulv. 10=8).* — ***Aq. Salviae** *(100=22).* — **Extr. Salv.** 0·5—1·5 p. d. m. t. *(1=10).* — **Ol. aether. Salv.** 1—3 Trpf. m. t.; zu Zahntpf., Mundwass., Inh., Latw. etc. *(1=12).* — **Tinct. Salv.** 20—40 Trpf. p. d. int. *(10=10).*

*°**Sambuci Flor.** in Spec. Inf. (5·0—15·0 : 100—200 Col.), wie Flor. Chamomill. *(10=4).* — **Aq. S.** *(100=30).* — ***Roob Sambuci** (Succ. Samb. inspissat.) theelöffelw., zu Mixt. (10·0 b. 50·0 : 100—200) *(10=8).*

Sanatogen (glycerinphosphorsaur. Caseinnatrium), Nährpräparat, theelöffelweise in Milch, Suppe etc. *(50=240).*

Sandaraca (Resina) zu Zahnkitt u. Räucher.

Sanguinal. Eisenmittel in Pillenform. Int. 3mal tägl. 3 Pillen vor den Mahlz.

Sanguinoform. Aehnlich zu gebrauchen.

Sanguinariae Canadens. Rad. (Emeto-Cathart.) 0·2—0·6 p. d. in Pulv., Pill., Dct. (2·0—5·0 : 100—200 Col.). — **Sanguinarinum** 0·005—0·008 p. d. (Expect.) 0·01—0·02 p. d. ad 0·05 p. die (Emeto-Cathartic.) *(0·01=10).* — **Tct. S.** 10—30 Trpf. p. d. m. t.

Sanguinin. Eiweisseisenpräparat mit lösl. Calciumphosphat; in Pulverform, messerspitzweise.

Sanguis Draconis (Resina Drac.) zu Zahnm., Pfast., Streupulvern *(1=16).*

Sanoform, Ersatzmittel des Jodof. Anw. w. d. (1=35).

Sanose, Nährpräp. 20·0—30·0 auf 1/2 Liter Milch.

***Santalin rubri Lignum** (Santalin.) zu Spec., Zahnpulv. u. Räucherm.

Zusatz) *(10=2)*: ebenso **Tct. S. r.** — * **Oleum Santali Ostindic.** 0·03 p. d. ad 2·0 p. die in Kaps. (wie Bals. Copaiv.) *(1=8)*.

*° † **Santoninum** 0·0—0·13 p. d. ad 0·3! p. die in Pulv., Pill., Trochisc., zu Klyst. (0·05—0·1 : 50—100), Supp. (ebs.) *(0·1=3)*. — *° **Troch. S.** (à 0·0025—0·005) *(10 St.=20)*. — **Natrium santon.** 0·1—0·2 p. d. 1—3 m. t. in Pulv., Pill. *(1=30)*. — **Calcium santon.** ebs. *(1=20)*.

Saponariae Hb. Inf. (10·0 b. 30·0 : 100—200 Col.) *(10=2)*. — **Rad. Sapon.** in Dct. und Inf. *(100=36)*. — **Ext. Sapon.** 0·5—2·0 p. d. m. t. in Pill., Mixt. *(1=6)*.

Sapones int. pur in Pillen, Antidot; ext. zu Pulv., Pflast., Salb., Linim., Suppos., Klyst., Bäd., Wasch., Excip., f. versch. Medicam. — **Sapo** *° **kalinus** (viridis), *(100=20)*. *° **S. medicat.** (amygd.) *(10=12)*. — ***S. venetus** (oleaceus) *(10=8)*. — **S. jalapinus** *(1=20)*. — **S. °Picis.** — **S. sulfur.** — *° **Spir. sapon.** *(100=48)* u. ***Spir. sapon. kalini** zu Einreibungen, Wasch., Bäd. (¼—1 Kilo) *(100=64)*.

— ° **Spir. saponato-camphoratus** (flüssiger Opodeldoc) zu Einreibungen.

*° **Sarsaparillae Rad.** 1·0—2·0 p. d. in Pulv., Dct. 25·0 bis 100·0 : 500—1000 Col., alk. oder wäss. Macerat. Infus., Dct. *(10=14)*. — *° **Dct. Sarsap.** (comp.) **Zittm. fortius** *(20 Sarsap., 1 Alum. +, 0·8 Hydrg. chlor. +), 5 Kol. Sennae : 500 Col.*

— *° **Dct. S. c. Z mit.** (Rückst. v. Dct. fort. + 10 Sars. zu 500 Col.), beide esslöffelw.

— **Extr. Sarsap.** 0·5—1·0 p. d. m. t. *(1=10)*. — **Syr. S. comp.** (Rob Laffecteur) 1 bis 2 Essl. 2—4 m. t. zu m-th. Curen wie Dct. Zittm., auch Excipit. für Quecksilberpräpar., Jodkalium.

° **Sassafras** 0·5—2·0 p. d. m. t. in Pulv., Inf., Dct. (10·0—30·0 : 100—300 Col.), Spec. *(10=4)*. — **Cort. Lign. Sassafr.** ebenso. — **Ol. S.** 1—5 Tpf. p. d. m. t. *(1=7)*.

* **Sassafras Rad.** *(10=3)* s. Spec. lign.

Saturejae Hb. wie Hb. Major. *(10=6)*.

Scamonium Halepense (Resina) 0·05—0·15 p. d. m. als Drastic. 0·3—0·6 in mehr. Dos. rasch hinterein., in Plv., Pill., Emuls. *(1=10)*.

*° **Scillae Bulbus** 0·3 (0·2!) b. 0·5! p. d. ad (1·0!) 2·0! p. die in Plv., Pill., Dct., Inf., Macer. Inf. (2·0=5·0 zu 200—500 Col.) *(10=8)*. — *° **Acetum Sc.** 2·0—5·0 p. d. m. t. in Mixt., Satur.; zu Klyst., Umschlägen, Wasch. etc. *(10=5)*. — *° † **Extr. Sc.** 0·05—0·2! p. d. ad 1·0 p. d. in Pulv., Pill., Mixt. *(1=14)*. — *° **Oxymel Sc.** theelöffelw.; zu Mixt. (10·0 bis 30·0 : 100—200) *(10=10)*. — ° **Tct. Sc.** 0·5 bis 1·5 p. d. m. t. *(10=8)*. — **Tct. S. kalina**, ebs. — **Scillainum** (Scillipicrin.) 0·01-0·05 p. d. m. t. in Pillen *(0·1=8)*.

Scoparinum 0·5—1·0 p. d. in Pulv., Pill.; zu subc. Inj. (0·03—0·06 p. d.) *(0·1=60)*.

Scopoliae lucidae Fol. in Tct. S. (1 : 8 Alkohol) 20 Tpf. z. Eintr. als Mydriatic. — Ebenso: **Scopolinum** in Lös. (0·5 : 25 Aq.) tropfw. zu Instillat. Ebenso **Scopolamin. hydrobromic.** (0·0

bis 0·04 : 10) subc. 0·0001 b. 0·0005 (!) p. d. *(0·01=14).*

°**Sebum ovile** (Hammeltalg) Constit. zu Salb., Cerat., Pflast., Suppos., Seif. etc. *(100=42).* — °**S. salicylatum,** wie S. ovile. *(10=8).*

*°†**Secale cornutum** 0·3—1·0 ! p. d. ad 5·0 ! p. die jede 10—15 Minuten in Pulv., Pill., Schüttelmixt.; Inf. Dct. (2·0—5·0 : 100 Col.); als Streupulv., in Infus. (3·0—8·0 : 100 Col.); zu Klyst., Inject. *(10=14, pulv. 1=3).* — **Pulv. S. purificat.** (entölt) in etwas höheren Dos. — *°†**Ext. S. corn.** s. Ergotinum *(1=22).* — **Tct. S. corn.** 0·5 bis 2·0 p. d. ad 8·0 p. die in Mixt. *(10=50).*

Sedi minor. Hb. 0·5—2·0 p. d. in Pulv., Dct. (5·0 bis 15·0 : 100 Col.). — **Succus S. expr.** 1·0—3·0 p. d. m. t.

*°‖ **Senegae Rad.** 0·5—2·0 p. d. in Pulv., Pillen, Inf. od. Dct. (5·0—15·0 : 100—200 Col.) *(10=14).* — **Extr. S.** 0·2—1·5 p. d. m. t. *(1=10).* — *°**Syrup. Sen.** theelw. zu Mixtur. *(10=10).*

Senecio vulgaris Extr. fluid. int. 10—60 gtt. m. tägl. (bei Dysmenorrhoe und Amenorrhoe).

*°**Sennae (Alexandrinae) Fol.** 0·3—0·5 p. d. m. t. (Reizmittel) 0·5—2·0 p. d. 1 b. 2m. t. (gel. Abführm.), 2·0—5·0 p. d. (stärk. Purgans) in Pulv., Pillen, Bissen, Latw., Inf., Mac. (Inf. 5·0—20·0 : 100 Col.). Spec.; zu Klystier. (Inf. 10·0—20·0 : 100) *(10=10, pulv. 10=16).* — *°**Fol. Sennae sine resina** (Fol. S. spirit. extr.) *(10=16).* — *°**Electuarium (lenitivum) Sennae** (1 : 10 Const.), kaffeelöffw. oder in Mixt. *(10=10).* — *°**Inf. Senn. comp.** (Aq. lax. Viennensis 1 : 8 Col. + Manna), thee- bis esslw. 50·0 p. d. pur od. z. Mixt. *(10=8).* — *°**Spec. lax. St. Germain** 1 Theel.: 1 Tasse inf. *(10=16).* - *°**Syrup. mann.** (Syr. Senn. c. Manna) theelw., in Mixt. *(10=5).* — °**Syr. Sennae** w. S. mannatus. — **Acid. cathartinic.** 0·3—0·5 p. d. 2—4m. t. in Pulv., Pill., Mixt., z. subcut. Inject. (0·2—0·3 p. d.) in alkoh. Lösung *(0·1=2).*

*°**Serpylli Hb.** zu Spec.; ext. zu Umschl., Bädern etc. *(10=3).* — **Ol. Serp.** 1—2 Tpf. p. d. m. t.; z. Salb. etc. als Corrig. *(1=8).* — **Spir. Serp.** ext. zu Einreib., Umschl., Bäd. *(10=5).*

Serum. Heilserum.

* **Serum Lactis** s. Lac.

Sesami Ol. wie Ol. Amygd. *(100=36).*

Simulo Tinct. alc. int. 4·0 bis 8·0 m. tgl. *(1=2).*

*° **Sinapis sem.** 1·0—4·0 (½ bis 2 Theel.) p. d. 2—3m. t. in Pulv.; Inf. (2·0 bis 10·0 : 100), Macerat. (5·0—15·0 : 100), Molken (25·0—50·0 : 500 Milch), ext. in Inf. (3·0—12·0 : 100) zu Mund- u. Gurgelwässern, Umschl. (4·0—25·0 : 100), Bädern 50·0—120·0 f. ein local. Bad; 100·0—250·0 p. baln., Waschungen (10·0 bis 20·0 : 100); zu Sinapismen und Kataplasm. (100=35). — **Farina (Pulv.) S. ebens.** — *°**Ol. S.** 0·004 bis 0·01 p. d. m. t. Emuls.; ext. in alkoh. ölig. Lös. (0·2—1·5 : 20).

p. d. m. tgl., ext. als Rubefaciens *(10=8)*. — °**Charta sinapis.**

Sirolinum s. Thiocol.

Solaninum hydrochloricum 0·05 bis 0·1! p. d. ad 0·5! p. d. in Pill., Pulv.; zu subc. Inj. (1% Lösung) 0·05 p. d. *(0·01=8)*.

Solidago. Tinct. Solidaginis virgaureae. Int. 30 Tropf. m. m. tägl. allein oder mit Digitalis als Diureticum.

Solutol, Desinf. *(100=48)*.

Solveol, Desinfic. in 0·5% Lösung *(100=100)*.

Somatose, Nährmitt. (kaffeelöffelweise) *(1=8)*, ebenso **Ferro-Somatose.**

Somnal, 2·0–3·0 in Milch od. Bier. (Wirks. Schlafm.) *(10=110)*.

Sozojodol-Präparate, besond. das Sozojodolkalium *(1=30)* (50 Th. Aq. lösl.) und Sozojodolnatrium *(1=30)* (13—14 Th. Aq. lösl.), ext. als Streupulv., Salb., wässer. Lös. etc.

Sozojodollithium. Int. 1 bis 3·0 bei Gicht u. Rheumatismus *(1=30)*.

Spartii Scoparii Hb. u. **Flor.** (Diuretic.) Inf. Dct. (5·0 b. 20·0 : 100—300 Col.). — **Sparteïnum sulfur.** (wie Digitalis) 0·02 p. d. 2—4m. t. ad 0·1 (0·25) p. die in Pill. und Lös. *(0·10=8)*.

Spasmotin (Sphacelotoxin), subcut. 0·1 p. d.

Species *amaricantes (Hb. Absinth. — Cent. min.— Flav. Aurant. aa. 20, Fol. *Trifol. fibrini*, Rad. Cal. — *Gent.* aa. 10, Cort. *Cinnam. 2·5*), Inf. (5·0 b. *15·0 : 100 Col.) (100=60)*.— °**Sp. arom.** Hb. Orig. — *Salv.* — *Menth.* piper., *Flor. Lavand.* aa. int. ch. ext. zu trocken. Umsch., Kräuterkiss.; in Inf. od. alkoh. Macer. zu Umschl., Bäd. (½–1 Kilo) *(100=74)*. — ***Sp. aromatic.** p. catapl. *(100=92)*.— °**Spec. diuretic.** 2 Essl. m. 6 Tass. Wass. auf 4 Tass. eingek., währ. d. Tag. zu nehm. — ***Spec. emollientes.** Mit warmem Wasser zu Brei verrührt, zu Umschl. *(100=30)*. — ***Sp. laxant. St. Germain,** Inf. (5·0—10·0 : 150·0 Aq.) *(10=16)*. — °***Species Lign.** (Holzthee; Lign. Guajac. 5, rad. Ononid. 3, Liquir., Lign. Sassafr. aa. 1), int. Dct. aus 25·0 bis 60·0 p. die *(100=40)*. — ***Spec. pectorales** wie Sp. laxant. *(100=32)*.

Sperminum Poehlii, 2%ige Lösung. zu subcut. Inject. *(1 Amp.=1400)*.

Spigeliae anthelminthic. Hb. 3·0–10·0 (Kind. 1·0–3·0) p. d. in Pulv., Mixt., Latwerge.

Spilanthis oleraceae Hb.** *(10=10)* zuTinct. Spilanthis compos.** it. als Zahnschmerzm. z. Mundw. *(10=16)*.

Spinol (Extr. Spinaciae fluid. saccharat.) int. 5—20 Trpf. 3m. tgl. *(1=6)*.

°***Spiritus Aetheris** (aether. Liquor miner. Hoffmann 10—30 Tpf. pur od. als Zusatz zu Trpf., Mixt. *(10=6)*. — °**Spir. Aeth. nitr.** (Nitri dulc.) ebenso; ext. Gurgelw. u. Pins. 3·0 : 10·0 : 100 *(10=8)*.

Spir. Vini rectificat.** (c Sp. G. 0·830—0·834) =34).—°Sp. V. dilutus** G. 0·892–0·896) (10=

°***Sp. V. Cognac.** (Sp. niar.; Sp. G. 0·92 (10=18). — **Sp.**

selöl) *(100=50).* — **Sp. Frumenti** (Kornspir., Whisky) *(100=40).* — **Sp. Oryzae** (Arrac), **Sp. Sacchari** (Rum) *(10=14)*, enthält ebenfalls Weinfuselöl, daher angenehm riechend. — **Sp. Solani tuberos.** (Kartoffelspiritus, enth. Kartoffelfuselöl). Zur int. Verw. kommen mit Ausnahme des Kartoffelspiritus alle anderen ½—1 Theel. bis 1 Essl. f. p. d. m. t. pur, mit Zucker oder Aqua verd.; ext. zu Mund- u. Gurgelw. (1 : 5-10), Augenw. (0·5-2·0 zu 10), Pinsel., Wasch., Umschl., Einr., Bädern; Inj. (1 : 3—5 und darüber Aq.); zur Wundbehandl., parenchymat. Inj. (½—1 Spritze), Constit. u. Excip. für die versch. pharmac. Zubereit. und Medicam.

Spongia compress. (Pressschw. *(1=24).* — **Sp. carbolisata.** — **Sp. cerata** (Waschschwamm). — **Sp. marina** (Badeschwamm). — **Sp. tosta** (Carbo Sp.) *(10=12).*

Stannum chloratum 0·005—0·03 p. d. 2—4m. t. in Pill., Lös.; zu Verb. u. Umschl. (0·1—0·2 : 100) *(10=10).*

Staphysagriae Sem. nur ext. in Streuplv., Salb., in Dct. (10·0—15·0 : 100) als Antiparas. (Vorsicht!) *(10=8).* — **Delphinium** wie Veratrin.

Steresol (antisept. Wundm.), zum Bepinseln *(1=30).*

Steriform (Gemenge von Milchzucker mit 5% Formaldehyd), int. Antisepticum b. Infectionskrankh.

Sterisol, *int.* 0·015—0·08 p. d. *(Antiseptic.).*

Stibium chloratum (Liqu. Stib. *chlorat.*; Butyr. Antimonii) *Aetzm. (10=36).*

*†° **St. sulfuratum aurant.** 0·015 bis 0·2 p. d. 2—3m. t. in Pulv., Pill., Trochisc. (à 0·03), Linct. *(1=10).* — *° **St. sulfur. nigrum** (laevigatum) 0·2-1·0 p. d. 2-3m. t. in Pill., Pulv., Trochisc. (à 0·18) *(10=6).*

— **sulfur. rubrum** wie Stib. sulfur. aurant. *(10=35).*

*†° **Stramonii Fol.** wie Fol. Belladonna *(10=4).* — **Extr. Str.** 0·01—0·1! p. d. ad 0·4! p. d.; ext. zu Augenwäss. (0·5—2·0 : 100), Liqu., Inj. (0·5—1·5 : 100). Salben (1·0 bis 1·5 : 25), Pflast. *(1=14).* — **Sem. Str.** 0·01—0·1 p. d. 2—3m. t. — **Tct. Str.** 5 bis 10 Tpf. — 0·5! p. d. ad 2·0! p. die *(10=50).*

Strontium bromatum, int. 1·0 vor oder sofort nach dem Essen bei nervös. Erbr. *(10=40).* — **St. lacticum**, int. 0·3—0·6 p. d., 3·0 p. die *(10 - 50).* — **St. salicylic.**, int. 0·3-0·9 m. tgl.

* **Strophanti hispidi** u. **Kombé Sem.** zu *°† **Tinct. Stroph.** (1:20), 5-15 Tpf. p. d. 2- bis 4m. t. ad 40! Tpf. p. die in Mixtur, Tabl *(1=3).*

Strophantinum 0·0001—0·0005 p. d. 1-2m. t. ad 0·001-0·002 p. die in alk.-wäss. Lös. o. Pillen *(0·01=5).*

*†° **Strychnos Nux vomica** (Semen Strychni) 0·03 bis 0·12! p. d. ad 0·5! p. die (P. G. 0·1! p. d. ad 0·2! p. d.) in Pulv. *(1=2).* — *†° **Ext. N. v. spirit.** (Ext. Strychni) 0·01 bis 0·05! p. d. ad 0·15! p. die in Pulv., Pill., Mixt. (1=28). — **Extr. N. v. aquos.** in 2—4mal gröss. Dosen (0·2! p. d. ad 0·6 p. die). — *†° **Tct. N.** (T. Strychni) 0·1— ad 3·0! p. die (P

1·0! p. d. ad 2·0! p. d.); ext. zu Einreib. *(10=12).* — **Tct. N. v. aetherea** ebenso. — **Strychninum purum** und ***† nitricum** 0·003—0·007! p. d. ad 0·02! p. die (Ph. G. 0·01! p. d.) in Pulv., Pill., alk. Lös., Glycerin; ext. in Lös., Salben (0·05—0·3 zu 10), enderm. Inject. (1% Lös.) 0·001—0·01 p. d. 1- bis 2m. t.) *(0·01=2).* — **Strychn. arsenicosum** (½% Lösung) subc. Inj. 0·001—0·004 p. d. — **Strychnin. acet.** *(0·01=2)* u. **Strychn. sulfur.** *(0·01=2)*, ebs. wie Strychn. nitric.

Stypticin, Cotarninum hydrochloricum. 0·05, 5—6m. tgl. in Pulvern od. Gelatinekapseln; subcutan zu 0·2 (b. Gebärmutterblut.) *(0·01=40).*

***° Styrax liquidus** (Balsam. Styrac., Ambra liquid.) 0·5—2·0 p. d. m. t. in Pill., alkoh. Lös.; zu Salb. *(10=10).* — **Linim. Styr.** (Styr. 3, Ol. Oliv. 6, Sp. Vin 1) geg. Krätze. — **Ungt. Styr. sulfur.** ebenso *(10=8).* — **Styr Calamitus** z. Räuch.

Succinum (Bernstein) als Streupulv. zu Räucher. *(10=10).* - **Ol. S.** 5–15 Tpf. p. d. m. t. in Pill., Kaps., äther. Lös.; zu Zahn-, Ohrtropfen, Einreibung. *(10=12).*

Sudol (3% Formaldehyd an Adeps lanae u. Glycerin gebunden mit Ol. Gaultheriae parfumirt). Als Crême und in wässeriger Lösung bei Hyperidrosis pedum und bei Tylositas manuum et pedum.

Sulfaminol. *Thioxydiphenylamin, gelbes,* unlösl. Pulv. *Antisept., wie Jodoform zu gelungen*

°Sulfonal. 1·0—3·0 in Pulv., Pastill., besser in heissem Wasser, Suppe, Thee vor Schlafengeh. (Hypnotic.) *(10=120).*

Sulfosotsyrup (Kreosotsulfosaures Kalium) Kaffeelöffelweise bei Tuberculosis pulmonum.

***° Sulfur subl.** *(10=2)* und ***S. s. depurat.** *(10=6);* **Flores S.** letzteres int. 0·3—1·0 p. d. m. t., als Lax. 2·0—8·0 in Pulvern, Trochisc. (à 0·18) Pill., Biss., Latw. u. Schüttelmixt.; ext. zu Kehlkopf-, Streu-, Schlundpulv., zu Gurgelw. (Emuls. 1·0 bis 2·0 : 100), Waschwässern, Räucher.; beide zu Salben (1 : 2–5). — **Mixt. sulf. acida** = Acid. Halleri. — *** Ung. sulf.** geg. Scabies, ebenso Ung. sulf. simpl. *(10=10).* — ***° Sulf. praecip.** (Lac sulfur.) in ½ so grosser Gab. wie S. sublimat. *(10=15).* — **Sulf. chlorat.** zu Pinslg. — **S. jodatum** 0·05—0·1 p. d. 2—4m. t. in Pill., Glycer.; ext. zu Salb. (1 : 10—15), Seif. *(1=20).*

Symphorol. Coffein sulfosäure, int. als Diureticum, 1·0 mehrm. tägl. *(1=48).*

Syzygium jambolanum zur Darstell. des **Extr. fl. S.** j. int. 1½ Esslöffel 3m. tgl. (Antidiabetic.) *(10=110).*

Syr. Diacodii s. Papaver. fruct.
— *** menthae** Corrig. *(10=8).*
— ***rororum** Corrig. *(10=6).*
— *** ribium** ebenso *(10=6).*
— *** senegae** ebenso *(10=10).*

Tabletten, comprim., haben den Zweck, eine trockene, sich echt schmeckende Arzneisubstanz, auf den möglichst kleinen Raum

zusammengepresst, verschreiben zu können.

Tabloid-Medicamente u. Präparate sind durch Comprendiosität, Handlichkeit, Dosirung u. s. w. für alle Medicationsarten und Anwendungsformen geeignete u. anwendbare Arzneizubereitungen.

Taka-Diastase, int. 0·2—0·3 in Pulv. (b. d. Mahlz.).

*° **Talcum praepar.** als Streu-, Zahnpv., Salb. *(100=20).*

° **Tamarindi Pulpa cruda** Dct. als kühlend. Getränk 25·0 bis 60·0 : 1000 Aq.; als Abführm. 8·0—50·0 : 100 bis 300 Aq. — *° **P. T. depurata** 25·0—60·0 p. d. m. t. pur od. in Lös., zu Mixt., Electuar., Molken; ext. zu Klystier *(10=10).*

Tanaceti Hb. 1·0—2·0 p. d. m. t. in Pulv., Latwerg., Inf. (10·0—30·0 : 100 bis 200). — **Flor. T.** ebenso — **Ol. T.** 1—2 Tpf. p. d. m. t. in alkohol. od. öligen Lös. zu Einreib. *(1=20).*

Tannal (Alum. tannicotart.) ext. als Streup., Gurgelw. (1%), Inhalat. (30%).

Tannalbin (Darmadstringens), int. 1·0 (bei Kindern 0·5) pro dos. 2—4m. tgl. in Pulv. *(10=130).*

Tannalborin aus Aluminiumoxyd, Acid. tannic. und Tetraborsäure; ext. mit Amyl. oder in 10—20%igen Salben; int. 0·05-1·0 mehrmals tägl. als Magendarmantisepticum *(1=20).*

Tannigenum, Diacetylgerbs. int. 0·2—0·5 p. d. m. t. in *Pulv. als Obstipans.* Ext. z. *Einblasen* in die Nase und d. Larynx *(1=20).*

Tannocol, aus Leim und *Tannin.* Int. 0·1 mehrmals tägl. als Darmantisepticum.

Tannoform. Secretionsbeschränkendes Wundheilmittel. Anwend. in Pulverform (bes. bei Hyperidrosis u. Bromidrosis) *(10=70).*

Tannon (Condensationsproduct des Tannin und des Hexamethylentetramin), int. 1·0 3—4m. tgl. (Kind. die Hälfte) *(1=25).*

Tannopin = Tannon.

Tanocol. Bei Reizungszuständen d. Darms, mehrmals tägl. 1 Grm.; Kindern die Hälfte *(1=14).*

Tanosal (Gerbsaur. Kreosot). Int. 3—6 Essl. tägl *(1 Fl.= 300).* Gegen Phthisis, Bronchitis und Asthma.

* **Taraxaci Fol.** *(100=22)* zu Spec., Suc. rec., Dct. (10·0 bis 15·0 : 100) — **Hb.** u. ***Rad. T. eb.** *(10=3).* — *° **Extr. T.** 10·0—30·0 p. d. *(10=34).*

° **Tartarus boraxatus** 0·5—2·0 m. t. in Sol. (Diureticum) 5·0—7·5 (Laxans).

— ° **depur.** s. Kal. hydrotartaric.

— **natron.** s. Kal. natriotartaric.

— **stibiatus** s. Kal. stibiotartaric.

Taxi baccatae Fol. 0·1—0·5 p. d. m. t. in Pulv., Inf. (0·5—2·5 : 100—150 Col.). **Extr. T. b.** 0·05—0·3 p. d. m. t.

Terebenum (Antiseptic., Anticatarrh.) 4—20 Tpf. 4st.; ext. zu Inhalat. zerst. (50 Grm. p. Woche); Verbänden (1 : 20 Aq. von 4 b. 6 Tpf. steig. zu 20 Tpf. p. d. 3m. t.) (1=4).

*° **Terebinthina** (communis) ext. in Substanz; Constit. zu Pflastern, Salb. (1 : 3—100=14). — * **T. veneta** (Venetian. Terp.) 0·3—1·0

m. t. in Pill., Biss. Emuls., Latwerg.; ext. zu Cerat., Pflast., Salb., Liniment., Klyst. (2·0—0·8 p. clysm.), Inj. (1·0–4·0:100) *(10=5)*.— **Tereb. cocta** ebs. *(100=30)*. — °**Colophon.** nur ext. als Streupulv., blutstill. M. (C. + Gummi Arabic. + Alaun aa.). zu Pflast., Pasten *(10=2)*. — °**Oleum T.** *(100=28)*. °**Ol. T. rectificat.** *(10=4)*. — **Sapo T.** zu Einreib. und Wasch. — °**Ung. T. u. Ung. T. compos.** zu Verbänden (bes. bei Frostb.) u. Salb. *(10=8)*.

Terpinolum (Anticatarrhoic.) 0·1 p. d. 0·5—1·0! p. die in Kaps. *(1=4)*.

Terpinum hydratum 0·2—0·4 p. d. ad 1·0 p. die in Pulv. Pill., Kaps., Mixt. *(1=3)*.

Terralin, Salbengrundlage *(10=20)*.

Tetanusantitoxin kommt in 2 Formen im Handel vor; 1. trockenes Präparat, davon 5 Grm. in 45 Ccm. Wasser; 2. flüssiges Präparat, davon 0·5—5·0. Das 1. bei ausgebrochenem Tetanus, d. 2. prophylakt.

Tetronal, Hypnotic., 1·0—2·0 v. d. Schlafengeh. in heiss. Thee, Milch etc. *(1=90)*.

Teucrin (Extract. Teucrii scordii), 3 Ccm. subcutan inf. als Stomachicum.

°**Thallinum, Th. sulf.** *(1=80)*.— **Th. tartaric.** *(1=70)*. — **Th. tannic.** 0·05—0·12—0·25, als Antipyretic. bis 1·0—2·0 p. d. in wässerig. oder *weiniger. Lös., Pulver, Syr. cort. Aur., Pill.*, ext. *zu Inj. (1·0—2·0 : 100 Aq.), Bougies (1=60)*.

***Thapsiae Resina** wie ° ph.

***Theae Folia** *(Pec. ... 10=25)*.

Theobrominum cryst. puriss. Dimethylxanth. Diuretic. 0·5 m. tgl. in Pulvern; ebenso **Th. salicylicum** und **Theobrominlithium**. siehe Uropherin *(1=45)*.

Thermodinum (Antip.) 0·5 bis 0·7 p. die in Plv. *(1=40)*.

Thilanin. Salbenconst. Enth. 3% Schwefel. Bei Eczem *(10=26)*.

Thiocol (Orthoguajacol-sulfosaures Kalium), int. 1·5 bis 5·0 p. die in Pulver *(10=260)* oder in Form des **Sirolinum** (10% Thyocolorangen-yrup), int. 2—4 Theelöffel p. die.

Thioform (Antisept.) int. als Darmdesinf. 0·3 p. d. 4m. t. in Pulv., ext. als Streupulver *(1=22)*.

Thiolum liquidum, ext in 25- bis 30% Lösung, 5—20% Salbe, Paste, Seife, Gelatinleim, Pflaster *(10=55)*. — **siccum**, zu Streupulvern (pur) bei Intertrigo und bei Verbrennungen 2. u. 3. Grades *(1=18)*.

Thiosinamin, subcut. in 15% alkohol. Lösung, 1/5 bis 1 Pravaz'sche Spritze 2m. wöchentlich *(1=25)*.

Thujae Frondes nur ext. als Streupulv. — **Tct. Th.** zu Pinsel. und Einreibung. *(10=8)*.

Thymacetinum (Sedativ.) int. 0·25—1·0 in Pulv.

°**Thymi Hb.** *(10=5)* u. °**Ol. Th.** wie Hb. und Ol. Serpylli *(1=8)*.

*°**Thymolum** 0·05—0·1 p. d. m. t. (Antifermentativ.) 1·0 bis 2·0! p. d. (Antifebril. u. Gelenksrheum.) in Pulv., alkohol. u. alkal. Lös., Emuls.; ex

salicylic. *(1=12)*. — **Natr. thymol** u. **Thymoxol** ebenso.

Thyraden (Schilddr.-Präp.), int. 1·0—5·0 p. die *(1=40)*.

Thyreoantitoxin, int. 0·02 p. d., 0·12 p. die.

Thyrojodin, s. Jodothyrin.

*°**Tiliae Flor.** wie Flor. Sambuci *(10=5)*.

*°**Tinct. amara** 20—60 Tpf. p. d. m. t. *(10=10)*.

°**T. aromatica** (Cort. Cinnam. Cass. 5, Rhiz. Zingib. 2, Fruct. Cardam. min., Caryoph., Rhiz.-Galang. aa. 1 : 50 Spirit. dilut.) ebenso *(10=8)*. — **T. aromatica acida** (Mynsicht'sches Elixir) 10—30 Tpf. pur oder in Mixt. *(10=10)*.

Tolypyrinum (Antipyr., Antirheum.), 1·0 m. t. in Plv. bis 4·0 *(1=36)*.

Tolysalum, Tolypyrinsalicylat (Antipyr.), 1·0—2·0 p. d., 4·0—5·0 p. die in Oblaten *(1=36)*.

°**Tormentillae Rhizom.** 0·5 b. 2·0 p. d. m. t. in Pulv., Dct. (5·0—20·0 : 100); ext. als Streupulv., in Dct. zu Mund-, Gurgelw., Inject., Umschläg., Wasch. *(100=40, pulv. 10=10)*.

Toxicodendri Fol. 0·03—0·5! p. d. ad 1·2! p. die in Pulv., Pill., Inf. (0·5—2·5 : 100 Col.). — **Extr. T.** 0·05 p. d. ad 0·2 p. die in Pill., Lös., Mixt. — **Tct. T.** 5—30 Tpf., 1·0 p. d. ad 3·0 p. die pur; in Mixt., Syrup.

°**Tragacantha** (Gummi) 1·0 bis 4·0 p. d. in Pulv.; als Emulg., Constit. f. Pill. u. Trochisc. *(10=20)*. — ***Mucilago T.*** (1 : 20—50).

Traumaticinum s. Guttaperch. *(10=32)*.

Traumatol (Jodkresol) ext. als Streupulver, 5—10% ge Traumatol-Zink-Pasten, 10%ige Salben m. Lanolin u. Vasel., 10—50%ig. Traumatol-Chlorof., 10%iges Traumatol-Collod. *(1=20)*.

*°**Trifolii fibrini Fol.** wie Hb. Centaur. minor. *(100 = 28)*. — *° **Extr. T.** wie Extr. Centaur. *(10=36)*.

Trikresol, Desinf. wie Lysol, s. d. *(10=25)*.

Trimethylaminum s. Propylam. *(1=6)*.

Trional (Hypnot.) 1·0—2·0 in heisser Milch, Wein oder Thee unmittelbar v. dem Schlafengehen *(10=250)*.

Triphenin (Propionyl-p-Phenetidin) 0·3—0·5 p. d. m. tgl. (Antipyr. u. Antineuralgicum) *(1=25)*.

Tritici Farina, — Furfur T. (Kleie) zu Grahambrot; zu Kataplasm., Kräuterkissen etc., in Dct. zu Klyst. u. Bädern.

Tritol. Gemische aus 3 Oel mit 1 Malzextract. Leicht resorbirbar. Dosirung wie jene d. entsprechend. Oele.

Tropacocainum hydrochlor. Ersatzm. d. Cocains. Anwendung wie dieses *(0·1=34)*.

Tropon, Eiweisspräparat, esslöffelw. *(100=120)*.

Trypsinum wie Pancreatin *(0·1=20)*.

Tuberculin. Versuchsweise in Dosen von 0·00001 bis 0·0001. Tuberculin R **(TR)** wird steigend v. 1/500 Mgr. bis 20 Mgr. gegeben. **TO** entspricht dem alten Tuberculin. Die Wirkung der Tuberculine ist noch fraglich (1=300).

Tuberculocidin. Ebenso (1= 4400).

Tuberculinseife. Aeusserl. bei Lupus und scro lösen Hautaffection

Tupelo-Stifte, Quellstifte aus d. Holze v. Nyssa aquatic. *(1 St.=90).*

Tumenol. Salbenconst. für d. Eczemtherap, *(10=100).*

Turpethi Rad. und **Resina** wie bei Jalapa.

Tussolum, mandelsaur. Antipyrin, Antipyr. amygdalicum, 0·05—0·5, m tgl. in wässerig. Lös. *(1=30).*

Unguentum Autenriethi s. Kalium stib.-tartar. — °**U. basilicum** (Ol. olivar. 45, Cer. flav., Colophon., Sebi aa. 15, Terebinth. 10) für sich oder als Excipitant. für reizende Salb. *(10=6).* — °**U. cereum** (Cer. flav. 3, Ol. provinc. 7) Salbengrundlage. — **U. Credé** (enth. 15% Argent. colloidale, 10% Wachs, 75% Schweinefett und etwas Aether benzoatus) 3·0 für eine Einreibung (bei Sepsis) *(1=25).* — * **U. emolliens** (leniens) s. Cetaceum *(10=20).* — * **U. simpl.** s. Axungia *(10=8).* — °**U. aromaticum** (Hb. Absinth. 125, Spir. Vin. 250, Axung. Porc. 1000, Cer. flav. 250, Ol. Laur. 125, Ol. Junip., — Menth. crisp., — Rosm., — Lavand. aa. 10) *(10=10).* — **U. pomadinum** (Ax. Porc. 600, Aq. Rosar. q. s., Cer. alb. 150, Ol. Bergamott., Caryophyll. aa. 3).

Uranium nitricum, int. 0·3—0·9 3m. tgl. (bei Diabetes).

Urea pura (Harnstoff) int. in 5% wäss. Lös. in steigend. *Dosen von 10·0—20·0 und mehr p. die (10=70).*

Urethanum (Aeth.-Urethan, Hypnotic.) 0·5—1·0—2·0 b. 5·0 p. d. 1m. t. (4·0—5·0 als Antidot bei convuls. Giften) in Mixt., wäss. Lös., Kaps., Pill.; subc (30%) 0·20—0·25 p. d. 1 3m. t. *(1=12).*

Uriodin, int. 5·0—6·0 p. in wässer. Lös. *(10=*

Uropherinum benzoic. *(1=* u. **U. salicylic.** (Theobr.-n Lithium-Verb int. 8— die in wäss. Lös. *(1=*

Urosin. In Tablettenfo à 0·5 Chinasäure, 0·15 L citr., 0·3 Zucker. Int. 6 10 Stück bei harnsau Diathese.

Urotropin. Hexamethyler tram, harnsäurelös. M 1-1½ Gr p. d. i. Wass. *(1=*

Urticae Hb. als Succ. re 5·0—20·0 p. d. 1—3m. ext. d. Hb. als Rube

* °**Uvae Ursi Fol.** 0·5—3·0 m. t. in Pulv., Dct. (20 60·0 : 100—200 Col.), S *(100=28).*

Vaginal-Tampons-Kapseln Gelatinebülle, versch dene Medicamente haltend; zum Selbst führen in die Vagina

* °**Valerianae Rad.** 0·5— p. d. in Pulv. Latwe Inf. (5·0—15·0 : 100 Co ext. als Niesspulv., Klyst., i. Dct. *(10=4, p 10=8).* — **Aq. V.** *(10=4* **Extr. V.** 0·5—1·0 p. d. Pill., Mixt.; **ext. zu Kl** *(1=6).* — * **Oleum V.** 1 4 Tpf. p. d. m. t. *(1=14)* * °**Tct. V.** 20—50 Tpf. p m. t. *(10=8).* — °**Tct aetherea** *(10=12)* u. **am niat.** 10—30 Tpf. p. d. m

Validol, Valeriansäure Menthol, statt Menthol wie dieses zu gebrauch int. in Tropfen od Kapseln (10=250).

Vanadin gegen Lungen culose empfohlen.

***Vanilla Fruct.** 0·05–0·6 p. d. m. t. in Pulv., Pill.; Inf. (3·0–10·0 : 100–200 Col.); Consperg., Corrig.; Kaum. *(1=24).* — ***Tct. V.** 30–60 Trpf. p. d. m. t. Corrig. *(1=5).* — **V. sacch.** (Elaeosacch. V. 1 : 30 Sacchar.) Corrig. und Consperg. — **Vanillinum** 0·01 b. 0·02 p. d. 1–2m. t. in Pulver, Pillen, Mixt. (0·5 zu 100–200), Sacchar. (1 zu 100; Sacchar. vaniliat.) *(0·1=5).*

***Vaselinum** s. Paraff. *(10=6).*

Vasogen, Salbengrundlage *(10=50).*

***Veratri albi Rad.** (Rhiz.) 0·3–0·15–0·3! p. d. ad 1·2! p. die in Pulv., Pill.; Inf., Dct., Macerat. (0·3 bis 1·5 : 100—200 Col.); ext. Streu-, Schnupfpulv. (0·05–0·1 pur o. m. and. Mitt.), in Inf., Dct., Macerat. z. Waschwäss., Umschläg., Einreib., Salb. (1 : 5–10). — ***°Tct. V. alb.** 3–10 Tpf., 0·50! p. d. ad 1·5! (4·0!) p. die in schleim. Vehikeln; ext. z. Pinsel. *(10=12).* — **Rad. V. virid.** und **Tct. V. a.** ebenso. — ***°† Veratrinum** 0·0015 bis 0·003 bis 0·005! p. d. ad 0·02! p. die in Pill., Pulv., Trochisc. (à 0·0015), alkohol. Lös.; zu Einreib. in alk. Lös. (0·1–0·5 : 10), Salb. ebenso *(0·1=6).*

Veratrol, int. 2 Trpf. m. tgl. in Kapseln; ext. in Salben (10%)

***°Verbasci Flor.** *(10=12)* und *Fol.* wie *Flor.* u. Fol. Malv.

Verbenae Hb. (Amar. mucilaginos.) **Inf.** (10·0–20·0 z. 200—300 Col.) *(10=5).*

Veronicae Hb. *(10=3)* ebenso.

Viburni prunifolii Cort. als **Extr. fluid.** 2·0–5·0 p. d. 1–4m. t. *(10=20).*

Vinum. — **Vinum Malacense, Xerense, Tokayense, generosum album et rubrum** (Weiss- u. Rothwein etc.) enth. 3–20% Alkohol; theel.- bis gläserweise, in Tpf.; Excip. u. Constit. (meist zu Maceration); ext. zu Mund-, Gurgelwäss., Einreib., Umschläg., Wasch., Bädern, Kataplasm., Inject., Klystier. etc.

***°Violae tricoloris Hb.** (H. Jaceae) 1·0–5·0 p. d. m. t. in Pulv., Inf., Dct. (10·0 bis 15·0 : 100 Col.), Succ. recens; ext. in Inf. zu Umschl., Bäd. *(100=32).*

Visci albi Stipit. 1·0—4·0 p. d. m. t. in Pulv., Schüttelmixt.; Inf., Dct. (5·0 bis 15·0 : 100 Col.).

Xeroform s. Bismuthum tribromphenylic. *(10=110).*

Xylolum 5–20 Tpf.; 2·0! p. d. ad 3·0 p. d. in Kaps., schleim. Vehikeln *(10=8).*

***°Zedoariae Rad.** (Rhizom) wie Rad. Zingiber *(10=8).*

Zincum aceticum 0·03—0·05! (0·3!) p. d. ad 0·3! p. die (Rademacher gibt als Brechm. 0·5—1·2 p. d. in Pill., Lös.); zu Augenw. (0·01—0·05 : 10), Gurgelw. (0·5—1·0 : 100), Mund-, Verband-, Waschwäss. (1·0 b. 5·0 : 100), Inject. (in d. Urethra 0·25—1·0 : 100, ins Ohr 2·0—4·0 : 100), Salb. (1 : 10—20) *(1=2).*

***°Z. chloratum** 0·003—0·015! p. d. ad 0·1 p. die in wäss. od. ätherr. Lös., Pill.; ext. in Substanz als Zahnm.; in Aetzstiften (pur od. mit Salpeter), Aetzpast. (Z. chlorat.

Mehl in verschied. Verhält., auch in Pulv. rad. Althaeae; mit, meist ohne Liq. Stibii chlorat.); in Lös. zu Augenwäss. (0·03 bis 0·05 : 100), Pinsel. d. Pharynx u. Larynx (0·1 b. 1·0 : 25), Verbandwäss. (0·1—0·3 : 25 mit od. ohne Zusatz v. 1 - 2 Tpf. Salzsäure), Waschw. (0·3—0·6 zu 100 Aq. + 0·25 Salzsäure), Inject. (in d. Urethra 0·2—0·5 : 100), zu subcut. Inj. (10%; 3—9 Inj. i. Interv. v. 5—7 Tag.) *(10=14).* - **Pasta Canquoini** siehe oben (1. Chlorzink + Mehl; 2. 1 Chlorzink + 2 Mehl; 3. 1 Chlorzink + 3 Mehl; 4. Chlorzink + Liq. Stib. chlorat. aa. 1 + Mehl 1½). — **Liq. Landolfi** s. Aurum chlorat. (Zinc. Aur. Stib., Brom., chlorat. aa. 1 + Farin. Tritic.). — **Liq. antiseptic. Burnetti** (zur Desinfect. v. Krankenzimm.) 1 Chlorzink zu 2 Aq.

Zincum cyanatum 0·005! p. d. ad 0·012! p. die (0·005 bis 0·015 steigend bis 0·03 p. d. 1—4m. t.) in Pulv., Pillen; zu Augensalben (0·1 zu 10) *(0·01=2).* — **Z. ferrocyanat.** 0·03—0·15 m. t. in Pulvern, Pillen; zu Augenwässern (0·5:25) *(1=4).*

— *° **oxycatum (purum)** 0·05 bis 0·5 p. d. ad 2·0 p. die in Pulv., Pill., Trochisc. (à 0·03), Schüttelmixtur.; *ext. s. Strenpulv.*, Augenpulver *(1 : 1—5 Sacchar.), insufflat., Augenwässern (0·2—1·0 : 25), Salben (0·5 bis 3·0 : 10), Linimenten, Supposit. (1 : 5)* etc. *(10=10).* — **Z. oxyd. crudum** nur ext., wie vorhe

*°**Ungt. Zinci oxyd.** *(10=*

Z. phosphoratum 0·001— p. d. 2—3m. t. in Pulvern *(0·1=3).*

— °**sulfo-carbolicum** nur zu Verbänd.; Umsch (1 : 100—200 Aq.), In (Urethra 0·05—1·0 : Vag. 0·1-1·0 : 100) *(10=*

— *°† **sulfuricum** 0·005— bis 0·05! (Ph. G. 1·0 d. ad 0·3 p. die als A und Nauseos ; 0·3—0 0·8! (auch 1·2!) p. d refract. dosi als Eme Schnupfpulver, Kehlk pulver (1 : 5—30 Sac Augenpulv. (1 : 5), Mu und Gurgelwasser (0 0·5 : 100), Pinsel. (0·1- zu 10), Inj. (0·2—2·5 : Foment. (3·0—10·0 : Waschung. (2·0—5·0 : Bädern, Salben (0·1- zu 100); als Caustic. Aetzstiften oder conc Lös. (1 : 2 Aq.) *(10=4. 6).* — * **Collyr. adst luteum** (1 : 100 Aq. + Sp + Amm. chlor., Kam Crocus.) *(10= 6).*

— **valerianicum** 0·03—0 p. d. ad 0·3! p. die Pulv., Pill. *(1=8).*

*° **Zingiberis Rad.** (Rhiz 0·3 bis 1·5 p. d. m. t. Pulv., Pillen, Trochi Latwerg., Macerat., (5·0—20·0 : 100—200 C in Confection.; ext. K mittel; Mund- u. Gur wasser (Inf. 10·0— zu 100), Zahntinct. *(1 10).* — °**Tct. Z.** 10—30 m. t.: zu Zahnmit *(10=10).*

Zinoi, aus Zinc. acet Alumnol.; in 3% bei Fluor al·bus.

8. Explosive und detonationsfähige Arzneimischungen.*)

Zusammengestellt von Prof. J. Nevinny.

1. Acid. chromicum mit oxydirend. und organ. Substanzen, namentl. Glycerin und äther. Oelen.
2. Acid. nitricum in folgender Zusammensetzung:
   a) Ac. n. + Acid. hydrochloric. + Tct. Nuc. Vomic. aa.
   b) Ac. n. + Acid. hydrochloric. aa. 10 + Tct. Cardam. 20·0.
3. Acid. picrinicum und ihre Salze mit fast allen Substanzen.
4. Ammoniak und Ammoniumsalze mit Jod etc.
5. Argentum nitricum.
6. Argentum oxydatum mit organ. und oxydirbaren Substanzen.
7. Bromum mit Alkohol, sonst wie Jod.
8. Calcaria chlorata mit Schwefel, Salmiak, Glycerin, äther. Oelen, Fetten und anderen organ. Subst.
9. Calcium hypophosphorosum (überhaupt Hypophosphite) mit Kal. chloric., jodic., permanganic., Chlorkalk etc.
10. Camphora.
11. Carbo.
12. Ferrum jodatum.
13. „ pulverat.
14. „ reductum.
15. Jodum mit 4., ammoniakhält. Flüssk., äth. Oelen etc.
16. Kalium bichromic.
17. Kalium chloricum mit Schwefel, metallisch. Pulv., Natrium subphosphoros., Kohle, Amylum, Gerbstoff, gerbstoffhältige Droguen, Zucker, organische Säuren, überhaupt mit leicht oxydirbaren Substanzen; auch die wässer. Lös. des K. chloric. mit Glyc., Alkoh., org. Säuren, Thymol etc.
18. Kalium jodicum, wie vorher.
19. „ nitricum.
20. Kalium permanganicum mit Schwefel, schwefelhältigen Subst., organ. Säuren u. ihren Salzen; auch die Lösung des K. permang. mit organ. Subst.
21. Kalium picrinicum wie Acid. picrinic.
22. Natrium chloricum wie Kal. chloric.
23. Nitroglycerinum.
24. Olea aetherea.
25. *Spiritus* Aetheris nitrosi mit Tinctur, alkohol. und äther. Flüssigkeit.

*) Dankenswerthe Zusammenstellungen, denen die vorliegende nommen ist, lieferten bereits früher Hager und Kobert.

26. **Schwefel u. Schwefelverbindungen** besonders n
Terpentinöl etc.

Ueberhaupt sind solche Substanzen, welche leic
oxydirt oder desoxydirt werden können, nicht mit ei
ander zu verbinden, oder aber es ist bei ihrer Vermischu
grosse Vorsicht zu beachten.

---

9. Approximative Berechnung des Inhalte der üblichen Löffel.

1 Kaffeelöffel	Flüssigkeit	=	3·0— 5·0	Gran
1 „	Salze, Zucker, Schwefel	=	2·5— 5·0	„
1 „	Metalloxyde	=	3·0 - 5·0	„
1 „	gemischtes Pulver	=	etwa 2·5	„
1 Kinderlöffel	Flüssigkeit	=	6·0— 7·0	„
1 Esslöffel		=	12·0—15·0	„

---

10. Die wichtigsten Nährpräparate.

A. *Eiweisspräparate* (aus Fleisch hergestell

I. Fleischextracte und verwandte Präparate.

a) **Liebig's Fleischextract** enthält die wasserlöslich
Fleischbestandtheile zur teigigen Consistenz eingedickt als Zusa
zu Suppen (ca. $^1/_2$ Theelöffel auf einen Teller) und ander
Speisen. Aehnlich Kemmerich's Fleischextract u. a.

b) **„Puro"** Fleischsaft (succus carnis express). Dreifach c
centrirter Saft aus rohem Ochsenmuskelfleisch. Hervorragend
blutbildendes Kräftigungs- und Ernährungsmittel. Erwachsen
3—4mal pro die ein Löffel in Suppe, Süsswein, Milch e
Kinder die Hälfte.

c) **Karno.** 1—2 Theelöffel auf eine Tasse Wasser zur H
stellung von Fleischsuppe. Von ähnlicher Wirkung das en
lische Präparat »fluid meat« und die amerikanischen Präpara
»Wyeters Beefjuice« und »Valentines meat juice«, welche al
relativ viel theurer sind.

II. Albumosen und Peptone.

a) Eucasin, wasserlösliche Casein-Ammoniakverbindun
gut resorbirbares Präparat für Kranke und Reconvalescente
weisses, fast geschmackloses und geruchloses Pulver; 2 Th
löffel auf $^1/_4$ Liter Milch oder 1 Teller Suppe; auch zu G
müsen, Cacao, Chocolade etc. zusetzbar: enthält 85–90% Eiwei

Globon. Eiweiss-Nahrmittel besonders für Bleichsüchtig
Blutarme, Magenkranke, Zuckerkranke, Gichtkranke, Kin
und Reconvalescenten.

Nutrose, wasserlösliche Casein-Natriumverbind
isses, fast geschmackloses und geruchloses Pulver, in
ziehung wie das Eucasin.

Plasmon (Siebold's Milcheiweiss), neues, aus Buttermilch gewonnenes, pulverförmiges Eiweisspräparat.

b) Die Peptonpräparate, meist aus Fleisch gewonnene Eiweisspräparate, welche zum grössten Theil nicht eigentlich reines Pepton, sondern Albumosen (Vorstufen des Peptons in der Eiweissverdauung) enthalten. Zu nennen sind:

Antweiler's Albumosen-Pepton: esslöffelweise als Zusatz zu N-armen Nahrungsmitteln.

Nährstoff Heyden; als Zusatz zur gewöhnlichen Kost.

Kemmerich's Pepton; mit heissem Wasser als Brühe verrührt, angenehm schmeckend.

Somatose, geruch- und geschmacklos, in Wasser lösliches Pulver, in kleinen Dosen appetitanregend, bei Kindern bis 15 Gramm, bei Erwachsenen bis 30 Gramm täglich in Einzeldosen von 3—5 Gramm; man löst erst in heissem Wasser und gibt die Lösung als Zusatz zu Milch, Kaffee, Cacao, Bouillon, Schleimsuppen. Auch als Eisensomatose in Verbindung mit Fe-Präparaten erhältlich.

Sanose; weisses, geruch- und geschmackloses Pulver, am besten als Zusatz zu Milch, Cacao und Leguminosensuppen gegeben (5 Gramm auf eine Tasse, resp. Teller).

Sanatogen; weisses Pulver, fast ohne Geschmack und Geruch, in Wasser löslich, am besten als Zusatz zu Milch, Cacao, Bouillon. Es wird von einer Reihe neuerer Autoren als eines der wirksamsten Kräftigungsmittel für Reconvalescenten, nervöse Individuen und Geisteskranke mit Depressionszuständen, neuestens auch von verlässlicher Seite als wirksam bei Rachitis empfohlen.

Tropon; billiges, pulverförmiges Eiweisspräparat, mit Milch und Bouillon aufzukochen, ferner als Zusatz zu Backwaaren mehrfach benutzt (Troponcakes, Troponzwieback etc.).

B. Aus Vegetabilien hergestellte Präparate.

a) **Mehlpräparate:**

Hartenstein's Leguminosenmehle; in verschiedenen Zusammensetzungen in den Handel gebracht.

Knorr's Mehle (Hafermehl, Reismehl, Gerstenmehl, Hafergrütze, Tapioca, Bohnenmehl, Erbsenmehl, Linsenmehl).

Kindermehle; Mehlpräparate, deren Kohlehydrate in grossem Procentsatze aufgeschlossen sind. Meist unter Zusatz von Milch bereitet:

Kufeke's Kindermehl.

Lötlund's Zwiebackmehl.

Nestle's Kindermehl.

Theinhardt's lösliche Kindernahrung, aus Kuhmilch, deren Eiweissstoffe durch ein Pflanzenferment leicht verdaulich gemacht sind, und aus Weizenmehl, dessen Stärkekörner durch Diastaseferment zum Quellen gebracht sind, bestehend: enthält Wasser 5·0, Eiweiss 16·5, Fett 3·5, Kohlehydrate 74·6, davon löslich 57·1.

Aleuronat; aus Weizen oder Maiskleber hergestelltes Mehl von hohem Eiweissgehalt, enthält circa 88% Eiweiss, 7% Kohlehydrate, 0·25% Fett, 0·5% Cellulose, 7% Wasser; vorzugsweise zur Herstellung von Brotersatzmitteln für Diabetiker.

b) Die **Cacaopräparate**: Hafercacao, Hygiama (von Dr. Theinhardt, aus Weizenmehl und Cacao bestenend), Eichelcacao, Kraftchocolade.

Malzextract.

C. Fettpräparate.

Lipanin. Aus 94 Theilen Speiseöl und 6 Theilen Oelsäure hergestellt: als Ersatz des Leberthrans. Esslöffelweise.

D. Gemischte Präparate.

a) **Milchpräparate.**

Backhaus' Milch, ein Präparat, in welchem der schwer lösliche und schwer verdauliche Käsestoff der Kuhmilch durch Fermentwirkung in eine löslichere Form übergeführt ist. Vor dem Gebrauche werden die Flaschen leicht gewärmt, indem man sie in warmes Wasser stellt. Es gibt 3 Sorten; Fettgehalt 3·1—3·3%, Milchzucker bezw. 6·0, 5·4, 4·8%; Casein, bezw. 0·6, 1·8, 3·0%; Albumin bezw. 1·0, 0·3, 0·5%; Salze 0·4—0·7%.

Dr. Lahmann's vegetabile Milch, aus Nüssen und Mandeln hergestellt, enthält Eiweiss 10% (meist Pflanzeneiweiss), Fett 25%, Zucker 38·5%, Salze 1·5%, Zusatz zur Kuhmilch; man verdünnt die aufgekochte Thiermilch nach dem Lebensalter in verschiedenem Verhältniss mit aufgekochtem Wasser; in dem Wasser (und vom 10. Monat an in der Milch allein) löst man vorher einen gestrichenen Kaffeelöffel condensirter vegetabiler Milch.

Gärtner'sche Fettmilch, durch genau geregeltes Centrifugiren der Kuhmilch hergestellt, wodurch ein der Frauenmilch entsprechender Fettgehalt und Reduction der Eiweissstoffe und Salze auf die Hälfte erzielt wird. Durch hierauf erfolgenden Zusatz von Milchzucker erhält man ein Präparat folgender Zusammensetzung: 3·1% Fett, 1·7% Eiweissstoffe, 6·8% Milchzucker, 0·37% Salze.

Kefir und Kumys sind Flüssigkeiten, welche durch Einfluss von Gährungserregern auf Kuh-, bezw. Stutenmilch entstehen, wodurch ein Theil des Milchzuckers in Alkohol und Kohlensäure übergeht. Kefir enthält im Durchschnitt 1·6% Milchzucker, 0·9% Milchsäure und 2·1% Alkohol. Als Milchersatz zur Hebung des Ernährungszustandes, wo Milch nicht genommen wird.

b) **Andere Nährpräparate.**

Alcarnose, ein neues Nährpräparat, nach **Hiller** *(Breslau) dargestellt, bildet* eine zäh-syrupöse Paste, welche in *Dosen zu 12 Gramm in* Gelatinekapseln in den Handel kommt. *Das Präparat enthält* 28·8% Albumose, 2·3% Fleischextractstoffe, 67·1% lösliche Kohlehydrate (Dextrin und Maltose). T

Kapsel wird in etwa dem 10fachen von warmem Wasser, Kaffee, Weinsuppe etc. aufgelöst; täglich 10—15 Kapseln. Die bisherigen Berichte sprechen für die Verwendbarkeit des Präparates am Krankenbett.

Eulactol, feines, weissliches, trockenes Pulver, aus der Milch gewonnen, mit Zusatz von Eiweiss und Kohlehydraten; wohlschmeckendes Präparat; als Zusatz von Milch, Suppen etc. zu verwenden.

11. Sterblichkeit u. mittlere Lebensdauer.

1. Mortalität.

Nach der Sterblichkeitstafel von Süssmilch-Baumann erreichen von 1000 Lebenden

750	532	491	439	374	300	210	112	37	6	0	ein Alter von
1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Jahren

2. Mittlere Lebensdauer.

Es beträgt die mittlere Lebensdauer eines

1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	jährigen
36·8	41·9	35·0	28·6	22·6	16·9	12·1	8·2	5·5	3·0	0	Jahre

12. Maximaldosen für Erwachsene,

welche nach der neuen österreichischen Pharmacopöe (1890), auf Grund der Zusätze zur 7. Ausgabe der ö. Ph., sowie nach der neuen deutschen Pharmacopöe (1890) zum innerlichen Gebrauch nicht überschritten werden dürfen, ohne dass der Arzt ein (!) hinzufügt.

	Ph. austr.		Ph. germ.	
	p. dosi	p. die	p. dosi	p. die
Acetanilidum (Antifebrinum)	0·5	2·0	0·5	4·0
Acidum arsenicosum	0·005	0·02	0·005	0·02
„ carbolicum	0·1	0·5	0·1	0·5
Agaricinum	—	—	0·1	—
Amylenum hydratum . . .	—	—	4·0	—

	Ph. austr.		Ph. germ	
	p.dosi	p.die	p.dosi	p.d
Antipyrin	2·0	6·0	—	—
Antipyrinum salicylicum	2·0	6·0	—	—
„ Coffeino-citric.	1·5	3·0	—	—
Apomorphin. hydrochloricum	0·01	0·05	0·02	0·
Aqua amygdalar. amar.	1·5	5·0	2·0	8·
„ laurocerasi	1·5	5·0	—	—
Argentum nitricum	0·03	0·2	0·03	0·
Atropinum sulfuricum	0·001	0·003	0·001	0·
Auro-Natrium chloratum	—	—	0·05	0·
Cantharides	0·05	0·2	0·05	0·
Chloralum formamidatum	—	—	4·0	8·
Chloralum hydratum	3·0	6·0	3·0	6·
Chloroformium	0·5	1·0	0·5	1·
Cocainum hydrochloricum	0·1	0·3	0·05	0·
Codeinum hydrochloricum	0·05	0·3	—	—
Codeinum phosphoricum	—	—	0·1	0·
Coffeinum	0·2	0·6	0·5	1·
Coffeinum Natrio-benzoicum	0·5	1·5	1·0	3·
Cuprum sulfuric. qua emetic.	0·4	—	1·0	—
Extractum aconiti radicis	0·03	0·12	—	—
„ belladonnae foliorum	0·05	0·2	0·05	0·
„ cannabis indicae	0·1	0·3	—	—
„ colocynthidis	0·05	0·2	0·05	0·
„ conii herbae	0·2	0·6	—	—
„ hyoscyami foliorum	0·1	0·5	0·2	1·
„ opii	0·1	0·4	0·15	0·
„ scillae	0·2	1·0	—	—
„ secalis corn.	0·5	1·5	—	—
„ secalis corn. fluidum	1·0	3·0	—	—
„ strychni	0·05	0·15	0·05	0·
Folia belladonnae	0·2	0·6	0·2	1·
„ digitalis	0·2	0·6	0·2	1·
„ hyoscyami	0·3	1·0	0·5	1·
„ stramonii	0·3	1·0	0·2	1·
Fructus colocynthidis	0·3	1·0	0·5	1·
Gutti	—	—	0·5	1·
Herba conii	0·3	2·0	0·5	2·
Homatropin. hydrobrom.	—	—	0·001	0·
Hydrargyrum bichlorat. corr.	0·03	0·1	0·02	0·
„ *bijodatum* (*rubrum*)	0·03	0·1	0·02	0·
„ *cyanatum*	—	—	0·02	0·
„ *jodatum* (*flavum*)	0·05	0·2	—	—
„ *oxydatum* (*flavum*)	0·03	0·1	0·02	
Jodoformium	0·2	1·0	0·1	
Jodum	0·03	0·1	0·05	
Kreosotum	0·2	1·0	0·2	

	Ph. austr.		Ph. germ.	
	p.dosi	p.die	p.dosi	p.die
Lactucarium	0·3	1·0	—	—
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12	0·03	0·1
Oleum croton	0·05	0·1	0·05	0·1
Oleum phosphoratum	1·0	5·0	—	—
Opium	0·15	0·5	0·15	0·5
Paraldehydum	—	—	5·0	10·0
Phenacetinum	1·0	3·0	1·0	5·0
Phosphorus	0·001	0·005	0·001	0·005
Physostigminum salicylicum	0·001	0·003	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06	0·02	0·05
Plumbum aceticum	0·1	0·5	0·1	0·5
Radix aconiti	0·1	0·5	0·1	0·5
„ belladonnae	0·07	0·3	—	—
Resina Podophylli (Podophyll.)	0·05	0·2	—	—
Resorcin	0·5	3·0	—	—
Santoninum	0·1	0·3	0·1	0·5
Scopolaminum hydrobromic.	—	—	0·0005	0·002
Secale cornutum	1·0	5·0	—	—
Semen strychni	0·12	0·5	0·1	0·2
Solutio arsenicalis Fowleri (Ph. austr.)	0·5	2·0	0·5	2·0
Stibium kalio-tartaricum (Ph. austr.) — Tartarus stibiatus (Ph. germ.)	0·2	0·5	0·2	0·5
Strychninum nitricum	0·007	0·02	0·01	0·02
Sulfonal	2·0	—	2·0	4·0
Thallinum sulfuricum	—	—	0·5	1·5
Theobrominum natr. salicyl.	1·0	6·0	1·0	8·0
Tinctura aconiti radicis	0·50	1·5	0·5	2·0
„ belladonnae folior.	1·0	4·0	—	—
„ cantharidum	0·5	1·0	0·5	1·5
„ colchici	1·5	5·0	2·0	5·0
„ colocynthidis	—	—	1·0	5·0
„ digitalis	1·5	5·0	1·5	5·0
„ jodi	0·3	1·0	0·2	1·0
„ lobeliae	1·0	5·0	1·0	5·0
„ opii crocata	1·5	5·0	1·5	5·0
„ „ simplex	1·5	5·0	1·5	5·0
„ strophanti	0·5	2·0	0·5	2·0
„ strychni	1·0	3·0	1·0	2·0
Trional	2·0	—	—	—
Tuberа aconiti	—	—	0·1	0·5
***V**eratrinum*	0·005	0·02	0·005	0·02
Vinum colchici	1·50	5·0	2·0	5·0
Zincum sulf. qua emeticum	0·80	—	1·0	—

13. Maximaldosen für Erwachsene und Unerwachsene

nach der neuen österr. Pharmacopöe (Ed. VII, 1890) und der III. Ausgabe des Arzneibuches f. d. Deutsche Reich (Ph. G. Ed. III ex 1890) berechnet.

	Grösste Einzelgabe für							Zahl, mit welcher die Einzelgabe behufs Ermittelung der Tagesgabe zu multiplicieren ist
	Erwachsene	Unerwachsene im Alter von						
		17 Jahren	13 Jahren	10 Jahren	7 Jahren	4 Jahren	2 Jahren	
Acetanilidum	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**8**
Acid. arsenicosum	**0·005**	0·00375	0·0025	0·0012	0·001	0·0005	0·0002	**4**
Acid. carbolicum	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**5**
Agaricinum	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**5** |
Amylenum hydratum	**4·0**	3·0	2·0	1·0	0·8	0·4	0·16	**2**
Apomorph. hydrochlor.	**0·02**	0·015	0·01	0·005	0·004	0·002	0·0008	
Aqua Amygd. amar. (A. laurocer.)	**2·0**	1·5	1·0	0·5	0·4	0·2	0·08	**4**
Arg. nitricum	**0·03**	0·0225	0·015	0·0075	0·006	0·003	0·0012	**6·6**
Atrop. sulfuricum	**0·001**	0·00075	0·0005	0·0003	0·0002	0·0001	0·00004	**3**
Auro-Natrium chlorat.	**0·05**	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	**4**
Cantharides	**0·05**	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	**3**

Chloralum formamidat.	4·0	3·0	2·0	1·0	0·8	0·4	0·16	2
Chloralum hydrat.	3·0	2·25	1·5	0·75	0·6	0·3	0·12	2
Chloroformium	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	5
Cocain. hydrochlor.	0·05	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	3
Codein. phosphoric.	0·1	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	4
Coffeïnum	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	3
Cuprum sulfuricum	0·4	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	4
Extr. Belladonnae	0·05	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	3
Extr. Cannabis ind.	0·1	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	4
Extr. Colocynthidis	0·05	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	4
Extr. Conii herb.	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	3
Extr. Hyoscyami	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	5
Extr. Opii	0·15	0·1125	0·075	0·0375	0·03	0·015	0·006	3·3
Extr. Scillae	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	5
Extr. Secal. corn.	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·002	3
Extr. Strychni	0·05	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	5
Extr. Belladonnae	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	5
Folia Digitalis	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	5
Folia Hyoscyami	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	5
Folia Stramonii	0·2	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	5
Folia Colocynthidis	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	3
Folia	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	2
Fruct. Conii	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	4
Guttae Hyoscyami	0·5	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	3
Herba op. hydrobromic.	0·001	0·00075	0·0005	0·0003	0·0002	0·0001	0·00004	3
Herba op. bichlorat.	0·02	0·015	0·01	0·005	0·004	0·002	0·0008	5
Hydrarg.								

	Erwachsene	Grösste Einzelgabe für Unerwachsene im Alter von Jahren					Zahl, mit welcher die Einzelgabe bei täglicher Verabreichung multipliciert ist
		17	13	10	7	4	2	
Hydrarg. bijodat.	**0·02**	0·015	0·01	0·005	0·004	0·002	0·0008	**5**
Hydrarg. cyanat.	**0·02**	0·015	0·01	0·005	0·004	0·002	0·0008	**5**
Hydrarg. oxydat.	**0·02**	0·015	0·01	0·005	0·001	0·002	0·0008	**5**
Hydr. oxyd. via hum. par.	**0·02**	0·015	0·01	0·005	0·004	0·002	0·0008	**5**
Hyoscin. hydrobrom.	**0·0005**	0·00038	0·00025	0·00013	0·0001	0·00005	0·00002	**4**
Jodoformium	**0·2**	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	**5**
Jodum	**0·05**	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	**4**
Kreosotum	**0·2**	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	**5**
Lactucarium	**0·3**	0·225	0·15	0·075	0·06	0·03	0·012	**3·3**
Liquor Kalii arsenicosi	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**4**
Morphin. hydrochlor.	**0·03**	0·0225	0·015	0·0075	0·006	0·003	0·0012	**3·3**
Oleum Crotonis	**0·01**	0·0375	0·025	0·0125	0·01	0·005	0·002	**2**
Opium	**0·11**	0·1125	0·075	0·0375	0·03	0·015	0·006	**3·3**
Paraldehydum	**5·0**	3·75	2·5	1·25	1·0	0·5	0·2	**2**
Phenacetinum	**1·0**	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	**5**
Phosphorus	**0·001**	0·00075	0·0005	0·0003	0·0002	0·0001	0·00004	**5**
Physostigm. salicyl.	**0·001**	0·00075	0·0005	0·0003	0·0002	0·0001	0·00004	**3**

Pilocarpin. hydrochlor.	**0·02**	0·015	0·01	0·005	0·004	0·002	0·0008	**2·5**
Plumbum aceticum	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**5**
Radix Aconiti	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**5**
Radix Belladonnae	**0·07**	0·052	0·035	0·018	0·015	0·007	0·003	**4**
Santoninum	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**5**
Semen Strychni	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**2**
Solutio arsenic. Fowleri	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**4**
Strychninum nitric.	**0·01**	0·0075	0·005	0·0025	0·002	0·001	0·0004	**2**
Sulfonalum	**4·0**	3·0	2·0	1·0	0·8	0·4	0·16	**2**
Tartarus stibiatus	**0·2**	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	**2·5**
Thallinum sulfuric.	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**3**
Tinctura Aconiti	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**4**
Tinctura Belladonnae	**1·0**	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	**4**
Tinctura Cantharid.	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**3**
Tinctura Colchici	**2·0**	1·5	1·0	0·5	0·4	0·2	0·08	**2·5**
Tinctura Colocynthid.	**1·0**	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	**5**
Tinctura Digitalis	**1·5**	1·125	0·75	0·375	0·3	0·15	0·06	**3·3**
Tinctura Jodi	**0·2**	0·15	0·1	0·05	0·04	0·02	0·008	**5**
Tinctura Lobeliae	**1·0**	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	**5**
Tinctura Opii crocata	**1·5**	1·125	0·75	0·375	0·3	0·15	0·06	**3·3**
Tinctura Opii simplex	**1·5**	1·125	0·75	0·375	0·3	0·15	0·06	**3·3**
Tinctura Strophanthi	**0·5**	0·375	0·25	0·125	0·1	0·05	0·02	**4**
Tinctura Strychni	**1·0**	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	**2**
Tinctura Aconiti	**0·1**	0·075	0·05	0·025	0·02	0·01	0·004	**5**
Tubera Aconitinum	**0·005**	0·00375	0·0025	0·0012	0·001	0·0005	0·0002	**4**
Veratrinum Colchici	**2·0**	1·5	1·0	0·5	0·4	0·2	0·08	**2·5**
Vinum sulfuricum	**1·0**	0·75	0·5	0·25	0·2	0·1	0·04	—
Zincum								

(Ph. Ztg.)

14. Vergleichende Gewichtstabellen.

I. Tabelle zur Vergleichung des österr. Medicinal-Gewichtes mit dem metrischen Gewichte.

a) Metrisches Gewicht.

1 Kilogramm	(1000 Grm.)	= 1·7856	öst. Pfd. od.	57·14 Halbunzen.
1 Hektogramm	(100 Grm.)	= 0·1785		5·71 „
1 Dekagramm	(10 Grm.)	= 0·0178		0·57 „
1 Gramm	(1·0 Grm.)	= 13·71388	österr. Gran.	
1 Decigramm	(0·1 Grm.)	= 1·37	„	„
1 Centigramm	(0·01 Grm.)	= 0·13	„	„
1 Milligramm	(0·001 Grm.)	= 0·01	„	„

b) Oesterr. Medicinal-Gewicht.

1 Pfund	(12 Unzen)	= 420·014	Grammen
1 Unze	(8 Drchm.)	= 35·001	„
1 Halbunze	(4 Drchm.)	= 17·500	„
1 Drachme	(3 Scrup.)	= 4·375	„
1 Scrupel	(20 Gran)	= 1·458	„
1 Gran		= 0·0729188	„

II. Tabelle zur Vergleichung des österr. und metrischen Flüssigkeits- und Längenmasses.

1 Liter	(1000 Cub.-Centimeter)	=	0·7068	österr. Mass.
1 Deciliter	100 „	=	0·0706	„
1 Centiliter	10 „	=	0·0070	„
1 Milliliter	1 „	=	0·0007	„
1 Dekaliter	(10 Liter)	=	7·068	„
1 Hektoliter	100 „	=	70·682	„
1 Kiloliter	1000 „	=	706·822	„

1 österr. Mass	= 1·41478 Liter.	1 öst. Seidel	= 0·3537 Liter
1 Meter	= 3·1687 öst. Fuss.	1 Fuss	= 0·316 Meter.
1 Decimeter	= 0·3163 „	1 Zoll	= 0·026 „
1 Centimeter	= 0·3796 Zoll	1 Linie	= 0·00219 „
1 Millimeter	= 0·4552 „		

III. Umrechnungstabelle.

Laut Verordnung der Minist. des Innern u. des Handels vom 31. Dec. 1875 hat, im Falle Recepte zur Dispensation oder Berechnung kommen, in welchen das alte Medicinalgewicht angewendet erscheint, die Umrechnung in das metrische Gewicht nach folgender Tabelle zu geschehen:

	Grm.		Grm.		Grm.
1/3 Gran	= 0·02	7 Gran	= 0·50	1 Scrupel	= 1·50
1/2 „	= 0·04	8 „	= 0·55	1/2 Drachme	= 2·20
1 „	= 0·07	9 „	= 0·60	2 Scrupel	= 3·00
2 „	= 0·15	10 „	= 0·70	1 Drachme	= 4·50
3 „	= 0·20	12 „	= 0·90	2 Drachmen	= 9·0
4 „	= 0·30	14 „	= 1·00	3 Drachmen	= 13·7
5 „	= 0·35	16 „	= 1·10	1/2 Unze	= 17
6 „	= 0·40	18 „	= 1·25	1 Unze	= 3

IV. Tabelle zur Vergleichung des Verhältnisses des metrischen Gewichtes zum Medicinal-Gewicht.

Grm. = Gran	Grm. = Gran	Grm. = Gran	Grm. = Gran	Grm. = Gran
1 13·71	21 287·99	41 562·26	61 836·55	81 1110·82
2 27·42	22 301·70	42 575·98	62 850·26	82 1124·54
3 41·14	23 315·41	43 589·69	63 863·97	83 1138·25
4 54·85	24 329·13	44 603·41	64 877·69	84 1151·96
5 68·56	25 342·85	45 617·12	65 891·40	85 1165·68
6 82·28	26 356·56	46 630·84	66 905·12	86 1179·39
7 95·99	27 370·27	47 644·55	67 918·83	87 1193·11
8 109·71	28 383·98	48 658·27	68 932·54	88 1206·82
9 123·42	29 397·70	49 671·98	69 946·26	89 1220·53
10 137·13	30 411·41	50 685·69	70 959·97	90 1234·25
11 150·85	31 425·13	51 699·41	71 973·68	91 1247·96
12 164·45	32 438·84	52 713·12	72 987·40	92 1261·68
13 178·28	33 452·55	53 726·83	73 1001·11	93 1275·39
14 191·99	34 466·27	54 740·55	74 1014·83	94 1289·10
15 205·70	35 479·98	55 754·26	75 1028·54	95 1302·82
16 219·42	36 493·69	56 767·98	76 1042·25	96 1316·53
17 233·13	37 507·41	57 781·69	77 1055·97	97 1330·25
18 246·84	38 521·12	58 795·40	78 1069·68	98 1343·96
19 260·55	39 534·84	59 809·12	79 1083·39	99 1357·37
20 274·27	40 548·55	60 822·83	80 1097·11	100 1371·39

V. Tabelle zur Vergleichung des Medicinalgewichtes zum metrischen Gewichte.

öst. Gew.	= Grm.	öst. Gew.	= Grm.	öst. Gew.	= Grm.	öst. Gew.	= Grm.
1 Uz.	35·001	6 Dr.	26·250	1/12 Gr.	0·006	8 Gr.	0·583
2 „	70·002	7 „	30·625	1/10 „	0·007	9 „	0·656
3 „	105·003	8 „	35·001	1/9 „	0·008	10 „	0·729
4 „	140·004	1 Scr.	1·458	1/8 „	0·009	11 „	0·802
5 „	175·005	2 „	2·910	1/7 „	0·010	12 „	0·875
6 „	210·006	3 „	4·375	1/6 „	0·012	13 „	0·948
7 „	245·007	4 „	5·833	1/5 „	0·014	14 „	1·020
8 „	280·008	5 „	7·291	1/4 „	0·018	15 „	1·093
9 „	315·009	6 „	8·750	1/3 „	0·024	16 „	1·196
10 „	350·010	7 „	10·208	1/2 „	0·036	17 „	1·239
11 „	385·011	8 „	11·667	1 „	0·072	18 „	1·312
12 „	420·012	9 „	13·120	2 „	0·145	19 „	1·385
1 Dr.	4·375	10 „	14·583	3 „	0·218	20 „	1·458
2 „	8·750	11 „	16·042	4 „	0·291	30 „	2·187
3 „	13·125	12 „	17·500	5 „	0·364	40 „	2·916
4 „	17·500	1/16 Gr.	0·004	6 „	0·437	50 „	3·646
5 „	21·875	1/14 „	0·005	7 „	0·510	60 „	4·375

15. Längenwachsthum und Gewichtszunahme des gesunden Kindes.

Die durchschnittliche Körperlänge des neugeborenen Knaben beträgt 50 Cm., die des neugeborenen Mädchens 49 Cm.

Das Längenwachsthum gestaltet sich dann folgendermassen:

Alter des Kindes	Längenzunahme	Durchschn. Körperlänge
	Centimeter	Centimeter
1 Monat	4	54
2 Monate	3	57
3 »	2	59
4 »	1	60
Vom 5. Monate bis 1 Jahr .	9	69
Im 2. Jahre	9	78
» 3. »	7	85
» 4. »	6	91
» 5. »	6	97
» 6. »	6	103
» 7. »	6	109
» 8. »	6	115
» 9. »	6	121
» 10. »	6	127
» 11. »	6	133
» 12. »	6	139
» 13. »	6	145
» 14. »	6	151
» 15. »	6	157

Das durchschnittliche Körpergewicht des Neugeborenen ist 3200—3500 Gramm.

In den ersten 4 Tagen Gewichtsabnahme um $^1/_{14}$ bis $^1/_{15}$ des *ursprünglichen* Gewichtes, im Durchschnitte um 222 Gramm. Dann *bei normaler Ernährung* Ausgleichung des Gewichtsverlustes bis *zum achten Tage*, also am achten Tage das Körpergewicht so *gross wie am ersten*. Je geringer das ursprüngliche Gewicht, desto *langsamer das Schwinden* der Gewichtsabnahme.

Vom neunten Lebenstage an unter normalen Verhältnissen

Alter des Kindes	Tägliche Gewichtszunahme	Monatliche Gewichtszunahme	Durchschn. Körpergewicht
	Gramm	Gramm	Gramm
1 Monat . . .	25—35 (je nach dem ursprünglichen Körpergewicht)	750	4000
2 Monate . .	23—32	700	4700
3 » . .	22—28	650	5350
4 » . .	20—22	600	5950
5 » . .	18	550	6500
6 » . .	17	500	7000
7 » . .	15	450	7450
8 » . .	13	400	7850
9 » . .	12	350	8200
10 » . .	10	300	8500
11 » . .	8	250	8750
1 Jahr	6	200	8950—9000
2 Jahre . . .	—	—	11000

16. Körperlänge und Körpergewicht.

A. Körperlänge.

I. Des Erwachsenen:

a) des Mannes: 172 Centimeter
b) des Weibes: 160 »

II. In den einzelnen Lebensjahren:

	Männer Centimeter	Weiber Centimeter
Neugeborene	50	49
1 Jahr	69·8	69·0
2 Jahre	79·1	78·1
3 »	86·4	85·4
4 »	92·7	91·5
5 »	98·7	97·4
6 »	104·6	103·1
7 »	110·4	108·7
8 »	116·2	114·2
9 »	121·8	119·6
10 »	127·3	124·9
11 »	132·5	130·1
12 »	137·5	135·2
13 »	142·3	140·0
14 »	146·9	144·6
15 Jahre	151·3	148·8
16 »	155·4	152·1
17 »	159·4	154·6
18 »	163·0	156·3
19 »	165·5	157·0
20 »	167·0	157·4
25 »	168·2	157·8
30 »	168·6	158·0
40 »	168·6	158·0
50 »	168·6	158·0
60 »	167·6	157·1
70 »	166·0	155·6
80 »	163·6	153·4
90 »	161·0	151·0

B. Körpergewicht.

I. Des Erwachsenen:

a) des Mannes: 65 Kilogramm
b) des Weibes: 55 »

II. In den einzelnen Lebensjahren

	Männer Kilogramm	Weiber Kilogramm		Männer Kilogramm	Weiber Kilogramm
Neugeborene	3·1	3	15 Jahre	41·2	40
1 Jahr	9	8·6	16 »	45·4	43·5
2 Jahre	11	11	17 »	49·7	46·8
3 »	12·5	12·4	18 »	53·9	49·8
4 »	14	13·9	19 »	57·6	52·1
5 »	15·9	15·3	20 »	59·5	53·2
6 »	17·8	15·7	25 »	66·2	54·8
7 »	19·7	17·8	30 »	66·1	55·8
8 »	21·6	19·0	40 »	63·6	55·2
9 »	23·5	21·0	50 »	63·5	56·2
10 »	25·2	23·1	60 »	61·9	54·3
11 »	27	25·5	70 »	59·5	51·5
12 »	29	29	80 »	57·8	49·4
13 »	33·1	32·5	90 »	57·8	49·3
14 »	37·1	36·3			

17. Die normale Dentition.

Reihenfolge der Zähne nach der Zeit des Durchbruches	Zeit des Durchbruches
1. und 2. unterer Schneidezahn	6. bis 9. Monat
1. und 2. oberer Schneidezahn 3. und 4. oberer Schneidezahn	8. bis 10. Monat
1. und 2. oberer Backenzahn 3. und 4. unterer Schneidezahn 1. und 2. unterer Backenzahn	12. bis 15. Monat
1. und 2. oberer Eckzahn 1. und 2. unterer Eckzahn	18. bis 24. Monat
3. und 4. oberer Backenzahn 3. und 4. unterer Backenzahn	30. bis 36. Monat

(Die Reihenfolge ist nicht immer genau wie oben angegeben *indem manchmal die* oberen, manchmal die unteren Zähne der *selben Kategorie zuerst* durchbrechen.)

Beginn der zweiten Dentition (Durchbruch des dritten Back*zahnes) Ende des 5.* oder Anfang des 6. Jahres, im 7. J*usfallen*

18. Incubationsdauer infectiöser Krankheiten.

Abdominaltyphus 7—21 Tage.
Blattern 18 Tg. (selten weniger).
Cholera 2—12 Tage.
Diphtherie 2—8 Tage (am häufigsten 2 Tage).
Erysipel 1—8 Tage.
Febris recurrens 5—8 Tage (auch länger).
Flecktyphus 1—9 Tage.
Gonorrhoe 1—4, selbst 8 Tage.
Hydrophobie bis zu 60 Tagen und darüber.
Influenza 1—4, meist 3 od. 4 Tg.
Malaria 7—21 Tage.
Morbilli 8—18, am häufigsten 14 Tage.
Parotitis epid. 2—3 Wochen.
Rubeola 2—3 Wochen.
Scarlatina 1—8, zumeist 2 bis 4 Tage.
Syphilis 21 Tage (durchschnittl.).
Ulcus molle 48 Stunden.
Variolois 9—14, zumeist 12 Tge.

Die Diphtherie besitzt während der Incubationsperiode, des Anfalles und der Reconvalescenzdauer infective Eigenschaften. — Die Parotitis und die Rubeola zeigen sich von infectiver Natur 3—4 Tage vor dem Auftreten der Krankheit. — Die Contagion der Morbilli verschwindet sehr schnell und dauert bei den desinficirten Personen höchstens 3 Wochen an. — Der Typhus bleibt infectiver Natur von seinem Anbeginn bis 14 Tage nach Ablauf des fieberhaften Zustandes, während die Scarlatina ihre Infectionsfähigkeit bis nach der Beendigung des Desquamationsprocesses, bisweilen 8 Wochen hindurch, beibehält.

---

19. Anleitung zur Untersuchung von Se- und Excreten.

I. Harnuntersuchung.

1. Eiweiss.

a) **Kochprobe.** Man kocht den Harn in der Eprouvette und setzt dann einige Tropfen Essigsäure oder Salpetersäure zu. Bleibt eine beim Kochen entstandene Trübung bestehen oder entsteht sie erst beim Säurezusatz, so ist Eiweiss im Harne enthalten; hellt sich die beim Kochen entstandene Trübung nach dem Säurezusatz auf, dann war sie durch Phosphate bedingt.

b) **Spitalsprobe.** Man unterschichtet den Harn in einem schräge gehaltenen Becherglässchen mit concentrirter Salpetersäure; ist Eiweiss vorhanden, dann bildet sich an der Berührungsstelle der Flüssigkeiten eine ringförmige, dichte Trübung, ein etwas höher stehender Ring von mehr staubförmiger Beschaffenheit beruht auf der Ausscheidung von Uraten.

c) **Essigsäure-Ferrocyankaliumprobe.** Man mischt in der Eprouvette einige Cubikcentimeter 50%iger Essigsäure mit einigen Tropfen 5%iger Ferrocyankaliumlösung und schichtet den Harn darauf. Niederschlag oder, bei geringem Eiweissgehalte, leichte Trübung deuten auf Eiweissgehalt hin. Der durch Essigsäure allein entstandene Niederschlag beruht auf der Gegenwart von Mucin.

d) **Quantitative Bestimmung.** Mit dem Esbach'schen Albuminimeter, dessen Gebrauchsanweisung dem Apparate beiliegt.

2. Blut.

Die beste Reaction ist der mikroskopische Nachweis von Blutkörperchen oder deren Schatten im Harnsedimente.

3. Fett.

Eine bestehende Trübung verschwindet beim Schütteln mit Aether.

4. Traubenzucker.

a) **Trommer'sche Probe.** Man versetzt den eiweissfreien oder durch Erwärmen mit Essigsäure und Filtration enteiweissten Harn mit dem gleichen Volumen Natronlauge und setzt drei Tropfen einer 10%igen Kupfersulfatlösung zu. Entsteht ein Niederschlag, so ist sicher kein Zucker vorhanden. Bei Anwesenheit von Traubenzucker färbt sich die Lösung mehr oder weniger tiefblau. Nun erwärmt man den oberen Rand der Flüssigkeit auf etwa 70° C. Der Harn darf nicht zum Sieden erhitzt werden. Tritt innerhalb der Zeit von 2 Minuten ein gelbrother Niederschlag von Kupferoxydul auf, so ist Zucker vorhanden.

b) **Nylander'sche Probe.** Vom Nylander'schen Reagens (2 Gramm basisches Wismuthnitrat, 4 Gramm Seignettesalz in 100 Cubikcentimeter 8%iger Natronlauge) nimmt man 1 Cubikcentimeter auf etwa 3 Cubikcentimeter Wasser und 1 Cubikcentimeter Harn. Man erhitzt dann im Wasserbade eine halbe Stunde lang. Bei Anwesenheit von Zucker tritt Schwarzfärbung ein (metallisches Wismuth).

c) **Phenylglykosagon-Probe.** 10 Tropfen Phenylhydrazin und 10 Tropfen Eisessig oder eine Messerspitze salzsaures Phenylhydrazin und eine Messerspitze essigsaures Natrium werden zu 20 Cubikcentimeter Harn gesetzt und etwa 3/4 Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Bei Anwesenheit von Traubenzucker entsteht *ein gelber Niederschlag*, der mikroskopisch aus büschelförmigen *Nadeln von Phenylglykosazon* zusammengesetzt erscheint.

5. Gallenfarbstoff.

a) Der eiweissfreie Harn wird in der Eprouvette mit concentrirter *Salpetersäure* versetzt und rasch mit concentrirter *Schwefelsäure* unterschichtet. An den Grenzen der Flüssigkeiten

b) Zum Nachweise von Urobilin wird der Harn mit einer concentrirten alkoholischen Chlorzinklösung, die etwas Ammoniak enthält, geschüttelt und filtrirt. Im Filtrate ist grüne Fluorescenz nachweisbar.

6. Aceton.

Légal'sche Probe. Man versetzt den Harn mit 5 Tropfen einer frisch bereiteten 5%igen Lösung von Nitroprussidnatrium. Die Flüssigkeit wird roth. Bei Anwesenheit von Aceton bewirkt Essigsäurezusatz Purpurviolettfärbung.

7. Acetessigsäure.

Bei Gegenwart von Aceton (in solchen — diabetischen — Harnen immer vorhanden) und Acetessigsäure entsteht auf Zusatz von 3 Tropfen einer 5%igen Eisenchloridlösung eine bordeauxrothe Farbe.

8. Ehrlich'sche Diazoreaction.

Das Reagens: 1. Sulfanilsaures Natrium und 5 Cubikcentimeter reiner Salzsäure in 100 Cubikcentimeter Wasser;

2. eine 0·3%ige Lösung von Natrium nitrosum.

Man fügt zu 5 Cubikcentimeter der Sulfanilsäurelösung 1 bis 2 Tropfen Natrium nitrosum und 5 Cubikcentimeter eiweissfreien Harn. Wird dann mit Ammoniak alkalisch gemacht, so tritt beim Schütteln ein rothvioletter Saum auf.

9. Indican.

Jaffé'sche Probe. Man versetzt den Harn mit dem gleichen Volumen officineller Salzsäure und fügt dann tropfenweise unter Umschütteln und zeitweisem Abwarten Chlorkalklösung (Calcaria hypochlor. 5 : 100, filtrirt) hinzu. Wird der Harn erst grün, dann blau, so ist sehr viel Indican vorhanden; geringere Indicanmengen bewirken Blaufarbung, überaus grosse Mengen flockige Ausscheidungen von Indigoblau.

II. Untersuchung des Magensaftes.

Man gewinnt Magensaft, indem man eine Stunde nach Darreichung eines Probefrühstücks (ein Weissbrot und eine Tasse Thee) den Magen aushebert. De norma sind dann keine groben, unverdauten Massen mehr vorhanden.

1. Gesammtacidität.

Titration mit $^1/_{10}$ Normalnatronlauge. Indicator: Phenolphtalein.

2. Freie Salzsäure.

a) **Günzburg'sche Probe:** In ein Porzellanschälchen gibt man einen Tropfen einer 10%igen alkoholischen Phloroglucinlösung und einen Tropfen einer 5%igen Vanillinlösung dazu 2 Tropfen des unfiltrirten Magensaftes. Erhitzt man sodann über freier Flamme (unter Daraufblasen), so tritt intensive Rothfärbung auf.

b) **Congopapier** färbt sich — in den Magensaft getaucht — blau, nicht für HCl allein beweisend; auch durch andere Säuren, speciell Milchsäure, bewirkt; ebenso

c) **Tropaeolin** färbt sich mit freien Säuren rubinroth;

d) **Methylviolett** färbt sich (in stark verdünnter Lösung) blau.

3. Milchsäure.

Uffelmann'sche Probe. Man bereitet sich ein Reagens aus 10 Cubikcentimeter 5%igem Acid. carbol., 25 Cubikcentimeter Aq. destillat. und 2 Tropfen einer 5%igen Eisenchloridlösung. Diese blaue Mischung wird durch Milchsäure momentan zeisiggelb gefärbt.

4. Pepsin.

Zum salzsauren Mageninhalte bringt man ein Flöckchen Fibrin und lässt im Brutschranke oder im Wasserbade von 40° C. $^1/_2$ Stunde stehen. Bei Anwesenheit von Pepsin wird das Fibrin gelöst.

III. Nachweis von Tuberkelbacillen im Sputum.

Ein kleines Partikelchen aus eitrigen (käsigen) Antheilen des Sputums wird zwischen zwei Deckgläschen fein vertheilt, die Deckgläschen werden an der Luft trocknen gelassen und dann — das Sputumseite nach oben — 3mal rasch durch eine Flamme geführt.

Nach der Abkühlung tropft man auf das Deckgläschen 3—4 Tropfen von:

Fuchsin. 1·0,
Spirit. vin. 10·0,
Acid. carbol. 5·0,
Aq. destill. 100·0,

lässt 10 Minuten liegen, spült energisch im Wasser ab und trocknet zwischen Filtrirpapier. Nunmehr tropft man auf die Sputumseite:

Methylenblau 2·0,
Acid. sulfur. 25·0,
Aq. destillat. 100·0,

lässt die Farblösung nach 5 Minuten ablaufen, spült das Deckglas leicht mit Wasser ab und trocknet abermals zwischen Filtrirpapier. Die blaue Lösung muss nochmals aufgetropft werden, falls noch Rothes sichtbar ist; die Färbung ist gelungen, *wenn die ganze* Sputumschichte schwachblau aussieht. Die *trockene Deckgläschen* wird in Nelkenöl, Canadabalsam etc. eingebettet *und mikroskopisch* untersucht (Zeiss F, Reichert 7 *oder Oelimmersion mit* Condensor bei offener Blende). Die Tuberkelbacillen *sind roth,* Zellen und andere Bakterien blau ge-

20. Die Bade- und Curorte nach ihrer Charakteristik.

Alkalisch-muriatische Quellen:

Ems, Gleichenberg, Luhatschowitz, Niederselters, Offenbach, Tönnisstein, Weilbach.

Alkalisch-sulphatische Quellen:

Bertrich, Karlsbad in Böhmen, Marienbad in Böhmen, Rohitsch-Sauerbrunn, Tarasp-Schuls-Vulpera.

Bitterwässer:

Ober-Alap, Franz Josef Bitterwasser, Friedrichshall, Hunyadi János, Kissingen, Mergentheim, Ofen, Püllna, Saidschitz, Saratica, Sedlitz.

Einfache alkalische Quellen u. Lithion-Wässer:

Bilin, Cudowa, Fachingen, Fellach, Franzensbad, Geilnau, Giesshübl, Krondorf, Kronenquelle Salzbrunn, Ober-Salzbrunn, Preblau, Römerquelle, Salvator, Teinach, Vichy.

Eisenwässer:

Alexanderbad, Alexisbad, Antogast, Augustusbad, Bartfeld, Bocklet, Brückenau, Cudowa, Doberan, Driburg, Flinsberg, Franzensbad, Freienwalde, Freiersbach, Godesberg, Griesbach, Alt-Heide, Homburg, Imnau, König Otto-Bad bei Wiesau, Königswart, Langenau, Levico, Liebenstein, Liebwerda, Lobenstein, St. Moritz, Muskau, Pejoquelle, Petersthal, Polzin, Pyrawarth, Pyrmont, Reinerz, Rippoldsau, Roncegno, Sangerberg, Schandau, Schwalbach, Schwarzwald, Spaa, Steben, Sylt, Szliács, Tarasp.

Erdige Wässer:

Contréxeville, Inselbad, Leuk, Lippspringe, Neuenahr, Obladis (Tirol), Rappoltsweiler, Vittel, Weissenburg, Wildungen.

Glaubersalzwässer:

Balaton-Füred, Bertrich, Elster, Franzensbad, Karlsbad, Marienbad, Rohitsch-Sauerbrunn, Tarasp.

Einfache Kochsalzwässer:

Aibling, Arnstadt, Aussee, Baden-Baden, Berlin, Bourbonnes-Bains, Cannstatt, Colberg, Dürrheim, Frankenhausen, Greifswald, Schwäb.-Hall, Hall (Tirol), Hamm in Westfalen, Harzburg, Herzog Ludolfbad, Homburg, Hubertusbad, Ischl, Jaxtfeld, Kissingen, Königsborn, Kösen, Kronthal, Nauheim, Neuhaus, Niederbronn, Oeynhausen, Orb, Neu-Rakoczy, Reichenhall, Rheinfelden, Rosenheim, Rothenfelde, Salzhausen, Salzungen, Salzuffeln, Schmalkalden, Soden, Sooden, Suderode, Sulza, Systein, Traunstein, Werne, Wiesbaden, Wittekind.

Jod- und bromhaltige Kochsalzwässer:

Adelheidsquelle, Bex, Darkau (Oesterr.-Schlesien), Dürkhe
Elmen, Goczalkowitz, Hall (Oberösterr.), Inowraclaw, Kön
dorff-Jastrzemb, Kreuznach, Lipik, Münster am Stein, S
hausen, Salzschlirf, Salzungen, Sodenthal, Sulzbrunn, Tölz, Wilde

Schwefelwässer:

Aachen, Deutsch-Altenburg (Jodschwefelquelle), Baden
Wien, Baden (Schweiz), Bentheim, Burtscheid, Eilsen, Gurn
Harkány, Hechingen, Herkulesbad, Heustrich, Ilidze, Lande
Langenbrücken, Langensalza, Lavey-Lenk, Limmerbrunn
Lucasbad (Ofen), Meinberg, Nenndorf, Obladis (Tirol), Pisty
Reutlingen, Schinznach, Sebastiansweiler, Stachelberg, Szmr
(Büdöskö), Trencsin-Teplitz, Warasdin-Töplitz, Warmbrunn
Riesengebirge, Weilbach, Wippfeld.

Seebäder.

a) Nordseebäder:

Blankenberghe, Borkum, Büsum, Cuxhaven, Dangast, F
Helgoland, Juist, Langeoog, Norderney, Ostende, Schevening
Spikeeroog, Sylt, Wangerooge.

b) Ostseebäder:

Ahlbeck, Apenrade, Binz, Boltenhagen, Borby, Colb
Cran, Dievenow, Düstenbrook, Fuigen, Glücksburg, Gravenst
Göhren, Haffkrug, Heiligendamm, Heringsdorf, Kahlberg, Kl
penborg, Koserow, Marienlyst, Misdroy, Gross-Müritz, Prer
Putbus, Rügenwaldermünde, Sassnitz, Schwarzort, Stolpmün
Swinemünde, Travemünde, Warnemünde, Westerplatte, Zinnow
Zoppot.

c) am Adriatischen Meere:

Abbazia, Porto rose bei Pirano (Istrien), Sistiana bei D
(Küstenland), Venedig-Lido.

Indifferente Thermen:

Assmannshausen, Badenweiler, Budapest, Gastein, Johan
bad, Krapina-Töplitz, Luxeuil, Liebenzell, Neuhaus, Pfäff
Ragatz, Plombières, Römerbad, Schlangenbad, Teplitz-Schön
Tobelbad, Töplitz in Krain, Tüffer, Vöslau, Warmbrunn, Wies
bad, Wildbad, Wildstein.

Traubencurorte:

Aigle, Bex, Boppard, Bozen, Dürkheim, Edenkoben, Epp
Gleisweiler, St. Goarshausen, Gries, Honnef, Kaltern, Kreuzna
Laubbach, Meran, Montreux, Neustadt a. d. Haardt, Rolar
eck, Rüdesheim, Vevey, Wiesbaden.

Klimatische Sommercurorte:

Achensee, Adelholzen, Admont, Alexisbad, Alp Piora
randerbad, Altenbrak, St. Andreasberg, Arustadt, Arosa,
ach, Aussee, Badenweiler, Badersee, Beatenberg, Berchte
urka, Berneck, Blankenberg, Blankenburg am Harz,

hain, St. Blasien, Bodenbach, Braunfels (Rheinprovinz), Bregenz, Brennerbad, Brixlegg, Bruneck, Campfeer, Charlottenbrunn, Churwalden, Cortina d'Ampezzo, Daruvar, Davos, Dissentis, Dittersbach, Donaueschingen, Eisenach. Elgersburg, Empfing, Engelberg, Falkenstein, Fidau, Fladnitz, Flinsberg, Frankenhausen, Frauensee, Friedrichsroda, Fuscher-Bad, Garmisch, Gastein, Georgswalde, Gernsbach, Gersau, Giesshübl-Puchstein, Gleichenberg, Gmunden, Görbersdorf, Gossensass, Gottleuba, Grindelwald, Grund, Hainstein, Harzburg, Heidelberg, Heiden, Helmstadt, Herrenalb, Höchenschwand, Hofheim, Höhlenstein, Homburg, Hubertusbad, Ilidze, Ilmenau, Innichen, Interlaken, Ischl, Jenbach, Johannisbad, Johannisberg, Judendorf, Karlsbrunn, Kainzenbad, Kammer, Kitzbühel, Klosters, Kochel, Kohlgrub, Königstein, Königswart, Konstanz in Baden, Kösen, Köstritz, Kreuth, Krondorf, Krumpendorf, Lauenstein, St. Leonhard, Liebenstein, Liebwerda bei Friedland, Lienz, Lindenfels, Lipik, Lobenstein, Lofer, Loschwitz, Louisenthal, St. Lucasbad, Maderanerthal, Madonna di Campiglio, Magglingen, Marienbad, Mellau, Michelstadt, Millstatt am See, Mittenwald, Mondsee, St. Moritz, Muggendorf, Mühlbach, Nidelbad, Niederaschau, Niederdorf, Oberhof, Obernigk, Oberstdorf, Olbernhau, Osterode, Partenkirchen, Pfänder, Pontresina, Pörtschach, Portorè, Alt-Prags, Neu-Prags, Preblau, Radein, Rappoltsweiler im Elsass, Rastenberg, Rehburg, Reiboldsgrün, Reichenau, Reinerz, Renchthal, Rigi Kaltbad, Rohitsch, Römerbad, Römerquelle, Ronneburg, Rudolstadt, Ruhla, Sachsa, Salzbrunn, Samaden, Salzungen, Schandau, Schluchsee, Schmalkalden, Schruns, Schwanberg, Schwarzbach, Schwarzenberg, Schweizermühle, Seeon, Seewis, Sexten, Sils-Maria, Silvaplana, Sonneburg, Spindelmühle, Staffelsee, Steinach, Sterzing, Streitberg, Suderode, Suhl, Sulza, Sutinsko, Gross- und Klein-Tabarz, Tarvis, Tatra-Füred, Tegernsee, Thal, Tobelbad, Toblach, Tölz-Krankenheil, Traunstein, Trencsin-Teplitz, Triberg. Unken, Unterach, Veldes, Vellach, Vierwaldstättersee, Villach, Vorderbrühl bei Mödling, Waidring, Walchensee, Wallenstadt, Weesen, Wehlau, Wernigerode, Wiesen, Wilhelmshöhe, Wolfach, Zell am See, Zugerberg, Zuoz.

Klimatische Wintercurorte:

Abbazia, Aegypten, Ajaccio, Algier, Alassio, Andermatt, Arco, Arosa, Aussee, Baden-Baden, St. Blasien, Bordighera, Cadenabbia, Cannes, Catania, Davos, Falkenstein, Gardone-Riviera, Gersau, Görbersdorf, Gries, Hélouan, Homburg, Hyères, Lucasbad (Ofen), Lugano, Lussinpiccolo, Madeira, Malaga, Mentone, Meran, Monte Carlo, Montreux, St. Moritz, Nervi, Neu-Schmecks (Ungarn), Nizza, Ospedaletti, Palermo, Pau, Pegli, Pisa, Reiboldsgrün, San Remo, Samaden, Soden, Spezzia, Teneriffa, Venedig, *Vevey, Vorderbrühl* bei Mödling, Wiesbaden, Wilhelmshöhe.

Wasserheilanstalten:

Aigle, Albisbrunn, Arendsee, Augustusbad, Aussee, Benfe
Berlin, Berthelsdorf, Beurig, Bistrai bei Bielitz, St. Blasien, Bopp
Brestenberg, Brunnthal bei München Buchenthal, Champel,

Cossilla in Piemont, Dietenmühle, Eckerberg, Eggenberg, Elgersburg, Feldberg, Ferdinandsbad, Frohnleiten, Fürstenhof, Gainfahrn, Geltschberg, Giessbach, Giesshübl Sauerbrunn, Gleisweiler, Godesberg, Graefenberg, Harzburg, Helenenthal, Hermsdorf, Herrenalb, Hofheim, Homburg, Ilidže, Ilmenau, Ischl, Judendorf, Kaltenleutgeben, Karlsruhe, Königsbrunn, Königstein, Kreischa, Kreuzen, Krummhübel im Riesengebirge, Laubbach, Lauterberg, Leipnik, Liebenstein, Liebwerda bei Friedland, Lindenhof, Lobenstein, Mammern, Marienberg, Michelstadt, Millstatt am See (Kärnten), Mittewald bei Villach, Mühlbad, Mürzzuschlag, Nassau, Nerothal, Neu-Schmecks (Ungarn), Nidelbad, Niederwaldhof, Obermais, Pegli, Pforzheim, Priessnitzthal, St. Radegund, Reichenau, Reimannsfelde, Riesenhof bei Linz, Rolandseck, Salzburg-Parsch, Schandau, Schönbrunn, Schöneck, Schweizermühle, Sonneberg, Sophienbad, Spittal a. D., Stein in Krain, Stuer, Suderode, Teinach, Thalheim, Thalkirchen, Tharandt, Traunstein, Wartenberg, Wilhelmshöhe, Wiesbaden, Wolfsanger, Zuckmantel, Zuoz.

21. Künstliche Bäder.

Kalte	Bäder	10—20° C.	+ 8—15° R.
Kühle	»	20—28° »	+ 16—22° »
Laue	»	28—34° »	+ 23—26° »
Warme	»	34—40° »	+ 27—32° »
Heisse	»	40—45° »	über 32° »

Vollbad (bis an den Hals reichend) etwa 200—400 Liter für Erwachsene, 50—200 Liter für Kinder. Halbbad (bis zur Herzgrube reichend) 100—150 Liter. Sitzbad 20—30 Liter. Localbad nach Massgabe der Körpertheile, z. B. Fussbad 10 Liter.

Alkalische Bäder, s. Laugenbad.

Aromatische Bäder:

a) durch Zusatz des Aufgusses von

500—1000 Gramm		Kamillen, oder
500—1000	»	Pfefferminze, oder
300— 500	»	Kalmuswurzel, oder
200— 500	»	Spec. aromat. auf 2—10 Liter Wasser in ein Bad.

b) Durch Zusatz von:

50—100 Gramm Spir. Angelicae comp., oder
» Calami,
» Mastiches comp.,
» Serpylli.

Etwa die Hälfte für ein Kind.

Chlorkalkbäder: *500* Gramm Calcaria chlorata zu einem Vollbad, *10·0 auf 1* Liter Wasser zu einem Localbad.

Eichenrindenbäder, vide Tanninbäder.

Eisenbäder: **1.** Reines Eisenvitriol. Ferr. sulf. venale 30·0 bis 80·0 und gereinigte Pottasche 120·0. **2.** Reines Eisenvitriol 30·0, Kochsalz 60·0, Natr. bicarb. 90·0. Für Kinder ein Viertel der Dos

Eisenmoorbäder: Mattoni's Moor-Extract, u. zw. 1 Kilo Mattoni's Moorsalz (trockener Moor-Extract) oder 1 Flasche Mattoni's Moorlauge (flüssiger Moor-Extract). Bezugsort: H. Mattoni in Budapest, Franzensbad, Karlsbad und Wien.

Fichtennadelbäder: Fichtennadelextract (Extr. Pini sylvestr.) 150—500 Gramm.

Harzbäder: Terebinth. ven. und Picis liq. aa. 1000·0 mit warmem Wasser stundenlang gerührt (Trousseau).

Jodbäder: Kal. jod. 50·0—100·0 zum Vollbad, 5·0—10·0 zum örtlichen oder Sitzbad. — Oder: Kal. jod. 20·0, Jodi puri 10·0. (In Holzwannen.)

Kleienbad: Weizenkleie $^1/_2$—$1^1/_2$ Kilogramm in 5 Liter Wasser durch $^1/_2$ Stunde gekocht.

Laugenbad: Rohe Pottasche 100—500 Gramm in ein allgemeines Bad, 5—10·0 zu einem örtlichen Bad. Auch Kali caust. siccum 10·0 bis 50·0 bis 100·0 auf ein allgemeines Bad.

Leimbad: 500—1000 Gramm Colla anim. in heissem Wasser gelöst.

Malzbad: 1—3 Kilogramm Gerstenmalz $^1/_2$ Stunde in 4—5 Liter Wasser gekocht zum Bad.

Milch- oder Molkenbäder rein oder zur Hälfte mit Wasser gemischt.

Moorbäder, vide Eisenmoorbäder.

Mutterlaugenbäder: 1—3 Kilogramm Halleiner Mutterlaugensalz auf ein Bad.

Salzbad: 2—4 Kilogramm Koch- oder Seesalz, oder 1 Kilogramm Kochsalz und 1 Kilogramm Mutterlaugensalz oder 1 Liter Mutterlauge.

Säurebad: Ac. muriat. oder nitr. 100·0—500·0 auf ein Vollbad (Holzwanne).

Schwefelbad: 1. Natrium subsulfuros. 50·0—100·0, oder 2. Kalium sulfuratum pro balneo 50·0—100·0 (stärker!), 3. Kalium sulfuratum pro balneo 30·0, Acid. sulf. crud. 15·0. Allenfalls $^1/_4$ bis $^1/_2$ Gramm Colla anim. zugesetzt. Nicht in Metallwannen!

Seifenbad: 100-400 Gramm geschabte Hausseife, oder weisse Kaliseife, od. Sapon. aromat. pro balneo, od. Spir. sapon. 50·0–100·0.

Seebad: 5—8 Kilogramm Meersalz pro Bad.

Senfbäder: 1. 100·0—200·0 Senfmehl mit kaltem Wasser angerührt, den Teig im Bade vertheilt.
2. Ol. sinapis 2·0, Spir. vin. 25·0.

Sodabad: Natr. carb. crud. 200·0—500·0 auf ein allgemeines, 100—200·0 auf ein örtliches Bad.

Soolbäder: 2—3% Kochsalzgehalt, 3—25 Liter Soole auf ein Bad, oder $^1/_2$—2 Kilogramm Halleiner Mutterlaugensalz mit 1 Kilogramm Koch- oder Steinsalz.

Sublimatbad: Sublim. 2·0—10·0, Alcohol. 5·0, Aq. 200·0 ins Bad, Localbad 0·1—0·5—1·0 Sublimat. Nur in Holzwannen!

Tanninbäder: 1. Ac. tann. 10·0—50·0, Aq. 200·0.
2. Abkochung von Fichten-, Weiden-, Ulmen- oder Kastanienrinden, $^1/_2$ Kilogramm auf 2 Liter.

Walnussblätterbad: $^1/_2$ bis 1 Kilogramm.

Metallwannen zu vermeiden bei Jod- und Schwefelbädern!

22. Schwangerschafts-Kalender.*)

Letzte Menstruation		Tag der Geburt		Letzte Menstruation		Tag der Geburt	
Januar	1	October	8	Juli	5	April	12
»	5	»	12	»	10	»	16
»	10	»	17	»	15	»	21
»	15	»	22	»	20	»	26
»	20	»	27	»	25	Mai	1
»	25	November	1	»	28	»	4
Februar	1	»	4	August	1	»	8
»	5	»	8	»	5	»	12
»	10	»	12	»	10	»	17
»	15	»	22	»	15	»	22
»	20	»	27	»	20	»	27
»	25	December	1	»	25	Juni	1
März	1	»	6	»	28	»	4
»	5	»	10	September	1	»	8
»	10	»	15	»	5	»	12
»	15	»	20	»	10	»	17
»	20	»	25	»	15	»	22
»	25	»	30	»	20	»	27
»	28	Januar	2	»	25	Juli	2
April	1	»	6	»	28	»	5
»	5	»	10	October	1	»	8
»	10	»	15	»	5	»	12
»	15	»	20	»	10	»	17
»	20	»	25	»	15	»	22
»	25	»	30	»	20	»	27
»	28	Februar	2	»	25	August	1
Mai	1	»	5	»	28	»	4
»	5	»	9	November	1	»	8
»	10	»	14	»	5	»	12
»	15	»	19	»	10	»	17
»	20	»	24	»	15	»	22
»	25	März	1	»	20	»	27
»	28	»	4	»	25	September	1
Juni	1	»	8	»	28	»	4
»	5	»	12	December	1	»	7
»	10	»	17	»	5	»	11
»	15	»	22	»	10	»	16
»	20	»	27	»	15	»	21
»	25	April	1	»	20	»	26
»	28	»	4	»	25	October	1
Juli	1	»	8	»	28	»	4

*) Berechnet nach der Formel: Der Eintritt der Geburt ist statt 9 Monate minus 7 Tage (oder — 3 Monate + 7 Tage nach dem Tage des Eintrittes der letzten Menstruation.

23. Sehproben.

Zur Untersuchung der Sehschärfe des Auges bedient man sich am zweckmässigsten der Probebuchstaben (Testtypes) von Snellen, welche derart gewählt sind, dass ein Auge mit normaler Sehschärfe gewisse Buchstaben in gewisser Entfernung deutlich sehen kann. Diese in Fuss ausgedrückte Entfernung bildet zugleich die Nummer der betreffenden Buchstaben. So wird von einem Auge mit normaler Sehschärfe Nr. 20 in 20', Nr. 50 in 50' und Nr. 3 in 3' Distanz deutlich gelesen. Die Sehschärfe des Auges lässt sich durch einen Bruch ausdrücken, dessen Zähler die Entfernung des Objectes vom untersuchten Auge und dessen Nenner die Nummer der Probebuchstaben bildet. In dem eben angeführten Beispiele wird also: $S = \frac{20}{20}$ oder $\frac{50}{50}$ oder $\frac{3}{3} = \frac{1}{1}$ sein. Liest ein Auge in 20' blos Nr. XXX, so wird dessen Sehschärfe $S = \frac{20}{20}$ sein. Liest das Individuum in 10' Sn XL, so ist dessen Sehschärfe wieder geringer und $S = \frac{10}{40}$. Liest es in 20' blos Sn C, so ist $S = \frac{20}{100}$.

Es ist rathsam, diesen Bruch nicht abzukürzen, da aus demselben nicht nur der Grad der Sehschärfe ersichtlich ist, sondern auch der Weg, auf dem dieselbe ermittelt wurde. Man lässt am zweckmässigsten in der Entfernung von 20 Fuss zuerst die grösseren und allmählich die kleineren Buchstaben lesen, bis man die kleinsten ermittelt, die in der genannten Entfernung deutlich wahrgenommen wurden. (Prüfung der Augen für die Ferne.) — Behufs Prüfung der Augen für die Nähe lässt man zuerst die kleinsten Nummern lesen, bis man die grössten eruirt, die das Auge noch deutlich lesen kann.

Im nachfolgenden bringen wir einige Probebuchstaben genau nach Snellen und einige Leseproben, die ungefähr den angedeuteten Anforderungen entsprechen.

II. (0,6.)

Die fünf Sinne des Menschen sind die fünf Eingangsthore, durch welche die gesammte Außenwelt mit all ihrer Schönheit und Nützlichkeit den Einzug hält, um zu unserem Bewußtsein zu gelangen und so unsere Erkenntniß und

$II\frac{I}{II}$. (0,8.)

unser Wissen zu werden. Es ist letzteres ein unberechenbarer Vortheil, diese fünf Sinne zu wecken und in steter Thätigkeit zu erhalten und durch Uebung und Anleitung zu erwirken, daß dieselben möglichst

III. (1,0.)

viele Eindrücke der uns umgebenden Außenwelt aufnehmen und dieselben, durch eigene Schwäche und Unvollkommenheit möglichst unberührt, an den Ort ihrer

$III\frac{I}{II}$. (1,1.)

Bestimmung gelangen zu machen. Der Zweck nachfolgender Uebungen ist daher: die kindlichen Sinne und ihre Organe durch klare, bestimmte

IV. (1,3.)

und wohl unterscheidbare Eindrücke zu wecken und zu beleben. Wir entnehmen *n alten gesammten Blättern von den*

VI. (2,0.)

sinnreich erdachten Uebungen nur einige der wesentlichsten.

VII$\frac{I}{II}$. (2,5.)

Zur Uebung des Gesichtssinnes lege man dem Kinde

X. (3,2.)

drei Reihen von Farben vor, roth, blau,

XV. (4,8.)

ERHFA

XX. (6,5.)

AVCB

C. (32,5.)

L. (16,2.)

XXX. (9,75.)

VERLAG VON URBAN & SCHWARZENBERG
IN WIEN UND BERLIN.

Wiener Medizinische Presse

Organ für praktische Aerzte

XXXXII. Jahrgang 1901

mit der Monatsbeilage

WIENER KLINIK

Vorträge aus der gesammten praktischen Heilkunde

XXVII. Jahrgang 1901

Redacteur: Dr. ANTON BUM.

Die **„Wiener Medizinische Presse"** bringt jährlich auf circa 130 grossen Druckbogen Originalien aus allen Zweigen der praktischen Heilkunde, Berichte aus Kliniken und Spitälern, Mittheilungen aus der Praxis, Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften u. Vereine, kritische Besprechungen jeder neuen literarischen Erscheinung, Zeitungsschau, Standesangelegenheiten, Medicin. Tagesgeschichte, Correspondenzen, Feuilletons, Militärärztliche Zeitung, Kleine Mittheilungen, Notizen und ärztliche Vacanzen.

Abonnementspreise: »Wiener Medizinische Presse« mit »Wiener Klinik«: **Inland:** Jährlich *K* 20.—, halbjährlich *K* 10.—, vierteljährlich *K* 5.—. **Ausland:** Für das Deutsche Reich, alle Buchhändler und Postämter: jährlich 20 Mark, halbjährl.ch 10 Mark, vierteljährlich 5 Mark. Für die Staaten des Weltpostvereines: Jährlich 24 Mark, halbjährlich 12 Mark. **„Wiener Klinik" separat:** Inland: Jährlich *K* 8.—, Ausland: 8 Mark. **Inserate** werden nach Tarif berechnet.

Man abonnirt im **Auslande** bei allen Postämtern und Buchhändlern, im **Inlande** durch Einsendung des Betrages per **Postanweisung** an die **Administration der „Wiener Medizinischen Presse" in Wien, I., Maximilianstrasse 4.**

MEDICINISCHER VERLAG VON
URBAN & SCHWARZENBERG
IN WIEN UND BERLIN.

Real-Encyclopädie
der gesammten Heilkunde
Medicinisch-chirurgisches Handwörterbuch
für praktische Aerzte

Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Unter Mitwirkung von über hundertfünfzig Professoren und Docenten
herausgegeben von

Professor Dr. Albert Eulenburg,
Geh. Med.-Rath,
Berlin, W. Lichtenstein-Allee 3.

Erster bis fünfundzwanzigster Band
(Lief. 1—250).

Mit zahlreichen Illustrationen
in Holzschnitt und Farbendrucktafeln

Preis pro Lieferung: 1 K 80 h = 1 M. 50 Pf. 136

Preis pro Band (10 Liefgn.):
18 K = 15 M. brosch.; *21 K = 17 M. 50 Pf.* eleg. geb.

Das Werk erscheint in circa 26 Bänden im Umfange von etwa 40 Druckbogen pro Band und dürfte Ende 1900 vollständig vorliegen. — Die Ausgabe findet in Lieferungen à 4—5 Druckbogen statt.

Medicinischer Verlag von
URBAN & SCHWARZENBERG
IN WIEN UND BERLIN.

Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen.

Vorträge
gehalten an der Allgemeinen Poliklinik
von
Prof. Dr. ALOIS MONTI
Director der Allgemeinen Poliklinik in Wien.

Erscheint in zwanglosen Heften.

Bisher sind erschienen:

Erstes Heft: **Ueber Verdauung und natürliche Ernährung der Säuglinge.** Mit 9 Holzschn. Preis: 3 *K* = 2 M. 50 Pf.

Zweites Heft: **Ueber die Entwöhnung, Ernährung der Kinder bis zum zweiten Lebensjahre. Die künstliche Ernährung der Säuglinge.** Preis: 3 *K* = 2 M. 50 Pf.

Drittes Heft: **Die Erkrankungen d. kindlichen Verdauungsorgane. 1. Mund, Rachen, Speiseröhre und Magen. Nebst Anhang: Die im Kindesalter am häufigsten vorkommenden Vergiftungen.** Preis: 4 *K* 50 *h* = 3 M. 75 Pf.

Viertes Heft: **Die Erkrankungen der kindlichen Verdauungsorgane. 2. Magen-Darmkrankheiten.** Mit 5 Holzschnitten. Preis: 4 *K* 50 *h* = 3 M. 75 Pf.

Fünftes Heft: **Die Krankheiten des Bauchfells, der Leber, der Milz und des Pankreas. Diabetes insipidus und mellitus.** Preis: 1 *K* 80 *h* = 1 M. 50 Pf.

Sechstes Heft: **Das Wachsthum des Kindes von der Geburt bis einschliesslich der Pubertät.** Mit 3 Holzschnitten. Preis: 1 *K* 20 *h* = 1 M.

Siebentes Heft: **Das Blut und seine Erkrankungen.** Mit 3 Holzschnitten. Preis: 3 *K* = 2 M. 50 Pf.

Achtes Heft: **Syphilis — Scrophulose.** Preis: 3 *K* = 2 M. 50 Pf.

Neuntes Heft: **Tuberculose.** Preis: 3 *K* = 2 M. 50 Pf.

Zehntes Heft: **Diphtherie.** Mit 13 Holzschn. Preis: 4 *K* 20 *h* = 3 M. 50 Pf.

Elftes Heft: **Rachitis.** Preis: 2 *K* 40 *h* = 2 M.

Zwölftes Heft: **Keuchhusten, Influenza, Mumps u. typ. Erkrankungen.** Preis: 3 *K* = 2 M. 50 Pf.

Verlag von
Urban & Schwarzenberg
in Wien und Berlin.

Handbuch der

Speciellen Pathologie und Therapie

für praktische Aerzte und Studirende.

Von **Dr. Hermann Eichhorst,**

o. ö. Professor der speciellen Pathologie und Therapie und Director der medicinischen Universitäts-Klinik in Zürich.

Fünfte, umgearbeitete u. vermehrte Auflage.

4 Bände:

I. Band: **Krankheiten des Circulations- und Respirationsapparates.** Mit 165 Holzschnitten. VIII u. 668 S.

II. Band: **Krankheiten des Verdauungs-, Harn- und Geschlechtsapparates.** Mit 132 Holzschnitten. VIII und 784 S.

III. Band: **Krankheiten der Nerven, Muskeln und Haut.** Mit 257 Holzschnitten. XII und 847 S.

IV. Band: **Krankheiten des Blutes und Stoffwechsels und Infectionskrankheiten.** Mit 111 Holzschnitten. VIII und 808 S.

Preis für jeden Band:

14 *K* 40 *h* broschirt; 16 *K* 80 *h* eleg. gebunden.

Preis complet:

57 *K* 60 *h* broschirt; 67 *K* 20 *h* eleg. gebunden.

Verlag von Urban & Schwarzenberg in Wien und Berlin.

Anatomischer Atlas für Studirende und Aerzte.

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Alois Dalla Rosa
Herausgegeben von
Dr. Carl Toldt,
k. k. Hofrath, o. ö. Prof. der Anatomie an der Univ. Wien.

Mit 1470 zum Theil mehrfarbigen Holzschnitten und erläuterndem Text.

1. Lieferung (= 1. und 2. Lieferung der ersten Auflage).

A. Die Gegenden des menschl. Körpers.

B. Die Knochenlehre. Zweite Auflage. (Figur 1—377 und Register.)
Preis *K* 9.60 = M. 8.— geh.; *K* 11.04 = M. 9.20 geb.

2. Lieferung (= 3. Lieferung der ersten Auflage).

C. Die Bänderlehre. Zweite Auflage. (Figur 378—486 und Register.)
Preis *K* 6.— = M. 5.— geh.; *K* 7.44 = M. 6.20 geb.

3. Lieferung (= 4. Lieferung der ersten Auflage).

D. Die Muskellehre. Zweite Auflage. (Fig. 487 bis 616 und Register.) Preis *K* 8.40 = M. 7.— geh.; *K* 9.84 = M. 8.20 geb.

4. Lieferung (= 5. Lieferung der ersten Auflage).

E. Die Eingeweidelehre. Zweite Auflage. (Fig. 617—903 und Register.) Pr. *K* 9.60 = M. 8.— geh.; *K* 11.04 = M. 9.20 geb.

5. Lieferung (= 6. und 7. Lieferung der ersten Auflage).

F. Die Gefässlehre. Zweite Auflage. (Fig. 904 bis 1092 und Register.)
Preis *K* 14.40 = M. 12.— geh.; *K* 15.84 = M. 13.20 geb.

8. Lieferung.

G. Die Nervenlehre. *a)* Centrales Nervensystem u. Rückenmarksnerven. (II. Fig. 1—168.) Preis *K* 8.40 = M. 7.— geh.

9. Lieferung (Schluss des Werkes).

G. Die Nervenlehre. *b)* Hirnnerven u. sympathisches Nervensyst. (II. Fig. 169—378 u. Register.)
Preis *K* 9.60 = M. 8.— geh.

H. Die Sinnesorgane.

Lieferung 8 und 9 in einem Band geb. *K* 19.44 = M. 16.20.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie von der Verlagshandlung
Urban & Schwarzenberg in Wien und Berlin.

DIE THERAPIE DER GEGENWA

MEDICINISCH-CHIRURGISCHE RUNDSCHAU

42. Jahrgang FÜR PRAKTISCHE ÄRZTE **42. Jahrg**

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner

herausgegeben von

Prof. Dr. G. Klemperer

Verlag von Urban & Schwarzenber

WIEN	BERLIN
I., Maximilianstrasse 4	NW., Dorotheenstrasse 38/3
Telephon 9104.	Fernsprecher I, 2809.

Neueste Folge. III. Jahrgang 1901.

Die Therapie der Gegenwart

zeichnet sich vor ähnlichen Unternehmungen dadurch aus, sie wirklich den Bedürfnissen des **praktischen Arztes** gen will. Die Mitarbeiter, deren Reihen Rudolf Virchow eröffn setzten sich aus den hervorragendsten Klinikern und Special Deutschlands, Oesterreichs und des Auslandes zusammen werden aber nur die für den Praktiker unmittelbar brauchb Resultate ihrer Erfahrung in ganz kurzen, knappen Aufs vortragen. — Zusammenfassende, interessant und selbständig schriebene Uebersichten und ein wohlorganisirter, bequem Schlagworten geordneter Referatentheil bilden dazu die n wendige Ergänzung. — Die Ausstattung ist vornehm und Preis sehr billig.

Die Therapie der Gegenwart

erscheint zu Anfang jedes Monats in Heften von 6 Bog. (48 S

Bezugspreis

für den Jahrgang **12 K**. im Deutschen Reiche **10 Mark**, *Weltpostverein* **12 Mark**. Einzelne Hefte **1 K 80 h = 1 M. 5**

Man abonnirt bei allen **Buchhandlungen** des In- und Ausla *sowie direct bei der* **Verlagshandlung** in Wien oder Ber

Adresse der **Redaction:** Berlin NW., Roonstrasse N *Adresse des* **Verlages:** Wien, I., Maximilianstrasse

To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below

10M—8-45




V125
K65
1901
Klinisches Recept-
Taschenbuch. 105684
NAME
DATE DUE